






ANA

R12941



ALBERT HALLER  
ELEMENTARY  
PHYSIOLOGY  
CORPORATION

79/32.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
ANATOMICAL MUSEUM  
PUBLISHED BY THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS  
CHICAGO, ILL.



~~SECRET~~



*Ex Libris Bibliothecae*  
AUCTARIUM  
*Collegii AD Regii*  
ALBERTI HALLERI  
ELEMENTA  
PHYSIOLOGIÆ  
*Medicor. Edinburgensis*  
CORPORIS HUMANI.

FASCICULUS PRIMUS.

FIBRA. VASA. CIRCUITUS SANGUINIS. COR.



*H. c. g.*

LAUSANNÆ HELVETIORUM,  
Sumptibus JULII HENRICI POTT ET SOCIOR.

---

M. D. CC. LXXXII.



AUGUSTARIUM

AD

ALBERTI HALLERI

ELEMENTA

PHYSIOLOGICÆ

CORPORIS HUMANI.

FASCICULUS PRIMUS.

LEONARDUS SEIGERUS

LEONARDUS SEIGERUS  
LEONARDUS SEIGERUS

MDCCCLXXII



---

LECTORI BENEVOLO

S. D. P.

EDITOR.

QUum novam editionem elementorum physio-  
logiæ corporis humani Hallerianæ, quæ ita est  
inscripta :

ALBERTI HALLERI

DE

PARTIUM

CORPORIS HUMANI

PRÆCIPUARUM

FABRICA ET FUNCTIONIBUS

OPUS QUINQUAGINTA ANNORUM.

BERNÆ, c l o l o c c L X X V I I .



cum priore Halleriana compararemus, eamque novam editionem sedecim voluminibus, ut dicitur, in forma octava absolvi perspiceremus, augmentum hujus novæ editionis, idque ipsum non parvum, potius cerni in additis rebus noviter detectis seu omissis, mendis emendatis, nec non in dubiis vel revocatis, vel noviter motis, item in rebus aliis atque aliis in locis veteris editionis sparsis, in unum novæ coactis locum, inque rebus aptiori loco collocatis, quam in rerum propositarum ordine mutato, quem secutus est HALLERUS in prima editione, intelleximus. Quod quidem ex fine præfationis Hallerianæ novæ editioni præmissæ luculenter patet: *Ordinem servavi eundem & libros perinde triginta, sed multa contraxi, alia aptiori loco disposui, vere utilis nihil omisi.*

Quæ cum ita sint, hæc additamenta in usum & commodum emtorum veteris editionis ex nova excerpta atque collecta hic deprehenduntur, eaque ipsa veteri editioni, quantum fieri potuit, ratione typorum stanneorum, chartæ, formæ cet. ita similia effecta, ut, hoc auctario adjuncto, nullum, quoad contenta, inter veterem & novam editionem intercederet discrimen. Ut autem spatio, volumini & pecuniæ parceretur, & tamen id, quod non diu ante promissum est, præstaretur, has adhibuimus cautiones.



Ac primum quidem, quod ad præfationes \*) nonnullis novæ editionis tomis præmissas spectat, eas pene verbotenus describendas censuimus, neque quicquam delevimus præter id, quod de tempore, quo secundus & tertius tomus prodierint, & quo reliquæ partes essent proditurae, Auctor monuerat. Etenim cum in his ipsis præfationibus partim aliquis velut recens supplementorum, partim uberior quorundam assertorum illustratio contineatur, non posse non eas cujusdam utilitatis esse arbitrati sumus.

Colligentur postea omnino omnia ea additamenta novæ editionis, quæ novitatem rerum præ se ferunt & sive emendationi, sive illustrationi veteris serviunt, ita in octo fasciculos, ut singuli fasciculi initium dirigat finis uniuscujusque tomi primæ editionis in forma quarta. Quapropter, ut quilibet fasciculus cuique tomo veteris editionis commoditatis causa posset jungi, paginarum numerus singuli fasciculi sine erat finiendus. Fasciculi autem quarti divisio in primam & secundam partem pendet a fine octavi voluminis, quod hactenus ultimo loco de nova hac editione anno hujus seculi septuagesimo & octavo prodiit. Simulac vero reliqua volumina apparuerint, rursus incipie-

\*) Epistolam dedicatorem ad CALDANUM Patavinum Professore, quæ primo volumini præmissa est, consulto omisimus, quippe quæ nihil omnino, quod Lectoribus prodesse possit, contineat.



mus ita, ut singulo tomo veteris editionis respondeat singulus hujus auctarii fasciculus. In ordine itaque hunc fasciculum quartum in primam & secundam partem distribuimus.

Sed ut brevitati vel ubique consuleremus, singulorum verborum, unam eandemque rem significantium, nec sensum mutantium, nec jam communicatas in veteri editione illustrantium res, aliquam habuimus curam. Quod porro attinet ad locos in vetere disjunctos & in nova editione unitos aut in hac ex ea omissos aut brevius dictos, hi sedulo laudati &, rebus mutationem passis, prorsus repetiti sunt \*). Noluimus enim non facile quicquam omittere; quare si eandem rem bis propositam deprehendimus, bis eam quoque descripsimus e. g. de granoso insectorum adipe \*\*).

Deinde notarum ita est habita ratio, ut novis additis, emendatæ commemorarentur & omissæ delerentur.

Typographica errata, eaque non adeo rara, hujus novæ editionis corrupta effecerunt loca varia. Id quod & fassus est Editor præfationis Fasciculo hujus auctarii tertio \*\*\*) præmissæ. Tum Græca verba Latinis litteris in ea leguntur, quæ suæ linguæ in hoc auctario reddidimus. Pariter nomina Auctorum, librorum inscriptiones cet. erroribus

\*) v. Auctar. Fascic. I. p. 21. 68.

\*\*) vid. Fascic. I. p. 15.

\*\*\*) p. 3.



non sunt destituta. Quibus in rebus ita versati sumus, ut, si fieri posset, hos errores emendaremus. Quod si vero per eorum gravitatem atque difficultatem non licuit, quid esset sentiendum, non immodeste demonstravimus, ac denique, si prorsus nulla corrupti loci adhiberi potuit medela, saltem eam indicavimus \*\*\*\*). Forte editor reliquorum voluminum ejusmodi loca corriget & præterea quorundam errorum a nobis prætermisssorum adhibebit emendationem, quos omnes, hoc auctario ad finem perducto, nos diligenter repetituros esse pollicemur.

Denique opus est, ut de tabulis æneis quædam dicamus. Quarum novitas curabitur, uti forma hujus auctarii poscit, eam vero earum varietatem, quæ solummodo a diversa horum editionum forma est repetenda, nec ullam præterea mutationem affert, de industria negleximus.

Quæ præterea in veterem & novam hujus physiologiæ Hallerianæ editionem cadit diversitas, intelligi facile potest ex præfatione veteris editionis aucta, novæ præmissa & huic ipsi auctario, quatenus novitatem spectat, inserta.

Ergo in hujus auctarii edendi occupatione nos ita versatos esse, ex his fasciculis, quos hic vulgamus & reliqui, editis ceteris novæ editionis voluminibus, eadem ratione sequentur, apparebit.

\*\*\*\*) v. Auctar. Fascicul. I. p. 61. II. p. 5 & 20.



Om nibus demum his octo fasciculis finitis, qui, uti ab initio polliciti sumus, octo tomis veteris editionis ita accommodati & adaptati sunt, ut singulum tomum veteris editionis singulus fasciculus hujus auctarii respiceret, ultimo loco index horum additamentorum addetur, partim ut Lectorum queat indulgeri studiis, partim ut & hac in re hæc denuo vulgata additamenta veteri editioni elementorum physiologiæ prorsus similia efficiantur. Elucet quidem hic quædam varietas, cum index rerum contentarum cuilibet tomo prioris editionis est nexus, tuentur tamen, uti videtur, hanc exiguam diversitatem spatii, voluminis & pecuniæ parsimonia. Dedi Lipsiæ mense Octobri MDCCCLXXX.





## AUCTARIUM

A D

ALBERTI HALLERI

VIRI SUMMI

## ELEMENTA PHYSIOLOGIÆ

CORPORIS HUMANI.

## PRÆFATIO.

- P** Ag. III. l. 11. *adde* & nuperrima aliqua de nervo primi paris CASCHE & SABBATIER.
- p. IV. l. 8. *post* utilitas *adde* visceris, neque ab eo viscere ea functio pendet.
- p. V. l. 27. imprudenter decet *lege* continuo debet.
- p. VI. l. 2. a quibus per receptas leges eas frangi oportuerat, *lege* a quibus per receptas leges hygrostaticas eas vehementer frangi oportuerat.
- p. VII. l. 8. *post* experimentorum *adde* & partium corporis animati historias, &c.
- ibid. l. 14. *post* licuerit *adde* diligenter descriptas ex libris addiscere facile est.
- p. VIII. l. 14 *post* SWAMMERDAMIANIS *adde* etiam LYONNETIANIS.
- p. X. l. 7. Quo tempore ---- continguntur *lege* Ea experimenta Rupe meliori usus otio, per sex annos iteravi, dilatavi, perfeci a).
- p. XII. l. 18. Longum opus, ut finet ---- exposita habeantur *lege* Hæc anno 1757. 28 April. scripseram. Ab eo tempore annorum pene viginti intervallum aliqua me haud dubie docuit. Nam & ipse interim sex annorum ruficatione Rupensi in dissecandis vivis animalibus, in rimandis pulli incubati phænomenis, in oculorum minutioribus particulis contemplandis, in comparanda cerebri avium, pisciumque fabrica, in primordiis novi animalis per quadrupeda speculandis, in ossium incrementis verlatum sum. Multa etiam & inter ea bona & singularia opera prodierunt. De facultate sentiendi & movendi experimenta in utramque partem capta sunt, pene innumerabilia. Hæc omnia decerpfi, cum meis contuli, si quid inde emendari liceret meorum, si addere non nihil liceret, ea emendavi, aut adieci.

a) *post* 2 Tom. *adde* de quadrupedum conceptione, de monstris.  
Fascic. I. A



Senium ipsum & frequens experimentum, quo convicimur, quam facile sit, receptis opinionibus nimium dare, aut amatis præceptoribus, multa me docuit dediscere, multa, quæ putabam me perspicere, nunc video omnino sola me conjectura attigisse.

Dedi ergo innocentissimo rectiora dicendi desiderio, ut novis curis magnum opus retractarem. Reperi passim, ab ipsam olim necessitate temporum me adductum fuisse, ut eadem repeterem, quæ alio loco jam tractassem. Quando enim de corde scribebam, nondum de cerebro dixeram, nondum experimenta produxeram, quæ non sinunt admittere, cerebellum inter & cordis motum necessarium quoddam vinculum intercedere; oportuit ergo aliqua eorum experimentorum in eo libro tradere, quo de corde scripsi, ut ostenderem, quare de causis moti cordis vitalem cerebelli potentiam removeam.

Has nunc incommodas repetitiones, & sunt plusculæ, licet omnino expungere, & brevibus verbis, dum de corde ago, ad libri X. sectionem IV. remittere, qua agitur de cerebelli functione.

Porro, cum de arteriarum vi contractili agere oporteret, visus sum non nemini, me modo admisisse aliquam, modo dissimilem mei eam vim repudiasse, ut aliis, aliisque hujus operis libris de ea potestate agebam. Hæc nunc objectiones corruent. Apparebit enim, quoties de invisibili arteriarum constrictione agitur, ex solis suis causis probabili, in magnis certe arteriis, fibris muscularibus munitis, eam vim me admittere. Quoties vero de ejusmodi vi contractili agitur, quæ oculis se offerat, quam liceat experimentis conspicuam reddere, toties ejusmodi manifestam potestatem arteriarum reject; & non rejicere non potui, cum tot in experimentis nunquam arteriam contrahi vidissem.

Præfationes adversariorum asperis judiciis oppositas non potui totas omittere, cum extent ALBINI, FRANCISCI LAMURE, aliorumque mihi oppositi libri, & æquum videatur tamdiu me tueri, quamdiu accusor. Multa tamen in brevitate contraxi, & eadem ut erant mitia, etiam mitiora ut essent, vehementer studui. Additamenta suos in locos reposui.

Denique alia insuperabilis ratio me impulit, ut opus meum, quantum ejus fieri posset, in brevitate contraherem, nunquam speraturus, me tanto opere defuncturum, si longum, si priori longius foret. Et placebam tamen mihi in ea spe, minus imperfectum & verius meum opus me daturum, quam dederam hactenus.

Ordinem servavi eundem, & libros perinde trigenta, sed multa contraxi, alia aptiori loco disposui, vere utilis omisi nihil.

Bernæ d. 19. Martii 1706.



## C A T A L O G U S

*nonnullorum Inventorum Auctoris.*

**H**unc catalogum olim anno 1764 edidi, cum ab injustis hominibus, & quod ægrius me habebat, a *Francisco* LAMURE, viro Cl. insimularer, alienis me thesauris divitem esse. Putavi tantam post provocationem licere mihi, quod absque ulla ejusmodi causa ALBINUS fecerat & DOUGLASSIUS, eorum edere catalogum, quæ ipse prior aut rectius vidissem.

## P R O P R I A A U C T O R I S.

Fabrica pene totius corporis animalis ex cellulosa tela, per experimenta evicta *a*).  
Pericardii vera historia & adhæssiones *b*).

Constitutus annulus venosus valvularum cordis continuus *c*), & minutæ earum valvularum affectiones.

Cordis evolutio *d*). Ventriculus sinister primigenius est; post eum sensim dexter subnascitur: auris communis primum extra cor est, tunc in cor retrahitur, & in duas aures discedit.

De cordis motu: non pallere idem *e*), & de aliis ejus affectionibus.

Cordis maxima irritabilitas *f*), & inde natus motus perpetuus, per vim stimuli continuatus.

Experimentum, quo ostenditur, ablato sanguine venoso dextro, sinistras cordis partes supervivere ultimas *g*).

Sanguinis motus non multum tardatur in minimis *h*) vasis per experimenta.

Ponderis vis in sanguinem venosum *i*)

Vasa minima non sunt contractilia *k*).

Vis derivationis & revulsionis *l*).

Motus sanguinis a morte superstes ab attractione natus *m*).

*a*) *Elem.* I. p. 19. 22. Non ita ALBINUS; sed cuique parti suam substantiam esse præter vasa, *Annot.* L. III. p. 15. Mea esse fatetur, non ille æquus mihi, *Marherr Comment.* I. p. 127.

*b*) I pag. 269. seqq.

*c*) *Ann.* 1737. in disp. de mot. sanguin.

*d*) *Ibid.* form. du poulet. T. II. Sect. VI.

*e*) *Oper. min.* p. 171.

*f*) *Oper. min.* T. I. p. 169. in *experim.* & in *Comm. Gott.* T. II.

*g*) *Comm. Gott.* T. I.

*h*) L. VI. p. 195.

*i*) *Oper. min.* T. I. p. 129.

*k*) L. VI. p. 210. *Oper. min.* I. p. 88.

*l*) L. VI. p. 214. post aliqua experimenta *Ant. de Haide.*

*m*) *Oper. min.* I. p. 28. seqq.



Aneurysma verum & varix artificio parari possunt *n*).  
 Major crassities tunicarum arteriosarum a debili sanguinis motu : minor crassities a plethora *o*).  
 Pulsus venosus ab inspirationis viribus *p*) natus, qui sanguinem in pulmones invitat.  
 Pulsus venæ pulmonalis *q*).  
 Musculos intercostales omnes costas levare, demum per experimenta evictum *r*).  
 Costarum rotatio *s*), & reliqua respirationis phænomena exculta.  
 Mammariarum arteriarum rami magni ad diaphragma *t*) dati.  
 Arteriarum intercostalium & mammariarum pulcherrimi annuli, & anastomoses cum vasis thoracicis externis *u*).  
 Trunci quatuor arteriosi thoracici constituti *x*).  
 Aërem nullum esse in thorace *y*) per experimenta ita evici, ut neminis nunc meminerim, qui contrariam opinionem tueatur.  
 Tendines sunt insensiles *z*).  
 Et ligamenta *a*).  
 Et dura cerebri membrana *b*).  
 Cerebri piscium fabrica *b*\*).  
 Arteriæ cerebelli & cerebri pleræque constitutæ *c*).  
 Et arteriæ medullæ spinalis *d*).  
 Emissaria plusscula *d*\*).  
 Constitutus per experimenta motus cerebri, qui respirationi obedit *e*).  
 Cerebelli nulla major dignitas *e*\*), nec callosi corporis *f*).

*n*) *Oper. min.* pag. 85. 99.

*o*) *Oper. min.* p. 88.

*p*) *Conf. L. VI. p. 332. Oper. min. I. p. 131. seqq.*

*q*) *Oper. min. I. p. 144.*

*r*) *Oper. min. T. I. p. 283. seqq.*

*s*) *Ibid. p. 288. seqq.*

*t*) *Fascicul. VI. In venis aliquid simile FALLOPIUS habet.*

*u*) *Ibid.*

*x*) *Ibid.*

*y*) *Oper. min. I. p. 301.*

*z*) *Oper. min. I. p. 332. seqq. Comm. Gott. T. II. p. 113.*

*a*) p. 341.

*b*) p. 345.

*b*\*) *Elem. physiol. IV. fin. Oper. min. T. III.*

*c*) *Fascic. VII.*

*d*) *Ibid.*

*d*\*) *Fascic. I. & Elem. T. IV. p. 166. 167.*

*e*) *Comm. Gott. T. II. & Elem. T. IV. p. 171. &c.*

*e*\*) *Element. T. IV. p. 353.*

*f*\*) *Etiam eo loco.*



# C A T A L O G U S.

Nervi molles ab intercostali g) ganglio primo nati, post aliquas LANCISII voces.  
 Thyreoidea arteria inferior pene tota g\*  
 Vis insita musculorum, per suos limites constituta h).  
 Vis nervosa non eget continuitate cum cerebro h\*  
 Classis musculorum vitalium magis irritabilis, animalium minus h\*\*  
 Vasa vitrei corporis in piscibus i).  
 Et campanula lentis cristallinæ k).  
 Zona ciliaris avium l).  
 Arteria ophthalmica pene tota m).  
 Iris non est irritabilis n).  
 Arteriæ dentales pleræque o).  
 Ductus ad STENONIANUM accessorius p).  
 Sublinguales ductus, longi et breves q).  
 Arteriæ œsophageæ pleræque r).  
     tum palatinæ s).  
     pharyngeæ s\*  
 Ventriculi humani fabrica mulculosa, et stratum fibrarum intimum s\*\*  
 Ventriculi cellulosa telæ post paucas voces priorum t).  
 Omentum colicum u).

g) *Art. maxill. tab. ad fin. Orig. nerv. intercost. n. 17. Elem. T. IV. p. 256.*

g\*) *Fascicul. III.*

h) *Comm. Gott. T. II. Element. IV. p. 449 seqq.*

h\*) *Element. IV. p. 364.*

h\*\*) *Elem. IV. L. XI. sect. II.*

i) *Element. physiol. V. p. 391. 392.*

k) *p. 391.*

l) *Form. du poulet, T. III.*

m) *Fascicul. VII.*

n) *Oper. min. p. 372.*

o) *Tab. art. maxill. et Fascic. VIII. et Elem. T. V. p. 30.*

p) *Fascicul. III. tab. art. labial.*

q) *Element. physiol. VI. p. 48.*

r) *Fascic. III.*

s) *Fascicul. II. tabul. arter. maxillar. Fasc. III. tab. arter. pharyng.*

s\*) *Comm. BOERHAAV. T. II. et Fascicul. III.*

s\*\*) Cl. de FOUCHY *hist. de l'Academ. 1761. p. 32.* Cl. BERTINO tribuit, qui anno 1746, cum de equi ventriculo ageret, eius inventi mentionem fecerit, cum ego anno demum 1751 eadem descripserim. Non recte. Descripsi anno 1747. Voces enim eius editionis *prim. lin. n. 524* eadem sunt cum vocibus editionis anni 1751. Deinde tomus *Commentariorum anni 1746* anno demum 1751 aliquot adeo post meas primas lineas annis prodit: Quæ ita dicta volo, nihil ut inde deceda Cl. BERTINI laudibus.

t) *Elem. T. VI. p. 132.*

u) *Progr. anni 1742.*



Omenti lamina posterior veterum verum est mesocolon x).

Arteriæ pancreaticæ pleræque y).

Vena umbilicalis in fetu z) ramos dat in hepar, qui in homine adulto fiunt  
rami venæ portarum.

Intestinorum tela cellulosa tertia a), post paucas voces priorum.

Mechanismus, quo coeci intestini facies sensim mutatur b).

Valvularum coli mensuræ et varietates c).

Arteriarum capsularium tres classes d).

Uretericæ e).

Hæmorrhoidæ media f).

Perforantes magnæ femoris, utræque præter aliqua priorum g) vestigia.

Articulares genu, præter aliqua verba priorum h).

Anastomoses ramorum superiorum cum inferioribus sub genu præter priorum  
paucas voces i).

Sic arteria tarsea k).

Perforantes tarsi etc. l).

Arteriarum superiorum cubiti cum inferioribus pleræque anastomoses m).

Arcus dorsalis cubiti n).

Arcus carpeus o).

Perforantes carpi p).

Interosseæ dorsales q).

Interosseæ mediæ r).

Herniæ congenitæ: vagina pro teste in fetu præparata s).

Testis in peritonæi cavea est, dum homo in utero geritur s\*).

Vascula efferentia testis; et rete testis t) cellulosum vasculosumque.

x) Progr. anni 1742.

y) Fascicul. II. et Elem. T. VII p. 131. seqq.

z) De fetu bicipite anno 1739 tum in prim. lin. n. 833.

a) Prim. lin. n. 705.

b) Prim. lin. n. 730.

c) Progr. anni 1742.

d) Fascicul. III.

e) Ibid.

f) Fascic. IV.

g) Fascicul. V.

h) p. 23.

i) Ibid.

k) Ibid.

l) Ibid.

m) Fascicul. VI.

n) Ibid.

o) Ibid.

p) Ibid.

q) Ibid.

r) Ibid.

s) Progr. anni 1749. Elem. physiol. T. VI. p. 373. T. VII. et opusc. path. p. 53.

s\*) Ibid.

t) Progr. anno 1745. edit. et in Phil. Transact. tum in Elem. physiol. T. VII.



Vesicula seminalis est intestinum ramosum *u*).

Corpus luteum oritur ex conceptione *x*), neque prius paratum adest.

Urachus est ductus ad vesicam usque apertus, quem replere facile fit *y*).

Foraminis ovalis et ductus arteriosi proportionem, et causa commutationis *z*).

Fetus sero apparet, eiusque in quadrupedibus prima phaenomena *z*\*), inque avibus *z*\*\*).

Fabrica vitelli *a*).

Incrementa ossium *b*).

Mutatio ex gelu, rimæ, opacitas etc. *c*).

Vasa ossis longa *d*).

Circuli vasculosi *e*).

Hemisphaerium vasculosum *f*).

Vascula cartilaginea intima *g*).

Formatio partis alveolaris *h*), ossis.

Et nuclei ossei *i*).

Hæc omnia fusius exponuntur in *Iconibus anatomicis*, quarum ab a. 1741 ad 1756 octo fasciculi Gottingæ prodierunt, tum in *operibus anatomicis minoribus* Lausannæ 4 a. 1767 et 1768 editis, multo plenioribus, quam in Gallicis editionibus. Hos libros rogo, ut Lector hoc nostro cum opere conferre velit.

*Commentarii* in BOERHAAVII Prælectiones ab anno 1739 ad 1744 editæ pertinent ad tempora definienda diversarum a PRÆCEPTORE opinionum, sensim a me receptarum, si contuleris cum primis lineis physiologiæ anno 1747 et 1765 Gottingæ excusis.

*u*) Progr. anno 1745 edit. et in *Phil. Transact.* tum in *Elem. phys.* T. VII.

*x*) *Præf.* ad T. II. operis BUFFONIANI versionem germanicam.

*y*) *Prim. lin.* n. 837.

*z*) *Progr. de valv. EUSTACHIAN.* in *Fascicul. IV.* tum *Elem.* T. VIII.

*z*\*) *Oper. min.* T. III.

*z*\*\*) T. II.

*a*) *Ibid. Sect.* XI.

*b*) *Traité de l'accroissement des os.*

*c*) *Ibid.*

*d*) *Sect.* VI.

*e*) *Ibid.*

*f*) *Ibid.*

*g*) p. 101. etc.

*h*) *Sect.* V.

*i*) *Ibid.*



DE PRÆCIPUIS  
CORP. HUMANI PART. FUNCTIONIBUS.  
LIBER PRIMUS.  
CORPORIS HUMANI ELEMENTA.

## SECTIO I.

## FIBRA

P Ag. 2. l. 13. etiam *lege* forte etiam

ibid. l. 16. *dele* pilos

ibid. l. 20. *post* Kaauw BOERHAAVE *b)* *adde*. Hoc est flamen primum, ex quo epidermis, epithelium, ungues, pili, demum totum corpus formatur *h\*)*. Aliter visum fuerat Ill. ALBINO, qui cuique corporis parti suam propriam naturam esse docuit *h\*\*)*. Mihi quidem de cerebro dubium superest, et de universa medulla nervosa, de reliquo corpore nullum videtur dubium esse, nisi forte fibræ musculari alia natura est.

ibid. l. 24 Solidum elementum terra est--HENKELIO auctore *lege* Solidum elementum terra est, de calcario genere *i)*, aliquantum tamen diversa, quod in calcem vivam non abeat, quod cum acore in nullum salem medium combinetur, quod cum spiritu salis in gelatinam coëat, quod cum acore vitriolico non ferveat, quod ab aceto nihil patiatur, quod a nitroso acore lente solvatur, quod difficulter vitrescat, et demum in lacteum opacum vitrum convertatur *k)*.

p. 3. l. 2. aëri *lege* ævi

ibid. l. 6. nuper *lege* anno 1751.

ibid. l. 24. *post* ENHÖRNING *adde* de Episcopi corpore quinque seculis, ut videbatur, superstite, auctor vitæ LUDOVICI XI. Delphini.

p. 4. l. 2. *post* observantur *adde* Huc pertinet nuperum elegans experimentum. De capillo annulus suspenditur; igne absque aëris motu capillus in cinerem redigitur; sustinetur de cinere hætenus annulus, tamen ut cadat, si minimus motus

*h\*)* Gorter Chirurg. n. 289.

*h\*\*)* Nat. Homin. p. 36.

*k)* *lege* HENKELII Flora Saturniz. etc.



motus accesserit. Apparet absque vinculo glutinis levissimum esse nexum elementorum terreorum.

p. 4. l. 8. *post* parcius *adde* Quod eo promptius admittas, cum in ligni cineribus ubique reperiatur.

ibid. l. 17. *post* Bruta *adde* in cornu cervi usto cum oleo cocto, soliditatem recuperante; mechanicæ enim cylindrorum cohæiones docent, quæ obtinentur aqua interfusa, et etiam magis oleo.

p. 5. l. 9. *post* efficit *adde* et duæ tertiæ partes ossis diffiantur.

ibid. l. 13. *post* BERTIN *adde* Incredibile est, in primis initiis gelatinosi ossis, quam parva squamula de integro femore in experimentis nostris superfuerit.

ibid. l. 24. *post* superfit *adde* Sed etiam gluten ex ossibus obtinetur, acore superfuso, deinde lixivio, ut terra fundum petat.

p. 6. l. 2. Idem fere ostendit --- interpositum conservet *l.* Sed etiam fréquens est membranarum in gelatinam conversio, et vicissim gelatinæ in membranas. Ipsa sponte gelatina fila trahit; ex albuminosa parte sanguinis agitando fila parantur et membranæ, quod alibi repetemus, et frequentissime ex gelatinosa aquula pericardii, cavique pectoris verissimæ membranæ nascuntur, quibus pulmo ad pleuram revincitur. Morbus stridulus, quem Scoti *Croup* vocant, a muco solo in aspera arteria in membranam spuriam coacto provenit.

Vicissim in gelatinam membranæ resolvuntur. Ipsa vis morbi ventriculi et intestinorum aliasque membranas in gelatinam resolvit. Ichthyocolla, quæ ipsa est interior tunica vesicæ natatoriæ, cum aqua et cum debilli frumenti spiritu in gluten abit.

ibid. l. 20. *post* aperuit *adde* deinde ego, inde nuperi Angli in physiologiam receperunt.

p. 7. l. 7. *post* nequit *adde* Nuper video in hac mea theoria et glutinis aquosi atque oleosi vim elementa terrea colligantem viris Cl. displicere, et aërem. Nihil horum meum est. Aërem apud Cl. STEPHANUM HALES inveneram, eo utique usus, dum ab aliis physiologiæ scriptoribus negligebatur, gluten ipsius est BOERHAAVII.

Sed neque causam video, cur a sententia recedam. Esse in fibra aquam et oleum, certum est: ex his elementis gluten fieri, certum est, eo præsentem elementa terrea coniungi, eo utcumque destructo discedere, perinde certum est. Particulæ terræ non videntur se trahere sibi relictæ; nam et in gypso,

pag. 6. Not. h. *adde* URBANUS HIÆRNE sulphur habebat pro præcipuo corporum vinculo. *Ant. laborator.* p. 90.



et in calce moleculae durissimorum lapidum in pollinem non cohaerentem abeunt, idemque gypsum in lapidem continuo redit, quando aqua amissa ei reddita est.

De aëre ne verbulum addo: frequentissima nostra ævo in aëre fixo experimenta fiunt, neque ullum est ex millenis, quin confirmet, nullum corpus in elementa dilabi, nisi is aër per ignem, per putredinem, aut aliam aliquam violentiam fuerit abactus. Neque ullum corpus putrescit, quin aër prius secedat *m\**). In ossibus parciorem esse *m\*\**) novi. Non ignoro claros viros esse, qui hanc aëris efficaciam reiiciant *m\*\*\**). Neque tamen video, cur reiiciant.

ibid. l. 18. *dele* Idem est stamen solidum IOH. V. GORTER, Celeberrimi nunc Russiæ Archiatri, cum nota huc spectante.

p. 8. l. 15. *post* contrahit *adde* Non ideo nulla fibræ vis contractilis est: inest et in vivo animali, et in mortuo, etiam in sicca cute, in animalium intestinis certe in elasticas chordas contortis. Dum humecta est, fibra se contrahit minus rapide, quam muscularis fibra, ut minori ad longitudinem suam ratione decurtetur: sed dudum sicca membrana discissa se retrahit, chorda vero etiam validissime se convolvit. Id volo, ferrum enim non sentire fibræ, telam cellulosa, membranæ, neque perinde adeo, ut muscularis fibra, conspicua pollere irritabilitate.

ibid. l. 20. *post* descendant *adde* Putredo aëri fixo naturam elasticam, et levitatem reddit, qua corpus reddit natatile, in quo evolvitur.

ibid. l. 24. *post* oculo *adde* squamas cartilaginum.

## S E C T I O II.

### T E L A C E L L U L O S A.

**P** ag. 9. l. 9. *lege* carotidem sub cranio illigat.

p. 10. l. 15. *post* agnovit *adde* Nuperiora sunt de hac membrana THEOPHILI de BORDEU, ejusque affectuum merita, qui textum fere mucosum dixerunt. Mireris autem omnino, cum tanto nuperior sit aut me, aut SCHÖBINGERO, ei viro adeo magno consensu Gallos tribuisse, quæ nos non solum vidimus priores, sed diximus: mea enim experimenta prius, ut æquum est, facta, anno 1747 in *primis physiologiæ lineis* descripta sunt.

*m\*)* BERTHOLET de l'air.

*m\*\*)* WIEGLEB von der Gahrung, p. 130.

*m\*\*\*)* BERTHOLET, SMETH de aëre fixo.



pag. 10. l. 14. notissimam lege notissimum

ibid. l. 21. externa lege interna

ibid. l. 24. arachnoideæ nomine --- amplectitur; lege arachnoideam inter et  
piam membranam cerebri et cerebelli exterior piam amplectitur.

p. 11. l. 1. lege fibram carneam ullam, liberam arteriam ullam q\*) etc.

ibid. l. 8. lege totum vasorum, nervorumque fasciculum ad etc.

p. 12. l. 1. aquam lege mucum

ibid. l. 4. post lignum adde Sed etiam vasa plantarum teneriorum certe et  
juniorum cellulosa tela replentur. In cristis et palcaribus avium similis, sed  
sanguinem receptura, subest cellulositas. Demum in ossibus planis mani-  
festo ostendimus cellulosum rete, quod ossi pro fundamento est, quod idem  
limpha in areolas deposita abit in gelatinosam cartilaginem, terra vero in  
eadem spatiola effusa in os u\*). In ossibus longis eandem fabricam Cl. HERIS-  
SANT ostendit, et demum in testis u\*\*).

ibid. l. 21. post secedat adde Legas ipsum ursum huius arcani artificii non igna-  
rum esse, et cadavera inflare y\*), ut cutis decedat.

ibid. l. 26. post facit adde Demum nuper scriptum est, Nigritas oræ Dentariæ,  
ut rheumatismo medeantur, cutem bono eventu sufflare, idque auxilium  
etiam Belgas bono eventu imitatos esse c\*).

p. 13. l. ult. post MANN adde ex vulnere frontis emphysema ad abdomen con-  
tinuatum f\*).

p. 14. l. 5. post BEGGI adde Aqua in abdomen animalis impulsa ipsam inter  
duram, piamque matrem apparet u\*).

ibid. l. 29. post effluxerunt adde Qui toto corpore tumebat, is norat eum hu-  
morem totum in maiorem oculi angulum compellere e\*).

pag. 10. not. o. adde Conf. de his vaginis BORDEU tissu muqueux p. 45.

q\*) GORTER l. c. In panno libera, neque connexa fuisse cum albugine a SCHULZE  
et SCHAFNER mechn. cur. vuln. Sed ego manifesto cellulosam telam, eamque pinguem  
circumiectam vidi.

u\*) Mem. sur la struct. des os. CRUWEL osteogenes. Qui flatum de cellula in cellulam tran-  
sisse vidit.

u\*\*) In Mem. de l'Academie des scienc. etc.

p. 10. ad verbum distendet in textu adde not. Cl. ABADIE nuper experimenta fecit, aërem  
adegit in cellulosam telam; ita emphysema natum est, quod abdomen, faciem, palpebras, femo-  
ra, pulmones, pericardium, lienem, universum corpus occupavit.

y\*) KALM resa II. p. 246.

c\*) GALANDAT Mem. de l'academ. de Berlin 1772.

f\*) GOOCH Wounds, p. 292.

u\*) ABADIE.

e\*) ROBERT traité de méd. l. p. 15.



p. 16. l. 2. *post* PAREUS *adde* In homine porro videas per eandem telam cellulofam aquam moveri, quæ circa talum effusa, oedema fecerit. Ea quotidie per stationem, ambulationem, et calorem ascendit ad suram, peneque ad genu surgit, non ultra, nisi cum periculo. Eadem nocturnam per quietem latius diffusa evanescit. Neque rarum est, in pectore collectum humorem per pediluvia, sponteve sua ad pedes præcipitatum, levamen facere respirationis, per nocturnum decubitum stationem circa pectus repetere, et suffocationem minari. Hæ sunt viæ arcanæ, per quas abscessus moventur, absque vasculis, per quæ humor fluat, etsi jam eo ævo aliqui ea vascula vidisse voluerunt, CÆLIO dicti y\*).

Per cellulofam telam in plantis vasa y\*\*) omnia moventur, non ideo in homine, uti nuper paradoxo viri HARVEIANO per vasa circuitui iter per cellulofam telam substituere conati sunt.

ibid. l. 4. *post* capite *adde* Omnes membranæ extus cellulosæ sunt z\*).

ibid. l. 8. *retro lege pone.*

ibid. l. 29. Obscuriora alia interim-- solo a pondere *lege* Prima causa motus adipis per cellulofam telam est vis mortua cellulosæ telæ, cuius quodque filum, quævis lamina, in contractionem nititur, spatiola fibris, laminisque interposita arctat, ita humorem eo premit, ubi minor est resistantia.

Accedit huic vi compressio muscutorum, dum in contractione turgent, et spatia cellulosa sibi interposita comprimunt. Cutis ipsa lenta vi mortua contrahitur, et adipi distendenti resistit, eumque reprimat. Arteriæ, quibus cellulosa tela undique percurritur, et quæ in quoque pulsu vaginas suas, et circumiectam cellulofam telam comprimunt, adipem et ipsæ urgent. Denique pondus humorum eos regit, ut vel tumor vespertinus pedum demonstrat, et matutina detumescencia in oedematibus, et levamen insigne z\*\*).

Ab humorum motu per cellulofam telam impedito obstructions, et abscessus fieri nuperi z\*\*\*) docuerunt. Lentissima vero ea mala esse ex lento motu apparet, cui sufflaminato debentur.

p. 17. l. 9. *post* possunt *adde* Et hætenus omnino ad temperamentorum causas, firmique aut debilis staminis discrimen cellulosa tela spectat. Induratur eadem, et inter causas est præcipuas non rugarum solum, quæ senii sunt indices, sed senii ipsius, quod suo ostenditur loco. Adeo duram fuisse vidi,

y\*) Chron. V. p. 10. 587.

y\*\*) fluida haud dubie legendum est. Not. editor. hui. auctar.

z\*) BONN. continuat. membranar.

z\*\*) p. 33.

z\*\*\*) BORDEY tiffu muqueux, p. 66.

q) *post* 230 *adde* In canibus SARCONE II. p. 259.



sola femora in curvitatē contraheret, artumque fecerit obstipum, cum nulla alia mali causa conspicua adesset.

Quare *tonum*, quem STAHLIUS tanti facit, in tela cellulosa residere tuto ponas, quæ vasis circumposita ea constringit, et comprimit, et vicissim a dilatatis suos per humores vasis ipsa urgetur. Inde illa, quæ in ranis faciebam, aneurysmata, cum cellulosam telam delerem, quæ arterias mesenterii ambit.

Hanc telæ cellulosæ vim contractilem, et potestatem robur fibræ muscularis in nuperi a\*) vulgo agnoscunt a\*\*).

pag. 18. l. 5. *dele* Valvula coli intestini---ipsa evanescit *cum nota huc spectante*.

ibid. l. 20. *post. efficiat adde* aut demum pro sanguinis et receptaculo, et motore, et præparante organo.

ibid. l. 24. *post. adscripsit adde* Non sentire iam GALENUS vidit, neque ei sensus tribui debet, qui transeuntium nervorum est. Si propter nervos sensilem esse reclamaveris, nihil ages, nisi quod cellulosæ telæ tribuas, id quod fatearis nervi esse l\*). Qui omnia alia a nostris docere malunt, in principio suo parum sentire fatentur, in aponeurosibus magis l\*\*). A pia vero meninge oriri, aut cum ea continuari non video l\*\*\*), utique cum dura membrana.

## S E C T I O III.

## M E M B R A N Æ.

- P** Ag. 19. l. 7. *post* reperio *adde* Nunc hæc vulgo nota sunt, et recepta.  
 p. 20. l. 26. *post* separare *adde* Sed etiam putredo utrum in cellulosam naturam restituit.  
 p. 21. l. 7. *post* sodalibus *adde* Eædem duræ, perque morbum natæ cystides pariter macerando, aut putredine in priorem cellulosam naturam, originis suæ non immemores, revertuntur.

a\*) Laborat certe hæc periodus quodam vitio; ego legerem: *et potestatem robur fibræ muscularis augendi nuperi vulgo agnoscunt*; nam hæc, si quid ego hic iudico, BORDEVII, la CAZII etc. mens est. Not. editor. hui. auctar.

a\*\*) La CAZE, BORDEV, ROBERT, FABRE. Mihi tribuit Cl. MAKITTRICK, *practice* p. 38.

c) *lege* Coriago in qua pellis ossibus hæret, COLUMELL. L. VI.

l\*) BORDEU *tissu muqueux*.

l\*\*) La CAZE.

l\*\*\*) Idem.

pag. 22. not. y. *post* 164. *adde* ACRELL *chir. handelsf.* p. 107.



ibid. l. 24. dudum *lege* ante quinquaginta annos

ibid. l. 31. *lege* ut in strumarum membranis, in ovarii, in lienis involucre frequens est.

ibid. l. 32. *lege* idoneos interim testes

pag. 22. l. 4. *post* differunt *adde* Demum satis nunc constat, ossa fieri duplici parte, tela cellulosa cum vasis sanguineis, et materia calcarea inorganica, in eas cellulas effusa, ut possit cellulosa natura ossi reddi, si acido aliquo liquore calx illa deleta fuerat *a\*)*).

ibid. l. 13. Is enim, uti monui, *lege* Medula enim nervosa, uti monui etc.

ibid. l. 15. *post* prodita *adde* quo anno, post multa experimenta mea, in primis physiol. lineis hanc fabricam membranaceam descripsi:

ibid. l. 27. *post* receperunt *adde* et nunc fere omnes.

p. 23. l. 4. *lege* Eam clarius proposuerunt EDMUNDUS KING et JOSEPHUS DUVERNEY etc.

p. 24. l. 6. *post* non est *adde* Nuper demum, etiam microscopio acerrimo adiutus, I. B. a TORRE fila cellulosa vasa esse defendit.

ibid. l. 7. nuper *lege* ante viginti annos.

ibid. l. 8. *dele* nunc a paucis retro mensibus.

ibid. l. 19. *post* viscerum *adde* Non ergo universum corpus vasis fieri.

p. 25. l. 6. *post* secant *adde* A vasorum natura fila cellulosa longe distant, quæ brevissima sunt, multo latiora, vasculis, truncos non habent, neque ramos. ALBINUS porro, ne quis criminetur, me ad consensum magni viri provocare, qui longe a me diffideat, hactenus contraria meorum constanter docuit, ut cuique parti corporis humani proprium esse, sui que generis, stamen defenderet. Mihi vero, præter fibram musculosam, et medullarem nihil occurrit, satis notis dotibus a cellulosa tela diversum.

## S E C T I O I V.

### A D E P S.

**P** Ag. 25. l. 12. *post* attrahuntque *adde* Nunquam autem potui in his cellulis discrimen videre, nisi volueris laxiorem telam, magisque vicinam cuti adi-

p. 22. a) *lege* Cl. FOUGEROUX.

a\*) III. de la SONE in Comm. Acad. Reg. Scient. Paris. ann. 1751.

p. 22. h) *post* 46 *adde* et SARCONE *Vajuolo* p. 67. 68. Mihi tribuit inventum non blandus homo in T. I. *pralect.* p. 128. Cl. MARHERR. Huc et LÆSEKE *physiol.* p. 21. et ROBERT *pet. ver.*

p. 75. et fere Cl. VAN GEUNS *de vita*

posam vocare, et cellulosa nomen ei servare, quæ filis fere absque laminis fiat, eademque tota macilenta sit. Nam et certus sum, adiposa laxa spatia cum tenerrimis filorum intervallis communicare, ut aer de pectoris vulnere exiens inter oculi tunicas sibi viam aperiat, et gelatinam perinde in adiposis magnis cellulis vidi, natium exemplo, ut in tenerioribus spatiosis.

pag. 25. l. 24. *post* distinguit *adde* quem nuper et aliqui Angli sequuntur.

p. 26. l. 19. *post* HOFMANNO *adde* Sic insectis pinguedo rotundis fere globulis fit.

p. 27. l. 5. *lege* absque conspicuo adipe.

ibid. l. ead. verticales *lege* calvæ subiectas.

ibid. l. 7. In piscibus tamen marinis-- cerebrum nata *lege* Neque enim hic de adipe mihi sermo est, qui plurimus ad ignem de cerebro stillat: et quod oleum in piscibus duram inter cerebri matrem, et cerebrum plurimum reperitur, id a cerebri humani natura in universum longe diversum est.

p. 28. l. 2. *lege* et buccinatorem etc.

p. 29. l. 7. *post* amisit *adde* In avibus aquaticis, et in struthio camelo fluidus adeps est, ut huc illuc concutiendo agi, et omnis per unum cutis vulnus educi possit. In urso, certe boreali, pene fluidus est. Fulica fluidum oleum in faciem hostium expuit.

ibid. l. 10. *post* incipit *adde* cui tamen mollior, quam aliis herbivoris, adeps est.

ibid. l. 15. *post* CARDANUS *adde* Quibus totus adeps sebaceus est.

ibid. l. 22. *post* cogitur *adde* Femur militis in cartilagineum pene adipem degenerans nuper descripsit I. WILDRICK l\*)

p. 30. lin. 2. *post*, transit *adde* Insectorum adeps granosus est o\*).

ibid. lin. 11. *post*. fervet *adde* Maiori calore bovis adeps eget, ut fluat, minori equi adeps; iterum minori felis, ut animalis carnivori.

ibid. l. 13. *post*. fluit *adde* et in morbis malignis perinde olei in modum manat.

ibid. l. 15. *post*. corrosurus *adde* Nupera aliqua per experimenta Neapoli facta valde volatilis, totus visus est de vitris diffusi, ut etiam per poros transisse videretur.

p. 31. l. 18. viridem *lege* rubrum.

p. 32. l. 12. *lege* quare adeps et medulla ferō putrescat.

ibid. l. 13. quod *lege* cuius pars.

l\*) Hedend. letter-Oefening. IV. n. 2.

o\*) CAROL. DE GEER Mem. pour servir à l'histoire des insectes, II. p. 2. p. 713.



pag. 32. l. 15. *post experimenta adde* Magnam partem adipis in pus abiisse, nuper SCHREBERUS vidit z\*), et de parte puris fatetur BORDEU, etsi succos albuminosos admisceri pinguibus non repugno.

p. 36. l. 13. *post conatu adde* impulsus.

p. 37. l. 24. *post dedi adde* Ex mensibus repressis, in scorbuto frequens est, sanguinem macularum specie per universam corporis superficiem effundi, et denique manare, et sub epidermide passim, et per internas vesiculæ fellæ, ventriculi, et intestinorum membranas. Latius etiam effundi vidi aliquoties aut a dato arsenico, aut a repetito usu antimonii emetici, ut late in ventriculo sub tunica musculari in cellulosa secunda sanguis effusus rubentes \*) in manibus consisteret.

p. 38. l. 21. *post oberrat adde* quod sæpe vidi, et suo loco dicam.

ibid. l. 24. *post contigit adde* mihi que ægre sperabilis videtur.

ibid. l. 26. *post* RUYCHIIUS *adde* In urina, quæ de sanguine secedit, adeps minime rarus est, in renum tabe, et in lue venerea.

p. 39. l. 8. *post animi adde* et tranquillitas r\*).

ibid. l. 14. *post* notum est *adde* Sic boves, quibus fatigatis ossa absque medulla fuerant, eam quiete recuperant.

ibid. l. 22. *post* arcentur *adde* Veteribus modus erat notissimus, quo corpora redderent ex aridis luculenta. Ferulis percutiebant eas partes, quas volebant crassescere e\*). Id ad laxatam telam cellulosa refero.

ibid. l. ult. *post* rapidæ sint *adde* Qui obesissimus obiit, virili tamen demum ætate id adipis incrementum senserat e\*\*).

p. 40. l. 9. *post* saginant *adde* Alii venæ sectioni purgationem addunt h\*).

ibid. l. 20. *post* congerat *adde* Potentius etiam adeps obesitatem adiuvat l\*).

p. 41. l. 13. *post* plenum est *adde* Opium etiam in aqua dissolutum, et sub cutem impulsus, soporem excitavit quem solet per os assumptum, ut vim stuporiferam in venas resorberi necesse sit p\*). Adeo vehemens huius medicamenti actio in venis fuit, ut eam superaret, quam deglutitum exercet, et bestiolam occideret.

Aër ipse sub cutem inflatus, aut in experimento, aut per vulnus, post aliquot dies, resorbetur et evanescit.

pag.

z\*) p. 559. (*Abbildungen der Saugthiere*, ut equidem opinor; nam ipse liber ad manus non est. Not. edit. hui. auct.)

\*) *Videtur rubens legendum esse*. Not. edit. hui. auct.

r\*) FARRE *inquiry* 310.

e\*) GALEN. *meth. med.* XIV. c. 16.

e\*\*) BORDEU *malad. chroniques*.

h\*\*) SLOANE *voy. to Jam.* préf. pag. LXXXIV.

l\*\*) HEWSON *inquiries*, p. 127.

p\*) MONRO *Ess. phys. and litter.* III. p. 319.

pag. 41. l. 21. *post* testimonio *adde* In Islandia sebum ovibus iter facientibus disparere adeo vulgo notum est, ut de decem sebi libris quotidie selibram decedere lege statuatur *y*\*).

Universi succi armentorum pariter per æstum factum exhauriuntur *y*\*\*).

p. 42. l. 5. *dele* aut. in abdomen non modicas in glebas coagulabilis effunditur.

ibid. l. 11. *post* documentum est *adde* Nuper hæc a non nemine *h*\*) rejici non ignoro, videntur tamen certa habere testimonia. Sed in abdomen etiam adipem effundi RUYSCHIIUS, idoneus testis est, quando equi vehementi cursu defatigati fuerunt. (Huc etiam spectat not. *g* ).

ibid. l. 23. *post* adeps est *adde* Boves a lue epidemica, quæ maligna peripneumonia putridi ingenii est *i*\*), & oves ab hepatis corruptela misere emaciantur, ut ne medulla quidem in ossibus supersit. A dysenteria subito adeps disparuit *i*\*\*), & in diarrhoea pingui bovum, quæ in Gebennis sæviit. A copia puris, a longa gonorrhoea, enormen macilentiam FACUNDINUS ANGELINUS vidit *i*\*\*\*).

ibid. l. ead. *dele* Ergo.

ibid. l. ult. *post* ossibus *adde* Colica pictonum carnem omnem consumsit *o*\*), ut solæ membranæ superessent.

p. 43. l. 6. *post* natarent *adde* perinde ut equis, sed & vomitu idem rejectus est *u*\*).

ibid. l. 10. *post* hydrargyri *adde* & saponis, a quo 28 libris hominem lego leviolem factum.

ibid. l. ult. *post* inanes sunt *adde* Mures montani, quando auctumno quieti sedant obesi, macilenti de latibulis prodeunt, sic ursi & testudines.

p. 44. l. 2. *dele* Non inde continuo --- certe resum.

p. 45. l. 23. *post* denudatis *adde* deinde in peste Massiliensi idonei testes.

p. 46. l. 15. pectorali lege peritonæi

ibid. l. ead. *dele* prior illa

*y*\*) OLAFSEN I. p. 189.

*y*\*\*) LISLE *agricult.* II. p. 10.

*h*\*) *post* 57. *adde* Adipi similem materiem esse. GUERINIERE *Ecole de Cavall.* II. p. 150.

*h*\*) GARSULT, p. 205.

*i*\*) SAUVAGES *sur les malad. des bestiaux*, p. 112.

*i*\*\*) DEGNER p. 18.

*i*\*\*\*) *Venæ scēl.* p. 28.

*m*) lege LISTER *de variol.*

*o*\*) de HAEN *colic. picē.* p. 110.

*u*\*) GESNER *Samml.* I. p. 177.

p. 48. excitavimus in textu *adde* not *t*\*) Id. p. 85.

*Fascic. I.*



pag. 48. l. 6. *post* reparent *adde* Vifa enim sunt animalia cum sua pinguedine de latebris prodiisse, & ipsi subinde urfi.

p. 49. l. 6 *lege* ab ullo quadrupedis osse &c.

ibid. l. ead. *post* crediderim *adde* Leonis ossa, contra veterum opinionem, habent medullam *b\*)*. Onocrotalo nullam esse, & in aliis avibus, alte volantibus, certum est, quarum ossa aëre replere necessarium fuerit. Nulla in testudine erat, causam ignoro *b\*\*)*.

ibid. l. 12. *post* ostendetur *adde* In ossibus enim fere meram lixiviosam naturam reperimus.

p. 50. l. 19. *post* 500 *adde* 565, 569

ibid. l. 11. *post* 600 *adde* & 609 & demum ad 800

ibid. l. ead. *post* ad *adde* 2540 *r\*)*

ibid. l. 12. *post* 2800 *adde* & 3520 *t\*)*

ibid. l. ead. *post* pondus est *adde* Sus non magnum animal supra 600 libras *t\*\*)*.

ibid. l. 20. *lege* vivi suis

p. 51. l. 19. *post* vidit *adde* In femore duro adipe pleno muscoli evanuerunt *i\*)*

ibid. l. 24. *post* scripsi *adde* Pluscula autem sunt exempla hominum, quibus adipis vis fibras musculares ita elisit, ut lacerti in fibras dissoluti quasi evanescerent *l\*)*. In fetibus, quibus artus superflui aliqui accesserunt, frequenter pro carne merus adeps repertus est.

p. 52. l. 1. *lege* nimis sæpe

ibid. l. ult. *in fine* *adde* atque renum ulcus.

*b\*)* L. a CAPOA *raggionam*. V. p. 153.

*b\*\*)* CALDESI *delle tart*.

p. 49. not. c) *lege* 119.

*r\*)* STATIUS MÜLLER *suppl*.

*t\*)* YOUNG *Eastour* p. 81.

*t\*\*)* MÜLLER *ib*.

p. 51. not. i) *post* defectu *adde* & in *Eph. Nat. Cur.* Vol. V. Obs. 149.

*l\*)* WILDRICK *Hedend. letter-Oefen*. V. 2.

*i\*)* *Verhand. der Holl. Maatschapp. T. XLII. 2. Mémoires présentés à l'Acad. des sciences;*

T. VI. p. 391.

# ELEMENTORUM PHYSIOLOGIÆ

## LIBER SECUNDUS.

### VASA.

#### SECTIO I.

##### ARTERIÆ.

**P** ag. 53. l. 12. Nam *lege* Num  
 ibid. l. 13. sunt *lege* sint  
 ibid. l. 14. *post* fluunt *adde* de eo nuper dubitatum est.  
 ibid. l. 26. De plurimis nunc omnino insectis---parallela includantur *lege*  
 Vasa quidem in multis insectis Cl. viri viderunt, in ephemerae branchiis, &  
 in alio insecto Ill. de GEER b). Vidit in verme marino, nereide, & arterio-  
 sa vasa, & venosa Ill. MÜLLERUS c), vidit in cochlea LISTERUS. In cimice  
 vas universi corporis longitudine, ramosum LEBERMÜLLERUS depinxit c\*),  
 et in capite chrysalidis c\*\*), & in serpentulo aquatico c\*\*\*): in animalculis  
 hepatis ovilli vascula adesse videntur, etiam in BIDLOI iconibus expressa.

Neque ideo potest dissimulari, post multa vasorum ramosorum in insectis  
 visorum testimonia, valde fiduciam nostram a Petro LYONNET ct) labe-  
 factari, qui admirabili industria erucæ anatomen descripsit. Diserte enim  
 negat, se vasa veri nominis in hoc animali vidisse, qui plenissime tantillæ be-  
 stiolæ fabricam persecutus sit. Nullum certe sanguinis circulum in multis  
 animalibus esse. Ill. FONTANÆ est sententia ct†): neque negari potest, in  
 multis vermibus aquaticis cor longum conspicuum esse, nullos tamen ra-  
 mos conspicuos inde provenire. Sic alter peritus insectorum contemplator  
 negavit, se aut in rotifero animalculo, aut in insectis vasa reperire ct††).  
 Eam litem senex & infirmus conficere nequeo.

b) *lege* *Memoir*. II. P. 2. p. 647. 697.

c) *lege* *Wasserwürmer*, T. VI.

c\*) *Microsc. Belust.* II. T. etc.

c\*\*) *Belustig.* II. T. 75.

c\*\*\*) *Ib.* III. T. 27.

ct) *Chenille du Saule.*

ct†) *Viper.* p. 146. 147. etc.

ct††) SPALANZANI *Opuscoli* II.



Id tamen video, quoties alii docti viri corpus aliquod viderunt, non viderunt alii, in universum affirmantium partes potiores esse. Facilius enim oculos aliquid fugerit, exiguum potissimum, quam se obtruserit, quod nullum fuerit.

pag. 50. l. ult. *dele* in anulis

pag. 54. l. 7. *post* inesse *adde* Et in universum nulla esse vasa putes, ubi cor nullum est.

p. 55. l. 22. *pressione lege* æqualibus *pressionibus*

ibid. l. penult. *dele* quod

ibid. l. ult. *lege* reprimeretur

ibid. l. ead. *dele* exemplo aortæ in lumbis & pectore

ibid. l. ead. *lege* quod

p. 56. l. 5. *lege* Venosa in dura meninge receptacula

ibid. l. 10. *lege* quam primum cera repletur

ibid. l. 17. *lege* aneurysmatum verorum

p. 57. l. 6. *lege* & in exitu de pericardio reperio.

ibid. l. 10. *lege* Petrus SENAC, & *adde* in salamandra vir perspicax Laz. SPA-  
LANZANUS,

p. 58. l. 20. quæ *lege* quare

ibid. l. 21. decrescunt *lege* decrescant

ibid. l. 28. *post* ratione *adde* Demum si aliqua sedes arteriæ a corde remotior multo, quam ea, laxior fuerit, quæ cordi continuatur, fieri utique poterit, ut arteria eo latior sit, quo longius a corde recedit; id mihi in pulli aorta visum est, qui ovo continetur, cujus aorta alba & firma ex corde prodit, in abdomine laxa, rubra & debilis est, & mihi latior videtur.

p. 59. l. 2. *adde* Erit & his locus.

p. 61. l. 1. *dele* absque pinguedine

ibid. l. 11. *post* redditur *adde* quam remotis cellulosis filis in rectitudinem restituas.

p. 63. l. 8. *adde* In majoribus animalibus, ut aliæ, ita hæc cellulosa tela tendineam faciem habet.

p. 65. l. 16. *adde* ab Alex, MONRO sen. 1\*)

pag. 55. not. y) *adde* POLEN. *epist. mathemat.*

pag. 56. not. a) *adde* Mem. de Berlin. 1755. p. 34.

pag. 62. not. b) Tom. leg. Tab.

pag. 64. not. x) *adde* Oper. min. I. p. 229.

ibid. not. y) *adde* Oper. min. I. p. 375. seqq.

1\*) ALBINI nomen in nova editione omissum est, quod tamen equidem typographi incuria potius, quam Auctoris suasu factum putaverim. Not. editor. hui. auctar.

pag. 65. l. 17. *post* intiman *adde* potissimum

pag. 68. l. 17. A cellulosis filis hæc vascula undique revinciuntur,

ibid. l. 24. *adde* a capsularibus

ibid. l. 26. *post* ubique *adde* in brachio, & pede ex brachialibus & cruralibus.

p. 69. l. 26. *lege* five in tertiam quinti paris propaginem se immittit *m*).

p. 70. l. 7. debilis *lege* debilior

ibid. l. 9. *post* demonstravit *adde* Sensu arterias olim carere GALENUS, & nostro ævo satis consentitur carere.

ibid. l. 10. *post* portione *adde* nervos

ibid. l. 11. *post* colligi potest *adde* & ex parvitate lacertulorum musculoformum, quos adeunt

ibid. l. 13. *lege* dum arteriam solam, & absque nervo, vinculo adstringebam *n*).

ibid. l. 15. *adde* Arterias minores, & arterias animalium frigidorum, musculosis fibris destitutas, nulli stimulo obsequi omnino videtur. Quis enim musculosam vim in arteria admittet, ubi nullus sit musculus.

ibid. l. 26. *post* collabitur *adde* aut certe lumen apertum arteriæ diminuitur, demumque claudi putatur *p*\*).

p. 72. l. 10. *adde* Nondum tamen inde evictum erit, num elateri soli obediant, num omnino ad musculorum nondum constringantur. Certum enim est, multis a morte diebus arteriam, dum humida sit, ite se contrahere, ut incisa ceram mollem, qua repleta fuerit, expellat, quæ vermiculi specie per vulnus prodit,

Quare experimenta oportet conquirere, per quæ de hac lite definiatur. Nunc si de conspicua contractione quæritur, quæ ferro etiam, aut alia irritatione mechanica cieatur, mea quidem experimenta arteriam ad omnes eos stimulos furdam faciunt.

In arteriis majoribus, potissimum etiam cōrdi continuis & vicinis contractionem facilius admittas. Non vidi, non vidit Ill. CALDANUS, non Cl. JADELOT *l*\*), non alii curiosi viri. Vidit tamen Cl. VERSCHUUR sæpe quidem furdas ad stimulum arterias, nonnunquam tamen obsequiosas, ut ferro, veneno, scintilla electrica percussa, erosa, incisa, vossella demum comprehensa arteria se constringat. Huc etiam experimenta referas SPALANZANI & VERSCHUURII, in quibus, dum diffecabatur, arteria se contraxit.

p. 67. not. *h*) Tom. *lege* Tab.

p. 70. not. *n*) *adde* Idem est testimonium Cl. BROMFIELD *chir. obs.* p. 162. FOUTEAU & olim GALENUS add FONTANA *Mem.* p. 261.

*p*\*) ATKIN & WHITE ad quartam partem KIRKLAND.

p. 71. not. *c*\*) *adde* In *oper. min.* I. exper. 219. ad 230.

*l*\*) *Journ. med.* 1773. Févr. & in libello,



Ex ea ergo lege, quæ affirmantium experimenta paribus negantium experimentis potiora statuit, putes, in arteriis magnis, quarum fibræ circulares manifestæ sint, vim esse insitam; non perpetuo conspicuam, non alacrem, non validam, quæ sit paucarum fibrarum, sed aliquam tamen, si omnino, ut ego quidem malo credere, experimenta Cl. Juvenis absque partium studio, & absque videndæ contractionis cupidine instituta sunt. Bulbus certæ aortæ pulli, qui in ovo est, manifesto contrahitur.

Deinde si quærat de contractili vi inconspicua, quæ oculis se ob debilitatem non offerat, ut tamen ad eam admittendam ex causis suis te deduci patiaris, omnino ubicunque fibræ sunt musculares, ibi vim contractilem esse putes, cum absque ea fibra musculosa cogitari nequeat, etiam quando ejus teneritudo, & debilitas conspicuo motui ciendo non sufficit.

Pleraque frigidorum animalium arterias omnino tamen vi contractili destitui videtur \*). Centies vidi, incisam subtili ictu lanceolæ arteriam aliquam mesenterii sanguinem profudisse: nunquam autem ea rima ullo modo aut se contraxit, aut vicissim retractis labiis hiare visa est. Nobiscum sentiunt SPALANZANUS & GALENUS (\*\*). Sed hæ arteriæ, ut in parva bestiola, sunt de maximis (\*\*\*).

Convulsionum, quas non raro nuperi arteriis tribuerunt, nullum certum testimonium extrahit. Sic inflammationem (\*\*\*\*) a spasmodica contractione vasorum minimorum derivarunt, contractionem ab acribus: verum hypothesein utique docuerunt, experimenta ei e directo contraria videntur prætervidisse.

pag. 72. l. 19. lege, Archiater Regius.

p. 73. l. 4 lege & aliquando inferius pondere libr. 131. unciarum 10.

p. 74. l. 13. lege quæ se facilius extendi patiuntur.

ibid. l. 20. post apparet adde Neque absque exemplo est, eo loco aortam, etiam absque ulla prægressa dilatatione, ruptam fuisse. Sed etiam femorales arteriæ, & coronaria, & varii rami carotidis, etiam in facie, passim rupti fuisse leguntur. In varioloso corpore arterias coronarias ruptas vidit III. LIEUTAUD p\*). Deinde arteriæ flexuosæ facilius ab aneurysmate distinduntur p\*\*).

\*) Legendum est, ut opinor, Plerorumque frigidorum animalium arteriæ omnino tamen contractili vi destitutæ videntur. Not. edit. hui. auctar.

\*\*) De tubulis capillaribus, Ingolstadt. 1774. (GABLER videtur in textu legendum esse. Not. edit. hui. auctar.)

\*\*) Oper. min. I. p. 88. experimenta omnino 14.

\*\*\*\*) WHITT nervous disorders, p. 63. 227.

p\*) Sepulchr. II. p. 20. v.

p\*\*) RIUMI obs. 10.

ut splenicæ p\*\*\*), & eadem rumpitur p\*\*\*\*): sic aneurysma tibialis arteriæ ruptum p†). Animalibus in univcrsum multo robustiores arteriæ sunt, quam homini, majoribus potissimum, ut vasa exigua testis equini pene cartilaginea sint duritie. In ipso tamen equo frequentia sunt arteriæ mesentericæ aneurysmata p††), & idem sanguinem per nares, os, & penem amittit p†††).

p. 75. l. 28. *post ostendi possunt adde* Ipse demum cartilaginum ipsarum epiphyseos intimis arteriis trium generum vidi, quarum aliæ ex arteriis rectis corporis ossis per hemisphærium vasculosum in cartilagineum epiphyseos late penetrant: aliæ ex nucleo osseo undique exeunt, cum prioribus inosculatæ: aliæ demum ex arteriis superficialibus per puteolos in epiphysin se demergunt.

p. 76. l. 7. *dele* ex multis

ibid. l. 21. *lege* subjectum os

p. 77. l. 22. *adde* quæ in animalibus, & demum in plantis pariter dominatur.

p. 78. l. 11. *post* 102740 *adde* nimiam, cum aorta oriens in adulto certe homine aliquando latior sit;

p. 79. l. 15. 133 *lege* 123.

p. 80. l. 3. *lege* Petrus SENAC

p. 81. l. 17. *post* posuit *adde* qui 23 divisiones sibi sumit

ibid. p. 25. *adde* Ultimæ arteriæ diameter facile definitur, quæ paulo major sit globulo sanguineo, paulo inquam, cum nonnunquam hi globuli ægre per arteriam minimam viam sibi aperire videantur: globuli sanguinei diametrum alibi dicemus.

p. 82. l. 4. *lege* purgando in femirectos abeunt.

ibid. l. penult. *lege* sub angulo

p. 84. l. 10. *post* oculares *adde* Ita post curatum aneurysma, & ligatam arteriam brachii, cum ramus aliquis minor, trunci nunc dignitatem consecutus, sanguinem omnem a corde ad manum veheret, is ramus mire flexuosus factus est, qui prius rectus erat. Ita uteri arteriæ in virguncula rectæ, in femina nunc adulta flexuosæ sunt.

p\*\*\*) Giorn. de' letter. XI. n. 1. BEAUSSIER Journ. med. 1770. Févr.

p\*\*\*\*) Giorn. de' lett. l. c. et sanguis funesto eventu in abdomen effusus: iterum eadem post pulsationes hypochondriorum rupta, Att. fificocrit. II. p. 196.

p†) WEIZ Auszüge, IV.

p††) BOURGELAT Elem. d'Hippiatr. p. 316.

p†††) SIND Stallmeister, p. 376.

p. 81. not. e) *lege* SAUVAGES de inflammatione, p. 218.

ib. not. g) *lege* p. 21.



pag. 85. l. 15. *lege* perspicitur

ibid. l. 16. *post* quæ *adde* ab initio arteriæ ad finem

ibid. l. 28. *adde* Non repugnat, ruptionem arteriarum & hæmorrhagias per has ipsas flexiones caveri.

p. 86. l. 12. tum in homine ---- in unicum truncum coeunt, *lege* In avibus ex arteria pulmonali duo, non unus, ductus arteriosi in aortam descendunt, & alter post alterum inferitur. In piscibus frigidis duo aortæ trunci in descendentem aortam uniuntur. In homine porro arteria parietalis, minor equidem, coalescit ex ramo arteriæ temporalis, & ex alio ramo arteriæ occipitalis, in trunculum, qui per foramen parietale furculum in duram cerebri matrem mittit *d*\*). Vertebrales arteriæ, notissima in ponte Varoliano unione, in unum communem truncum conflunt.

p. 87. l. 16. *adde* Hi frequentes arcus, quibus dextri trunci cum sinistris late coalescunt, faciunt, ne possis nuperorum mediastinum, duasve corporis humani distinctas medietates admittere. Id unum in ea hypothese verum est, quod in vertebis, inque sterno, anastomoses dextra inter & sinistra vasa angustiores sint, interque minores ramos, ubique tamen innumerabiles sunt, & in ossæ sacro latiores.

p. 88. l. 10. Neque decuerat obscuriores esse *lege* Minus notæ sunt.

p. 95. l. 3. *adde* Nuper demum *Lazarus* SPALANZANUS suis hæc experimentis confirmavit. Vidit in animalibus frigidis modo plusculas arterias in unam venam confluere: modo, ut in branchiis salamandræ aquaticæ, arteriam reflexam in venam abire unici globuli capacem: in cauda salamandræ alias arteriam venæ parallelam in eam transversos ramos mittere, & ramulum arteriæ in venulam reflexum abire. Vidit sanguinis modo unicum globulum ex rubra arteria in primam venam transire: modo quatuor & quinque globulorum capax vasculum ab arteriam in venam continuari.

ibid. l. 8. *post* fuerint *adde* Primum reperio *Dominicum* de MARCHETTIS aquam de arteria in venam urfisse.

p. 96. l. 11. *lege* Columna aquæ undecim pedum incumbens fecit

ibid. l. 12. idem Auctor *lege* Ill. HALES

p. 97. l. 13. *post* liquores *adde* de vasis

pag.

pag. 86 not. d) spectat ad verba: Duo tranci majores ---- in unam arteriam dorsalem confluit.

*d*\*) JANKE *foramin. calvar.*

pag. 88. recurrunt in *textu* *adde* not. o\*). Vide has arterias in TREWII lib. de *aneurysmate*, apud LUDWIG de *varietat. vasor.* POHL *obs. angiolog. de arter.* WHITE *cases*, Journ. de medec. XXIX. p. 456.

p. 92. not. q) *adde* C. II. nempe in jecore, renibus, liene, pulmone.

pag. 97. l. 27. *adde* Cur vero cautus vir alioquin B. F. ALBINUS anastomoses arteriarum cum venis a ratione, ab experimentis, ab autopsia refutari: a microscopio, & ab injectione vero vix confirmari scripserit *t*\*), nondum omnino video.

p. 98. l. 12. *post* habeat *adde* Vidi in ranarum mesenterio, & SPALANZANUS vidit *a*\*).

ibid. l. 19. *adde* Verum de re alibi quæretur.

p. 99. l. ult. *adde* Cl. MECKELIO idem eventus non successit.

p. 100. l. ult. *lege* continuatum

p. 101. l. 5. *adde* Sudor sanguineus minime in frequens *n*\*). In universas cellulosas tellas in scorbutico *n*\*\*). cruor exit.

ibid. l. 8. *lege* Paucissimas

ibid. l. 13. *adde* In febre regionum fervidarum CARLI ipse per os, nares & aures *p*\*) sanguinem amisit.

ibid. l. penult. *post* causis *adde* incitatus

p. 102. l. 20. *delle* papillæ, quæ mammæ præponitur.

ibid. l. 23. *lege* Secundi generis exhalatio, in qua

p. 103. l. 13. *adde* Vasa exhalantia angulum cum vase, in quod sanguis impellitur, obtusum facere Cl. SWEDIAVER, cum resorbentque obtusus est, nescio an ad naturam *b*\*).

p. 105. l. 20. *post* erumpebat *adde* Eadem sanguinis effusiones peculiarem febris flavæ characterem constituunt.

p. 106. l. ult. *post* secuti sunt *adde* A thermarum usu in rheumatismo, cum bonis ægri rebus, globuli sanguinei undique de cute exsudarunt: & in æstuoso Africa aëre idem sudor collegæ nostro Cl. ADANSONIO molestus erupit.

*t*\*) Nat. hom. p. 32.

*a*\*) Mot. sangu. p. 41, 53.

p. 99. not. i) *lege* obs. 17.

p. 100. not. g) *lege* 168.

p. 101. not. h) *adde* Lacrumæ sanguine tinctæ infantis Fr. TRENEK *disp.* Witteb. 1768.

*n*\*) ESCHENBACH *obs.* p. 42.

*n*\*\*) LIND *fever and infect.* p. 285.

p. 101. not. p) *adde* LIND *health of seamen*, ed. 1774. p. 55. & olim LABADIE *de la peste* per os, nares, aures, uterum, penem, oculos, sudorem, venam ruptam, varicem ruptum, mammas fluxisse vidit sanguinem.

*p*\*) *Rilaz. del viagg.*

p. 102. not. u) *lege* L. penultimo, quo

*b*\*) In *disp. de thesaur. anat.* n. 59



pag. 107. l. 18. *adde* Sanguinem per porum faciei in formosa & docta virgine exsiliisse novi, alii per digitorum, perque cutis capillatæ poros.

p. 109. l. 4. *adde* Ex arteria spermatica liquorem in vasa aquosa trajici apud SOGRAPHUM c\*).

ibid. l. 9. *adde* & a nobis.

p. 110. l. 9 *post* Nempe *adde* omisiss venis per totum corpus exsanguibus, quas EMPEDOCLES dixit.

p. 111. l. 16. *lege* inflammato eodem

ibid. l. 22. *lege* arteriæ

p. 112. l. 20. *adde* SKETONO o\*), BRAMBILLÆ o\*\*), aliis

ibid. l. 25. eo *lege* quoque

ibid. l. 27. eos *lege* tenues

p. 113. l. 4. *lege* in vasa rubris minora

p. 114. l. 6. *lege* Sed ne hos quidem globulos satis tenues esse pergebat,

ibid. l. 23. *post* lentis *adde* rubrum succum vehere probabile fit

p. 116. l. 3. *adde* Deinde cum in piscibus, inque cephalo facilius, vasorum pulcherrimorum rete contemplerer, quod vitreum corpus ambit, manifesto vidi, nudo oculo inconspicuum, idem tamen microscopio adhibito non solum facile distingui, & a trunculo centralis retinæ arteriæ per utramque vitreæ membranæ convexitatem numerosissimis ramis spargi: sed veris rubris vasis fieri, quæ pallent, & tamen rubros omnino globulos vehunt. Quare omnino nullo errore loci opus est, ubi vasa pene pellucida oculum fugiebant, ut nunc rubra vasa sint: sufficit aut acriorem oculum adhibere, aut sanguinis aliquando plus in ea vasa urgere, quæ dudum, sed parcum sanguinem vehabant.

p. 117. l. 12. per *lege* præter

ibid. l. 21. *post* videntur *adde* sive venas potius claudi putes, ut refluxus sanguinis inhibeatur, dum a corde acriter sanguis per arteriam urgetur.

p. 118. l. 27. *post* venire *adde* qui ne prima quidem & flava sine illata violentia subire possit.

p. 119. l. 11. *urgentis lege* urgente

ibid. l. 24. quæ *lege* quare ea

ibid. l. 29. decimas *lege* vigesimas

p. 108. not. q) *adde* alter finis arteriæ est in vas lymphaticum PARENT. dialoq. p. 55. c\*) Theor. lymph.

o\*) De ophthalm.

o\*\*) De phlegmone p. 13.

p. 112. not. r) *adde* BRAMBILLÆ.

## S E C T I O II.

## V E N Æ.

**P** Ag. 121. l. 5. *post* exoriens *adde* In nereide & magna arteria, & eadem in venam reflexa adest cum suis ramis venosis c\*\*),

ibid. l. 6. *adde* astaco.

ibid. l. 8. *post* arteriarum *adde* si omnino nobis licet in fabrica insectorum arterias nobis sumere d\*\*).

p. 122. l. 2. *post* haberent *adde* nempe, ut putabant, hepar:

ibid. l. 21. spinas nervosa *lege* spinam dorsalem

p. 123. l. 12. *post* cylindricæ sint *adde* Unicum enim globulum certissime vehunt, ut in rete venoso mesenterii ranæ & bufonis manifestissime vidi f\*), uti SPALANZANUS pariter vidit

ibid. l. 14. aut *lege* ut

ibid. l. ead. Facillime autem --- apparent *lege* Cylindricas ergo necesse est, quarum constans mensura globulus sit g). Longe cylindricæ sunt venæ potissimum cutaneæ, quæ magnum spatium absque ramis emetiuntur, saphenæ, cephalicæ, hepaticæ exemplo.

ibid. l. 24. *lege* ea insigniter minus est

p. 124. l. 11. *lege* virorum.

ibid. l. 23. *lege* sanguinis congestione

p. 125. l. 2. Uti vero contractio ---- longitudinem sequuntur *lege* Inde, in nuperioribus experimentis, etiam in vena pulmonali contractionem vidi, quæ cum diastole alternas vices servaret.

In nulla alia vena aut sponte, aut per irritationem, excitatum motum vidi, tot in experimentis. Qui vidit, ab irritatione natum, in jugulari, aliisque venis Cl. VERSCHUUR, fatetur sæpe tamen sibi nullam apparuisse. Quare memor, me fibras carneas in venis nullas reperire, nondum ausim modum aliquem insitum in venis recipere. In animalibus frigidis nulla demum venarum vis est contractilis, si a cava recedas. A veneno quidem chemico tactæ atque constringuntur: verum ea contractio non pertinet ad motum vita-

c\*\*) PALLAS *miscell.* p. 130. MÜLLERUS venam & arteriam habet *Wasserwürmer*

p. 126.

d\*\*) vid. *Auct. ad. Libr. II. Sect. I. p. 19.*

p. 121. not. i) *adde* *Somn. & vigil.*

f\*) *De mot. sangu.* 15.



lem musculofum, qui perinde integris a vera morte diebus elapsis excitatur, dum vena humecta fit.

pag. 125. l. 14. *lege* Huic iterum extimæ membranæ

ibid. l. 15. Huic membranæ --- pariter, *lege* Magnæ venæ alicui membranæ incumbunt, ut pleuræ, pericardio, peritonæo: ea membranæ pariter,

ibid. l. 18. *lege* deferturam continuo venam, quando ea musculus adiit, aut viscus.

p. 126. l. 3. Quæ de venarum irritabilitate hoc loco Auctor dixit, in nova editione defunt.

ibid. l. 27. *lege* quæ ad crassitiem &c.

ibid. l. 28. *lege* ad suum pariter fluidum comparata, in ea ratione est, quæ est &c.

p. 128. l. 15. *lege* sanguinem

ibid. l. 17. *dele* & millecuplo

ibid. l. ead. *post* auctiorem *adde* Varix in cubito capiti humano æqualis *m*\*).

p. 129. l. 20. *lege* arterias

ibid. l. ult. In minime deformi --- ruptam fuisse *deest* in nova editione.

p. 130. l. 3. *post* hæmorrhagia *adde* ut nuper in domestica femina vidi. A retentis mensibus vena saphena *g*\*), poplitea & cutaneæ venæ & aliæ, etiam cum bonis agræ rebus, rumpuntur. Frequenter satis reperi, venam cavam in pericardio *g*\*\*), & alibi, & supra hepar, tum saphenas, iliacas, venam portarum dissiluisse. CAROLUS XI cum amico ab urso periclanti subvenire properaret, venam rupit *g*\*\*\*). Ex rupta vena mors inter choreas, sanguine in abdomen effuso *g*\*\*\*\*).

ibid. l. 5. *post* mors *adde* Sic a vena cava *k*\*), saphena *k*\*\*), iliaca *k*\*\*\*).

ibid. l. penult. *post* impetu *adde* nata.

p. 131. l. 12. *post* visa est *adde* & in diversis exemplis fuit aorta 52, vena cava 57, aorta 15, vena cava 25, vena cava 56, aorta 41.

*m*\*) *Med. obs. and enquir.*

pag. 129. not. e) hæc *lege* hic *§* *adde* Act. Mogunt. p. 531. Ceterum hæc nota spectat ad verba: Venarum ruptiones --- citabo.

ibid. not. f) 278 *lege* 78.

*g*\*) FABRIC. *Sciagraph. Butisbac.* p. 16. WEPPEL. *Apoplex.* p. 26.

*g*\*\*) SALZMANN in disp.

*g*\*\*\*) ROBINSON, p. 238.

*g*\*\*\*\*) SMET. *miscell. L. X.*

*k*\*) Petrus ORTESCHI *Giornale di medic.* II. p. 217. sub diaphragmate, HÆN

XI. p. 2.

*k*\*\*) *Journ. med.* 1762.

*k*\*\*\*) TARGIONI *Obs.* 45.

- pag. 131. l. 20. *post* 16 ad 9 *adde* alias cum parva esset 55 ad 52.
- p. 132. l. 9. *dele* Arteriæ cruralis rationem---rationem sesquialteram.
- ibid. l. 18. *adde* & alias diam. & 103 ut 33 ad 14.
- ibid. l. 23. *lege* renalem venam finistram
- ibid. l. ult. *post* 16 *adde* uti 22 ad 35
- p. 133. l. 24. *adde* Minimæ venæ arteriis non majores sunt, neque potuerunt, cum arteriolæ & venulæ, ut certo vidi, unicum globulum transmittant.
- p. 134. l. antepen. quo venæ, *lege* venæ in quo
- ibid. l. penult. potuerint *lege* non possent.
- p. 135. l. 28. *Verbis*, „In universum, venæ mihi minus &c. “*nova orditur paragraphus, quæ* „Alia discrimina “*inscripta est.*
- p. 136. l. 17. *lege* In venis
- p. 138. l. 1. *post* rejecit *adde* Hippolytus boscos negat se reperisse.
- ibid. l. 14. *post* fuit *adde* Anno clololxxxii sibi visas esse Henricus SMETIUS.
- p. 139. l. 12. *lege* prima
- ibid. l. 21. *dele* & in valvulis--inprimis breviora.
- ibid. l. 22. *lege* cum antiquiori littera C. comparata
- ibid. l. 28. *post* lacerari *adde* eas,
- ibid. l. 29. *post* valvulas *adde* laceras
- p. 140. l. 1. et minori de circulo *lege* & pars minoris circuli
- p. 146. l. penult. *lege* raro
- p. 147. l. 9. *lege* pari
- ibid. l. ead. *dele* Deinde non adeo--apparent
- p. 148. l. 2. *lege* vel ab eo remotiores
- ibid. l. 7. *lege* In venis intercostalibus
- ibid. l. 16. *lege* sed nec in homine
- p. 150. l. 20. *adde* & ductus galactophori mammarum.
- ibid. l. 22. *lege* eos frustra &c.
- p. 151. l. 4. *post* caveis *adde* ex ipsis vesiculis feminalibus s\*)
- ibid. l. 13. *post* ostendemus *adde* Sed etiam ex cellulosa tela undique venæ resorbent. Primum enim a venis in eam cellulosam telam via liberrima est, in quas impulsæ aqua facillime, tamen etiam sebum calidum, adeps porcinus, hydrargyrus, gluten piscium, aer demum viam sibi aperiat t\*).
- Eam autem viam a cellulis in venas ducere, natura ipsa venæ demonstrat, quam alibi evincemus, et quæ a corporis ambitu ad cor, non unquam con-



rio ducta humoribus vehendis patet. Deinde sanguis non resorbetur solum ex cellulosa tela, sed in sanguinis viam redit, quæ certe per venas solas ducit.

p. 151. l. 14. *dele* Ex cellulosa tela--facta sunt.

ibid. l. 16. Sed etiam *lege* Primum

ibid. l. 20. *post* lapsu *adde* effusi

ibid. l. 27. *lege* Deinde in sanguinis massam resorptum humorem recipi apparet, cum ab universali fustigatione &c.

ibid. l. 29. est *lege* sit

ibid. l. ead. ut *lege* &

p. 152. l. 7. *adde* ei adeo opii resorpta.

ibid. l. 15. *lege* per quam humor de iis &c.

ibid. l. 17. *adde* aut per paracentesin.

ibid. l. 21. *post* fecerat *adde* Mulsam pectori impulsam per lotium prodidisse  
SANCTORIUS auctor est

ibid. l. 22. *adde* & TANARON

p. 153 l. 16. *adde* Rupta vero vasa esse, quæ aquam injectam sinant transsudare, quæ HEWSONI est conjectura, omnino non possum admittere. Centies post injectam aquam ceraceum ego liquamen in vasa exhalantia urfi, neque eam viam unquam secutum est, neque in magnas caveas exiit, quo exivisset utique, si aqua, ruptis vasis, ei viam aperuisset.

p. 153. l. 18. *lege* sanguini

p. 154. l. 2. *post* jugularibus *adde* Eo quidem hoc experimento uti nolim, quod neque Cl. HEWSONO nuper successerit, neque mihi, ut omnino nihil a ligata jugulari vena in cane superstitite evenisse viderim. Certa vero sunt, quæ nunc dico.

ibid. l. 9. *post* redire posset *adde* Polypum cordis cum hydrope frequentissime conjungi reperi.

ibid. l. 19. *post* secutus *adde* & nuper juniorem HUNTERUM

p. 155. l. *lege* ut in cerebro & oculo.

ibid. l. 9. *post* humoris *adde* oculi

ibid. l. 12. *adde* Oleum terebinthinæ ex vesiculis feminalibus resorbetur in venas rubras d\*), in venas lymphaticas nequaquam.

p. 156. l. 3. *lege* aërem per venas jubent inflare & *adde* Neque hæ communicationes ruptis vasis imputari possunt. Hydrargyrus enim, qui ex venis in lactea vasa transit, omnino nunquam in ea vascula penetraffet, si quicquam ruptum invenisset, quem certum sit, ut cogor repetere, quæ comperi, quo-

d\*) MECKEL obs. nov. de vaf. lymph.

ties aliquid in vasis violatum est, quæ replet, certissime in maximas guttas effundi.

pag. 156. l. 5 Verum experimenta quidem---nunc continuo dicetur *lege*  
An ut tenuiores arteriæ, ita venæ dantur seriferæ aliæ? Ita non solus BOER-  
HAAVIUS, sed difficilis ceterum in controversis admittendis ALBINUS *m*\*).  
*Ceterum paragraphus hujus sectionis ultima, in qua de venarum in arterias*  
*mutatione agitur, a nova editione abest.*

## S E C T I O III.

## V A S A L Y M P H A T I C A.

**P**ag. 157. l. 5. nondum *lege* nuper  
ibid. l. ead. *dele* satis  
ibid. l. ead. vestigia *lege* series  
ibid. l. 6. sunt *lege* est,  
ibid. l. 10. *post* BARTHOLINUS *adde* SWAMMERDAMIUS in Gallinæ abdomine  
vas lymphaticum vidit.  
ibid. l. 19. Quare de quadrupedibus--- nondum satis certo innotuit *lege* Ve-  
rum-nuper demum vasa lymphatica, vasa lactea, quæ ad eam classem perti-  
nent, & ductus thoracicus in avibus, in testudine, ut animali oviparo frigi-  
do, demum in piscibus frigidis, asellis etiam potissimum, ostensa sunt, &  
delineata. De gloria nobilis inventi lis est MONROUM inter junioem & *Gui-*  
*lielmum* HEWSON, quorum ille vasa aquosa jam a. 1758 in avibus, & a.  
1760 in raja pisce vidit: iste in utraque classe plene descripta dedit *u*\*).  
p. 158. l. 22 *lege* 1649.  
p. 160. l. 21. *post* communicatas *adde* *Messi Aureæ*.  
ibid. l. 23. *adde* Neque auctori *entretiens en forme de préface* multum tribuas,  
qui BOURDELOTO lymphatica vasa tribuit, inventa cum lactea quæreret,  
ut RUDBECKIUS tres post menses, postquam a BOURDELOTO audiverat. *b*\*),  
ea viderit.

*m*\*) Nat. hom. 29. Probabile videri.

p. 155. not. g) *post* aquos *adde* SOGRAPHI *lymph.* p. XII.

p. 156. not. k) *adde* SOGRAPH. p. XI. XIV. facilius, qui per arterias.

*u*\*) *Expsr. Inquir.* T. II. 1774. 8.

*b*\*) GALLOIS, p. 51. 52.

p. 151. not. r) *lege* 298.



p. 160. l. 19. *adde* Porro *Olaus* WORM in epistola posthuma 1017 die V. Nov. clcclcliii de novo invento Sueci ait, quod expectet, & eum tractatum se accepisse ex Suecia in epist. 1019 d. xiii lan. clcclcliv agnoscit, nulla BARTHOLINI, nepotis sui, mentione facta.

ibid. l. 23. *post* possidemus *adde* Multæ enim partes corporis sunt, in quibus vasa lymphatica nemo vidit, aliæ, ubi & raro quisquam, & cum dubio aliquo.

p. 164. l. 7. *post* cellulosa tela *adde* Ill. MECKELIUS passim ad eorum historiam aliqua addidit, tum *Alex. MONRO* fil. & potissimum *Guil. HEWSON*, qui multas novas ex humano corpore tabulas dedit, etiam in artubus, & in his non sola cuti vicina vasa, sed etiam profunda, neque prius dicta.

ibid. l. 20. *lege* Multis locis numerosæ sunt, &c.

p. 165. l. 2. *post* animalis *adde* interioris

ibid. l. 4. *post* SCHMIEDEL *adde* In liene sub membrana communi. Vasa lymphatica glandulas inter jugulares & venam subclaviam, alia a cellulosa tela orientia absque valvulis sunt MECKEL.

ibid. l. 6. *adde* Quare non bene ubique quasi articulata pinguntur, quæ cylindrica sunt, & demum in nodulos assurgunt, quando a liquore retento distenduntur.

ibid. l. 23. *lege* Vasa lymphatica satis valida sunt, ut ne a magno quidem hydrargyri pondere facile rumpantur.

Ne, quæ cohærent &c.

ibid. l. 25. *post* superare *adde* Exemta de animali mortuo, & in tabulam disposita, contrahuntur vi mortua adeo valide, ut retractus ex trunco hydrargyrus vasa rumpat. Sed etiam in vivo animali, aut nuper mortuo, non solus ductus thoracicus, qui vere &c.

p. 166. l. 13. *post* repleri possint *adde* Quæ quidem mihi adeo manifesta videntur, ut dubia contra experimenta mota refutare non videatur necesse.

ibid. l. 18. *post* inflentur *adde* Vasa galactophora mammæ cum vasis lymphaticis, aliquando tamen minus libere, quam per venas communicant.

p. 167. l. 9. *post* fuisset *adde* A sugillatione, cum dissecaretur, lympham rubello colore tinctam fuisse ASTRUC vidit. Hæc vasa lymphatica melius in cadavere ostendi, quod puffedinis vim senserat, a qua cellulosa spatiola grandescunt, aëre turgida.

Morbos addunt videri per vasa lymphatica transferri. Nam a veneno venereo bubones inguinales nasci, a cancroso veneno vicinas glandulas axillares turgescere, a cantharidibus admotis in vicinia tumores dolentes natos esse in glandulis ejus generis.

Hæc

Hæc omnia admitto, neque recuso vasa lymphatica esse resorbentium vasorum systema, quæ de cellulosa tela, & de magnis caveis liquorem sorbeant, neque ea ab arteriis continuantur. Hæc, quæ olim GLISSONII, nuper J. HUNTERI, Alex. MONROI & Guilielmi HEWSON theoria est.

p. 167. l. 19. *adde* in teste conquassato liquorem ex arteriis primo in cellulosam telam exire, inde in vasa lymphatica iidem Cl. viri. In liene eundem eventum reperi, postquam vasa rupta fuerant. In ea hypothese id solum desidero, quod omnis resorptio solis aquosis vasis reservetur, & quod iisdem caveis omnis cum vasis rubris continuatio negetur. De ista diximus *b\*)*, & certe novimus, nulla arteria fracta, nullo liquore extra vasa effuso, tamen per arterias vasa lymphatica, ipsumque thoracicum ductum repletum fuisse. Venas verro rubras & de cellulosa tela, & de magnis caveis sorbere, per sua experimenta mihi evictum videtur.

Cum præterea vapor effusus in cerebri ventriculis, & in medullæ spinalis infundibulo resorberi debeat, & tamen ea tota in amplissima regione nullum vas lymphaticum unquam detectum sit, nullum pariter in tota facie, (exiguo circa aures tractu excepto), in cute capillata capitis, in tota amplissima cute dorsi, cum demum in artubus exigua, quæ reperiuntur, vasa lymphatica nullo modo resorptioni ex amplissima cellulosa sede sufficere videantur. Resorptio venarum rubrarum evicta videtur.

ibid. l. 25. *post* KAAUWIUS *adde* sibi tamen notum,

p. 168. l. 5. *lege* hydropicis

ibid. l. 10. *adde* Ex minoribus etiam caveis in vasa lymphatica via patet, potissimum ex feminalibus vesiculis.

ibid. l. 11. *post* venis *adde* pellucida

p. 169. l. 3. *post* auctoris *adde* sententia.

p. 170. l. 4. *dele* me -

p. 171. l. 13. *adde* His Guil. HEWSON varia addidit. In artubus alia vasa aquosa superficialia sunt, & subcutanea, a digitis in parte dorsali ascendentia, comitantia musculum tibiale anteriorem; & alia in parte flexoria inter tibiam & tendinem internum musculi gastrocnemii. Valvulas habent, subeunt nonnullas glandulas, & inde ad inguinales veniunt, & ibi cum vasis a genitalibus venientibus communicant. Plexum faciunt, & abdomen subeunt sub tendine obliqui interni.

*b\*)* p. 152.

p. 168. not. g) *lege* p. 180. & *adde* Hydrops ex scirrhis pene omnium viscerum, BOSE Progr. 1776.



Alia vasa profunda inter musculos comitantur arteriam tibialem posteriorem, inde cruralem, cum ea tricipitem musculum perforant, & in glandulas inguinales veniunt, ubi cum superficialibus miscentur.

p. 172. l. 11. *adde* in plexum inguinalem se immittunt.

ibid. l. 13. *post vesica adde & circa veru montanum n\*).*

ibid. l. 15. *post* accedunt hypogastricam fere arteriam comitantur.

ibid. l. 18. *adde* Rami aliqui hujus plexus, qui vasa iliaca comitatur, plexum in osse sacro faciunt.

p. 173. l. 14. retro ipsam aortam *lege* pone ipsam aortam & *adde* Ea demum conveniunt in secunda vertebra lumborum, inque ductum thoracicum uniuntur.

ibid. l. 17. *post* veniunt *adde*, pone ejus arteriam & pone aortam,

ibid. l. 20. atque hepate nata *lege* alia a liene orta, quæ ejus arteriam comitantur.

ibid. l. ead. *dele* Ea vel in unicum --- plerique scriptores tuentur.

ibid. l. 24. *adde* Alia in curvatura minori coronariam arteriam sequentia, alia in majori, propeminorem curvaturam duodeni cum iisdem conjuncta, reteque facientia, denique & cum vasis lienis, & vesiculæ felleæ, & hepatis unita. Ex hepate nempe concavo ea vasa & ad truncum cœliacæ arteriæ confluant, & una in thoracicum ductum abeunt: dum ea, quæ in convexa sede hepatis sunt, aliqua per ligamentum sinistrum ad ductum thoracicum tendunt.

p. 174. l. 2. *lege* aut duo majusculi canales

p. 175. l. 5. *adde* posteriora quidem fere medio in pectore thoracico ductui inserta; anteriora in angulum venam inter jugularem & subclavium dextrî lateris, HEWSONO auctore.

ibid. l. 16. *dele* quæ inguinalium -- glandulas tendunt

ibid. l. 19. *lege* inserta, & *adde* Deinde Cl. HAGEN in brachio oedematoso vasa lymphatica, eaque prægrandia & flexuosa vidit c\*)

ibid. l. ead. *post obscura adde* Iterum hic Cl. HEWSONUS & superficiei propiora vasa aquosa vidit, & in parte flexoria brachii, & in extensoria, quæ etiam, perforato ligamento interosseo, communicant, & ad glandulas demum axillares veniunt.

Ibi conjunguntur cum vasis profundis arteriam radialem, & procul dubio ulnarem & interosseam, comitantia.

n\*) Rete ea fede depinxit Cl. WATSON *Phil. Trans.* V. LIX. 1. 2.

c\*) *Wahrnehmung.* p. 27.

Ex utrisque in glandulis axillaribus plexus fit, qui in dextro latere in angulum inter venam jugularem & subclaviam fere inferitur, cum vasis aquosis pulmonis & colli.

In latere sinistro in ductum thoracicum, vel in subclavium HEWSON.

Hæc brachii vasa aliquando in venæ sectione pertusa molestissima & diuturna lymphæ profluvia faciunt, quale & ipse vidi.

p. 176. l. 15. Utriusque generis --- dedit J. H. PAULI *lege* Numerosa etiam vasa aquosa sunt thyreoideæ glandulæ. Hæc omnia in trunculos unita, cum ramis a capitæ descendentes & comitibus ramorum arteriæ carotidis, demum in dextro latere cum vasis pulmonis & thyreoideis, dextra quidem in angulum venæ subclaviæ cum jugulari, sinistra vero & in ductum thoracicum se inmittunt, & in subclaviam, iterum HEWSONO auctore.

p. 177. l. 8. *adde* Demum placenta & secundinæ aquosis vasis destituuntur, & in magna parte cutis, dorsoque toto nondum visa sunt. Deinde fateri oportet, post tot industriorum virorum labores, fragmenta tamen esse ea omnia, quæ de lymphaticis vasis scimus, neque ullo modo cum arteriarum, aut venarum, aut nervorum historia descriptiones vasorum aquosorum comparari posse. In capite enim & artubus pauca, & hiulca: in vola manus, dorso pedis, natibus nulla omnino descripta habemus.

In quadrupedibus, avibus & piscibus systema vasorum lymphaticorum fere est, quod in homine diximus, & pariter ductus thoracicus, eadem fere in sede, in magnam venam immixtus, communis idem truncus lacteorum vasorum & lymphaticorum. In piscibus tamen omnino nullæ glandulæ globatæ notæ sunt.

p. 179. l. 13. *adde* Nuper Cl. MERTRUD vascula lymphatica vidit, quæ & cum ductu thoracico communicant, & in lumbales venas aperiuntur *f*\*).

ibid. l. ult. nusquam *lege* perraro

p. 180. l. antepen. *adde* Et subclaviæ quidem venæ, aut jugularis cum ea venæ conjunctioni, venas lymphaticas inferi non dubium est: sed eæ venæ ductui, quem dixi, proximæ sunt.

p. 181. l. 2. *post* pleræque *adde* quod magis est probabile. Reperiuntur in quadrupedibus & avibus: piscibus & quadrupedibus, frigidis nullæ sunt *n*\*).

pag. 176. not. o) *lege* ZELLER.

p. 178. not. k) *lege* 48.

*f*\*) *Mém. des sav. étrang.* T. VI.

*n*\*) HEWSON PALLAS *Comm. Petrop.* L. XIX. in lacerta.



pag. 181. l. 7. *post* retinuit *adde* Non ut accurate separaret; nam lac, salivam, ferum, pituitosum in mesocolo humorem separari scripsit, cum conglomeratis adeo conjungit *q*\*).

ibid. l. 19. *post* retulit *adde* Nuper etiam Cl. BROMFIELD nullum conglobatarum a conglomeratis discrimen esse docuit, ut in alio animali conglobatæ sint, quæ in alio conglomeratæ *a*\*).

p. 182. l. malo *lege* scirrho

p. 184. l. 16. *post* violationem *adde* lac

p. 186. l. 2. *adde* ut in inguinalibus & alibi.

Vasorum aquosorum ad reliquas partes, quæ glandulam conglobatam constituunt, adeo magna ratio est, ut possis eas pro fasciculis aquosorum vasorum habere, quæ per tenacem, multamque cellulosam telam conjunguntur.

ibid. l. 19. *lege* possit.

p. 190. l. 15. *lege* seorsim

ibid. l. 18. *adde* Aliquæ pancreatis capiti, duodeno inferius adhærenti, adjacent.

p. 191. l. 7. *adde* sex, septem HEWSON. Superiores aliæ sunt, aliæ inferiores.

ibid. l. 11. *adde* Qua sede una, duæ, tres glandulæ reperiuntur.

ibid. l. 12. cum in tibia, fibula, pedeque *lege* & sub eadem in tibia una & altera, in pede nullæ &c.

ibid. l. 13. *lege* Hæ & popliteæ

p. 192. l. 11. *post* inguine *adde* esse lego,

p. 193. l. 21. & ex frictione, quæ fit, *lege* deinde, etsi vasa efferentia pauciora sunt, & in universum inferentibus non majorem habent luminum summam, in iis tamen non potest amissa celeritas reparari, cujus pars non exigua destructa sit frictione, quæ fit &c.

*q*\*) *Meth. medendi*, XIV. c. II.

*a*\*) *Obs.* II. p. 45. 46.

p. 193. not. c) *lege* L. VI. Sect. I.

# ELEMENTORUM PHYSIOLOGIÆ

## LIBER TERTIUS.

CIRCUITUS SANGUINIS EX CORDE IN ARTERIAS, EX ARTERIIS IN  
VENAS, EX VENIS IN COR.

### SECTIO I.

QUO SANGUIS PER ARTERIAS FLUAT.

**P**ag. 197. l. 15. *post* redierint *adde* & totæ nunc planæ sint.  
ibid. l. 19. *lege* sanguis se confert,  
ibid. l. 21. *post* trunci *adde* sanguinis momentum retinent.  
p. 198. l. 16. *lege* eorum  
p. 199. l. 9. *post* perforatur *adde* Optime vero succedit in aorta, quando supra  
cor ligatur, sive calidum animal fuerit, sive frigidum. In umbilicalibus ar-  
teriis GALENUS experimentum fecit, in pulmonali nuper Cl. PORTAL o\*).  
Quæ vinculum, ea tumor facit, qui arteriam comprimit. In farcocele ar-  
teriæ testis digiti crassitie fuerunt o\*\*). Cum aorta arteria in abdomine am-  
plissima esset, eadem supra cor, & una carotides latissimæ o\*\*\*).  
ibid. l. 23. *lege* ex arteria incisa  
p. 200. l. 17. *post* fudisse *adde* Neque rarum est, cum arteria brachialis ob aneu-  
rysmia vinculo intercepta fuisset, eam sub eo vinculo sanguinem fudisse g\*).  
ibid. l. 18. *post* brachialem *adde* incisam  
p. 201. l. 9. ex trunco humerariæ, supra vinculum, natæ *lege* infra vincu-  
lum natæ  
ibid. l. 11. *post* humerariam *adde* supra vinculum liberam  
p. 202. l. 19. *post* legem *adde* pugnet,  
p. 203. l. 12. *post* necesse est *adde* In terrore genæ expalleseunt, & sanguis in  
cor, inque magna vasa congeritur.

o\*) COLOMB. p. 22.

o\*\*) Svenska Wetensk. Ac. Handling 1737. no. 1.

o\*\*\*) LIEUTAUD Sepulchret. II. p. 94.

g\*) BERTRANDI chir. II. p. 207.



## S E C T I O II.

## ITER VENOSI SANGUINIS.

- P** ag. 204. l. 8. *adde* tamdiu dubii.  
 p. 205. l. 8. *post* finus *adde* valvulosi  
 ibid. l. 23. *adde* requiri enim aggerem, qui sanguinem relapsurum sustineat, vir acuti iudicii sensit.  
 p. 209. l. penult. *lege* quæ cordi propior est & *adde* Cum tonsor venam ad carpum ligaret, nullum sanguinem obtinuit *i*\*) stulte miratus.  
 p. 210. l. 24. *post* habent *adde* Idem tonsori accidit nuper dicto.  
 p. 214. l. 17. *adde* Cum luxatæ vertebræ earum venam comprimerent, venæ artuum inferiorum turgidissimæ fuerunt MORGAGNI *q*\*\*).  
 ibid. l. 22. *post* effundi *adde* Hoc experimentum jam ASCLEPIADI innotuit *r*\*).  
 p. 216. l. 1. sed præterea efficaciam---explicatam demonstrant, *lege* sed præterea humoris venosi iter per cor, & arterias, ad omnes corporis humani partes, continuatum demonstrant.

## S E C T I O III.

- P** ag. 218. l. 12. *lege* aut ab inhalantibus  
 p. 222. l. 15. *post* inanitio *adde* Neque GALENUS id ignoravit. Plus semel enim mutuum arterias inter & venas commercium eo experimento demonstravit, quo constat, vel arteria magna, vel vena magna incisa, sanguinem universi corporis ex eo vulnere effluere: demum ex venis in arterias aliquid, eas ut alat, sanguinis transire *i*\*).  
 p. 224. l. ult. *post* secuta est *adde* Ex saphena, ex poplitea vena rupta mortes pene subitæ.  
 p. 226. l. 1. ramorum *lege* venenorum  
 ibid. l. 3. *post* aut *adde* olim ARISTOTELI dictæ *u*\*).

*i*\*) Apud. STORCH Jahrgang. IV.

pag. 210. not. q) *lege* 108.

*q*\*\*) MORGAGNI de Sed. & caus. morbor. II. p. 356.

*r*\*) SCRIBON. l. c. 21.

*i*\*) Facult. nat. L. III.

*u*\*) MARCELL. p. 1904.

pag. 226. l. 10. *post* infecerit adde Alia similia venena Americani indigenæ temperare norunt, effectu perinde pestilenti, si vel levissime vulnus cruentatum fuerit.

ibid. l. 12. *adde* Analogus effectus venenorum est, quæ cuti cruentatæ applicata occidunt, quo venena mineralia fere spectant. Cobaltum ab ignara muliere ad achores liccandos capiti pueri inspersum, miserum Gottingæ occidit. Sic arsenicum, cum caput ejus decoctione ablueretur *e\*)*, ita mercurius sublimatus *e\*\*)* ulceribus inspersus, & crocus metallorum *e\*\*\*)*. Huc etiam lues pertinet, quæ per venenatam lanceolam a scarificatione late per Moraviam *e\*\*\*\*)* sparsa est, cum ea lanceola virus venereum contraxisset. Olim etiam nicotiana in vulnus pulli & serpentis data, bestias enecavit, & vomitum civit *e\*\*\*\*\*)*. Ab aqua phagedænica, in qua sublimatus mercurius solutus erat, salivæ fluxus *e†)* secutus est. Tactis genitalibus femina infectæ chirurgus periit *e††)*, & ab hellebori radice in foniculum data *e†††)*.

p. 227. l. 13. A corde & medicamentis *lege* A medicamentis acidis

p. 228. l. 10. *adde* Uno verbos spiritus & salis, & sulphuris, & nitri, & vitrioli in venam vivi animalis impulsus ejusdem funesti eventus, subitæque mortis causæ fuerunt. Minus magnum malum ab aceto expectares, & ipsum tamen animal perinde & subito occidit.

ibid. l. 12. *post* excitat *adde* alias rabiem fecit:

ibid. l. 14. *adde* Oleum etiam olivarum funestum soporem fecit.

ibid. l. 17. *post* habent *adde* si in venam dederis,

p. 229. l. 18. *post* vomitus *adde* A vitro antimonii vehemens purgatio *a\*)*. Ab arsenico extus admoto vomitio sanguinis & mors. A mercurio sublimato in lotionem adhibito salivæ fluxus.

p. 230. l. 5. *adde* Et in alio experimento a BORRICHIO citato liquida fæx de vena profluxit.

pag. 226. not. c) *adde* De Americanis sagittis HERBERT de cassava amara, 483.

*e\*)* BÜTTNER Tödllichkeit, p. 200. WEPFER cicut. aquat. p. 289. & motus cruris ademptus

BARTHOL. cauter. p. 16.

*e\*\*)* STAHL Meth. med. p. 56. 57. PEYER exerc. p. 197.

*e\*\*\*)* E. N. C. Dec. II. ann. 1. obs. 43.

*e\*\*\*\*)* Ap. Jordanum BRUNNAGALL. MAUCHART ophthalmoxyst. 1. p. 15. BOYLE porosis,

p. 23.

*e\*\*\*\*\*)* E. N. C. Dec. II. ann. 2. obs. 103.

*e†)* Mem. de l'Acad. de chir. p. 1. 157.

*e††)* KRAMER med. milit. II. p. 81.

*e†††)* ETTMÜLLER chir. inf. BORRICH. de venen. p. 722.

*a\*)* MAJOR l. c.



- pag. 230. l. 19. *post* mittebatur adde & perinde a sanguine hominis peste infecti in animalis venam impulso.
- p. 231. l. 8. adde Denique lac in arteriam impulsam post octo horas de vena perfluxit \*), cujus experimenti eadem vis est t\*).
- p. 232. l. 4. defunt lege supersunt
- ibid. l. 24. ad totum, quem lege ad partem corporis, quam
- p. 234. l. 20. adde Nuper Cl. COLOMB canem recreatum esse expertus est, qui sanguinem transfusum receperat.
- p. 236. l. 6. *post* periissent adde & denique medicus Italus Venantius VENTRONI transfusionem in se ipso molitus morte audaciam luisset x\*).
- p. 238. l. 19. hactenus ne motum quidem sanguinis, & frustra minus circuitum conspicuum videre datum est, lege circuitum sanguinis ex arteriis in venas conspicuum videre nunquam datum est u\*):
- ibid. l. 27. *post* depingitur adde In rana & cochlea LISTERUS vidit z\*).
- p. 240. l. 12. adde Ill. viri Lazari SPALANZANI experimenta diximus, qui in salamandra transitum sanguinis ex arteria in venam, huic arteriæ continuam, pariterque per ramos transversos parallelæ venæ immisos versus cor redeuntem sanguinem s\*\*) dixit.
- p. 242. l. antepenult. *post* frigore adde repulsum.
- p. 244. l. 14. adde Francisci de la RAYNA, medici veterinarii, & Oliva Sabugo, feminae hispanæ, alii circuitum sanguinis inventum abscribunt, quos libros non vidi: nihil vero percipio ex ipsis laudatorum locis aut experimenti, aut rationis, quod virum nullius partis studiosum movere possit.
- p. 248. l. 12. adde Frigida etiam Olai WORMII i\*) & priora CONRINGII i\*\*) de circuitu sanguinis invento judicia fuerunt. Monspelienfes adeo a vero admittendo alienos se præbuerunt, ut ob suam HARVEIO præstitam fidem T. BARTHOLINUS i\*\*\*) in ea schola magna odia passus sit.
- p. 249. Paragraphum tricesimam tertiam in nova editione excipit  
§. XXXIII \*. *Nuperi adversarii.*

Quæ nuper in Gallia se extulit secta semistahlianorum, quæ rebus humanis *Principium Vitale*, sive archæum præfixit, ut in universum anatonem & experi-

\*) Profluxit forte. Not. edit. huj. auct.

t\*) BIRCH IV. p. 205.

pag. 235. not. e) adde Philosoph. Transact. n. 20.

x\*) PANELLI II. p. 296.

z\*) Ap. BIRCH.

s\*\*) De motu sanguinis.

i\*) 444. 445. & anno 1645. p. 694.

i\*\*) Ap. WORM. p. 444. 445.

i\*\*\*) Ap. WORM. p. 672.

experimenta parvi facit, ita in circuitum *Harveianum* cum acerbitate invecsta est, cujus causam non datur divinare. Utuntur contra nobile inventum meīs et SPALANZANI experimentis, non factis, ut HARVEIO noceremus, et per quæ id solum evincitur, sub mortis atriola, certisque in vitæ humanæ conditionibus, sanguinem retroire, et per arterias versus cor relabi, per que venas, nonnunquam ad sedem pertusi vasis contra ductum circuitus confluere. Oportebat veri amantes agnoscere, et SPALANZANUM, et me directe, nostris oculis, diversos modos vidisse, quibus sanguis ex arteriis in venas transeat, et contrario ductu ad cor revehatur. Deinde isti contemptores testimoniorum, quibus sensus vero subveniunt, nullum proprium periculum afferunt, quod quicquam de HARVEII affirmationibus detrahat. *Henricus FOUQUET* demum potissimum contra demonstratum verum insurrexit a\*), et, qui nuper obiit, *Theophilus BORDEU* a\*\*)

p. 249. l. 19. lege qui post aliqua sua dubia egregiis etc.

## S E C T I O IV.

## L Y M P H Æ I T E R.

**P** ag. 250. l. antepenult. lege præter ea vasa aquosa, quæ etc.

p. 251. l. 10. lege in quas dicuntur se immittere.

ibid. l. 17. adde et nuper G. HEWSON.

p. 252. l. 3. adde Demum in diuturno moerore, qui humorum motum retardat, vasa lymphatica turgida, coactæque lymphæ plena visa sunt c\*).

p. 253. l. 2. adde In cubiti vasis, quo loco quodque suo trunco inseritur, valvulam esse iter retrogradum morantem, sub ea longe viam versus digitos liberam patere lego. In lymphaticis pectoris vasis passim hydrargyrum contrariam legitimæ viam sequi MECKELIUS. De lymphaticis vasis similia MONROUS junior habet, et passim G. HEWSONUS.

p. 255. l. 7. aliqua lege non satis vera.

ibid. l. 16. adde Et si aliqua, per arterias, ut puto, vasis serosis cum excretoriis ductibus conjunctio est f\*).

p. 250. not. o) adde LANGSWERT, II. p. 7.

a\*) In decem prælectionib. Monspelii 1777, 8. et in duodecim questionibus, ibid. 1776.

a\*\*) Passim per sua opera.

c\*) *Mémoires présent.* IV. p. 192. 193.

f\*) p. 166.



---

EXCERPTUM EX PRÆFATIONE AUCTORIS SECUNDÆ  
PRIMI TOMI PARTI PRÆMISSÆ.

Plura mutata, auctaque in hoc volumine sunt, quam quidem in priori. Non ita valde in parte anatomica, tamen ut aliqua nupera inventa adjecerim, ut PORTALII de fibris carneis auctoris cordis dextræ, & de nervis cordis, tum de iis nervis NEUBAVERI, etsi non potui summi olim incisoris laboribus perinde utiliter frui, ac quidem licuisset, si ante editum *functionum* opus accepissem.

Dextras caveas cordis porro defendi ampliores esse.

In physiologicis aliqua mutavi, plura addidi. Mutare me aliqua coegerunt nuperorum cogitata, quæ expendere, et aut probare necesse fuit, aut meas rationes opponere. Cor in sua systole tamen brevius reddi porro contra nuperrimos scriptores defendi, neque testudinem excepero, in anguilla enim, de qua eadem dubia repetuntur, manifesto vidi, sollicita cura adhibita, cor mucroni scalpelli apice suo objectum in systole non lædi, in diastole vero vulnerari: quo in phænomeno, nonnullisque aliis a CL. FONTANA invitum dissentio. Sed et cor totum inaniri posse puto me ostendisse; neque posse solum, sed vere omnino inaniri, et demum, quoties cum superstitie in cavis suis sanguine quiescit, causam silentii esse in virium defectu, qui non sinat ad contractionem niti.

Ordinem etiam *Harveianum* in contractione sibi succedente partium cordis porro secutus sum. Neque in cordis viribus æstimandis a prioribus recedo: neque in cordis prærogativa, quod solum universitatem humorum in circulum agere potens sit, neque in alio privilegio, in quo hæc ipsa prærogativa fundatur, quod nempe cor super omnes alias corporis animalis partes natura irritabili emineat. Novi aliquas exceptiones esse: pleraque tamen experimenta pro corde stant.

Magni momenti porro est inquirere, quæ sit scaturigo vis ejus motricis, adeo pertinaciter in corde conspicuæ. Nempe quæritur, num a nervis sit, aut solis, aut certe adjutoribus. Hic libratis et prioribus argumentis, et novis, confirmor per experimenta, nullas quidem partes nervorum in cordis motu apparere, non tamen ideo continuo nullas esse dixerim, cum cor musculus sit, et nervos accipiat. Id verum manet, exiguas esse, quod illa vis adventitia nervorum adeo exiguum portionem efficiat conspicui motus cordis, ut eo auxilio natura ad cor contrahendum minime egeat; atque in experimento absque nervorum auxilio perinde munere suo defungatur.

Stat ergo mihi, cordis irritabilitatem causam esse motus cordis. Hæc eadem causa motus, ut in omnibus musculis, atque partibus contractilibus corporis animalis, causa pulsus est, vitæque & incrementi. Nervosam vim suo loco addemus.

De stimulis aliqua licuit addere ex nuperis F. FONTANÆ & SPALANZANI experimentis. Quæ stimuli efficaciam destruunt, ea hic primum persequi potui, quæ pericula fere apud CARMINATIUM fideliter & copiose exposita reperiuntur.

Potissimum vero hic repetendæ fuerunt FONTANÆ leges de amissa per ipsam contractionem natura contractili fibræ, ut post unam irritationem una contractio sequatur, post eam, nisi interim reparata sit irritabilitas, omnino quies.

Ab uno stimulo putat ergo Vir Cl. consumtam esse naturam irritabilem: verum eam vim, post quam exercendo se interiit, renasci, & sponte post aliquod tempusculum, iterumque efficaciter a stimulo ad motum revocari. Quæ causa sit alternarum vicium, quæ vulgo in motibus a corde pendentibus percipiuntur.

Stahlianam porro animæ potestatem rejicio. Ostendo etiam nuperorum inventorum rotiferi animalis, & pigri, aliorumque vermiculorum longam in exercenda potestate intermissionem nihil posse ad abrogandam animæ quamcunque potestatem.

Causam summæ in motu constantiæ, qua cor supra alios musculos eminet, non in sæpe repetito motu poni putem, ut eo facilius cor contrahatur, quo frequentius se contraxit, lassitudo enim ista non videtur pati vera esse, eo certius musculi motum suppressura, quo sæpius & potentius eodem tempore idem se contraxit.

Sed porro de fide experimenti certus sum, quo ostenditur, cor inanitum quiescere, utique adeo in perpetua stimuli præsentia perpetuam cordis contractionem fundari.

Bernæ, d. xx. Mens. Oct. clbcccxxxvii



# ELEMENTORUM PHYSIOLOGIÆ

## LIBER QUARTUS.

C O R.

## S E C T. I.

## VELAMENTA EXTUS CIRCUMPOSITA.

**P**ag. 257. l. 18. *post* visum sit, *adde* Consentiant tamen plurima nupera experimenta, & sanam cum pleuritide pleuram repertam esse, & absque dolore inflammata, ipso demum Ill. HAENIO teste, & MORGAGNO. In vivo homine insensilem CALDANUS per experimenta comperit. In alio experimento ipso in homine denudata pleura nullum doloris signum dedit, cum cutis irritatione vehementer doleret *a*). Mediastinum indolens esse CAR-  
RERE *b*).

p. 257. l. 19. *adde* Qui contra pleuram aut sanam, aut certe inflammata, dolere *c*) defendunt, non adeo experimenta *d*) producunt, quam magnos nervos per superficiem dispersos. Ad litem autem de sede doloris in pleuritide non licet nobis hic nos demittere. quibus immensus in physiologicis campus apertus sit. Neque debent nervi, qui per ejus superficiem decurrunt, pleuræ tribui, cui soli ii adscribi possunt, qui in ejus naturam dividuntur.

ibid. l. 26. *post* vertebrae *adde* posita.

p. 258. l. 2. *retro lege* pone

p. 259. l. 14. *lege* terminetur.

p. 260. l. 3. *lege* ponebatur,

ibid. l. 4. *lege* pertinebat

p. 261. l. ult. *lege* aut ei pro externa &c.

*a*) G. DOWE de pleuritide. Edimburg, 1771. 8.

*b*) Inflamm. p. 470.

*c*) PANZANI Giornale di Medicina, 1776.

*d*) Ita HAENIUS rat. medendi, IX. p. 124. Qua dolor fuerat in pleura, inflammatio post mortem reperta est.

p. 257. not. x) *adde* HUBER Eph. Nat. Curiosor. III. obs. 101.

p. 262. l. 2. *ad verbum* coalescit in textu *adde* not. u\*) Cor, pericardium, mediastinum, LIEBTAUD Sepulchret. II. p. 57.

pag. 264. l. 23. *post* paradoxus *adde* Neque dissimilem historiam ZACUTUS habet *m*\*) Cor etiam in vulnere nudatum vidit Cl GOOCH *m*\*). Est ubi sternum perforari oportuit, quo pus in caveam mediastini anteriorem effusum emitteretur.

p. 266. l. 13. *adde* Addit ad venam cavam BARBAUT.

p. 267. l. 1. pericardio *lege* mediastino.

ibid. l. 6. *lege* innexa

ibid. l. 12. *post* locus *adde* in fetu major

p. 268. l. ult. *adde* idemque in vespertilionem obtinere lego.

p. 270. l. 25. *adde* cum res vulgo nota non sit.

p. 276. l. 23. *post* DISDIER *adde* Ill. LIEUTAUD, comes nunc archiatrorum Gallicorum, tendineam membranam distinguit, & tenerum interius velamentum, & cellulofam telam, quæ utramque membranam uniat. Porro in majoribus & senilibus corporibus tendineas fibras admittit, quarum equidem nullus certus ductus sit, quæ ipsæ cum tendineis fibris diaphragmatis continuentur. Verum ego quidem nihil ultra vidi. Exteriorem laminam PORTALIUS retinuit.

p. 277. l. 21. *adde* Tendineam membranam & fibras tendineas habet vir Ill. I. LIEUTAUD *t*\*). Nuper Cl. SABATIER spasmodicam pericardii constrictionem admisit *t*\*); verum neque tendo convellitur, neque tendinei quid in pericardio humano est.

p. 278. l. 5. In vivo animale pericardium non contrahi CHIRACUS testis est *y*\*).

p. 280. l. 11. *adde* deinde GALENO.

ibid. l. 19. *post* DIONIS *adde* & a morte generari Ill. LIEUTAUD.

*m*\*) *Prax. chir.* I. p. 121.

*m*\*) *of wounds*, p. 337. HABICOT *Journ.* IV. L. VI.

p. 265. not. *b*\*) *adde* SABBATIER, II. p. 127.

p. 267. not. *t*) *adde* Ad 6 & 7 costæ cartilagine, VESALIUS, p. 321.

p. 268. l. 17. *ad verbum* deduxisse *in textu* *adde* not. *c*\*) Etiam MOSCATI, p. 25.

p. 268. not. 2) *adde* In crocodilo. *Parisi.*

p. 271. not. *a*) *spestat. ad lineam tertiam textus.*

p. 272. l. antepen. *ad verbum* comprehendit *in textu* *adde* not. *p*\*) *Gaine donnée aux deux grandes artères*, LIEUTAUD *Mem. de l'Acad.* 1752. p. 257.

*t*\*) *Mem. de l'Acad.* 1752. p. 251. seqq. *Essais d'Anatom.* p. 187.

*t*\*) *Anat.* p. 135.

*y*\*) *Advers.* p. 49.

p. 278 not. *c*) *adde* Ex œsophageis *Mem. des savans étrangers.* I. p. 291.

p. 280 not. *f*) *adde* Ita Cl. CARRERE *inflamm.* p. 470.

ibid. not. 2) *adde* LIEUTAUD.

ibid. not. *a*) *adde* In leone Serao, Neapel, 1764. 4.



- pag. 280. l. penult. *post.* DIONIS *adde* Non in omnibus corporibus reperit  
 I. LIEUTAUD *q*<sup>\*)</sup>; neque in fatuis omnibus Cl. GREDING *q*<sup>\*\*)</sup>.  
 p. 281. l. 2. *adde* phthificis *y*<sup>\*)</sup>, in convulsis *y*<sup>\*\*)</sup>,  
 ibid. l. penult. *post.* aqua *adde* in plurimis animalibus *h*<sup>\*)</sup>,  
 ibid. l. ead. *adde* cochleæ *i*<sup>\*)</sup>,  
 p. 282. l. 1. *adde* in salamandra *n*<sup>\*)</sup>,  
 ibid. l. 3. *post.* avibus *adde* quas Rupe numerosas incidi;  
 ibid. l. 7. *adde* H. VINK *k*<sup>\*)</sup>.  
 ibid. l. 10. *post.* vulgaria esse *adde* Nunquam non reperit Cl. GREDING *k*<sup>\*\*)</sup>.  
 ibid. l. 15. *post.* enecto *adde* In homine subito mortuo Cl. BASSANI *p*<sup>\*)</sup>, in  
 apoplectico Cl. P. C. FABRICIUS *p*<sup>\*\*)</sup>.  
 p. 283. l. 9. *adde* Constante in hominibus se vidisse SCHNEIDER *t*<sup>\*)</sup>, VINK *t*<sup>\*\*)</sup>,  
 Ill. STOERK *t*<sup>\*\*\*</sup>), In fatuis frequenter GREDING *t*<sup>†</sup>), in infantibus mul-  
 tam *t*<sup>††</sup>).  
 p. 284. l. 10. *adde* inque fibras densantur *k*<sup>\*)</sup>. Sponte demum in gelatinam  
 constitit *k*<sup>\*\*)</sup>. Quare si in cane vapor pericardii totus exhalavit, probabile  
 est, in experimento Cl. viri putridum fuisse. Nam in pectore ipso coagula-  
 bilem esse fatetur Cl. COTUNNUS *k*<sup>\*\*\*</sup>).

p. 282. not. o) *adde* P. C. FABRICIUS *progr.* 1759.

*q*<sup>\*)</sup> *Mem. de l'Acad.* 1752. p. 267.

*q*<sup>\*\*)</sup> GREDING apud LUDWIG *Advers.* II. p. 4.

pag. 281. not. u) *adde* JAMES *canine madneff.* p. 65.

ibid. not. y) *adde* PLANCUS *app. ad. acad. conject.* p. CIII.

*y*<sup>\*)</sup> BIUMI.

*y*<sup>\*\*)</sup> MORGAGNI *de sed. & causis morbor. per anat. indag.* II. 410.

*h*<sup>\*)</sup> GALEN. *loc. affect.* L. V. JAMES l. c.

*i*<sup>\*)</sup> HARDER multum esse addidit.

*n*<sup>\*)</sup> SPALANZANI.

pag. 282. not. d) *adde* CHIRAC *advers.* p. 57.

*k*<sup>\*)</sup> Bloedvaten p. 15.

*k*<sup>\*\*)</sup> *Adversaria* LUDWIGII, III. p. 3. 4.

*p*<sup>\*)</sup> *Fränkische Anmerkungen*, IV. p. 72.

*p*<sup>\*\*)</sup> H. *Sammlung*, p. 10.

*t*<sup>\*)</sup> *Catharrh.* II. c. 9. *t*<sup>\*\*)</sup> l. c. *t*<sup>\*\*\*</sup>) *Ann.* I. p. 138. 139.

*t*<sup>†</sup>) l. c. multis productis exemplis.

*t*<sup>††</sup>) *Journal de médecine*, V. p. 120.

pag. 283. not. a) *adde* COTUNNUS *isch.* p. 16. Subflava, p. 12. de hydrope pericardii  
 HAEN l. c. 9.

pag. 284. not. e) *adde* Id homine melancholico GREDING *adv.* III. p. 34.

ibid. not. g) *adde* Gelatinosa LA FOSSE *cours d'hippiatrique.*

ibid. not. h) *adde* Crustam sibi induxit GREDING.

*h*<sup>\*)</sup> *Ischias nervosa*, p. 25. 27.

*h*<sup>\*\*)</sup> GREDING.

*h*<sup>\*\*\*</sup>) VIEUSSENS *malad. intern.* II. p. 67.

pag. 284. l. 24. *lege* Est ubi cum syrupo florum malvæ & violarum viridem cet. ibid. l. ult. *post.* reperta est *adde* quo frequentia exempla refero, in quibus Cl. viri exiguam hujus aquæ portiunculam viderunt cogi *q*\*)

p. 285. l. 3. apparuisse *lege* circumfusum habuisse liquamen puris similes\*) ; verum ea in sede pus adfuisse passim legas, & demum ipsum pericardium quasi in pus dissolutum s\*\*). Crustam inflammatoriam s\*\*\*), qua cordis superficies tegebatur, non dudum in febre epidemica mali moris frequenter vidimus.

ibid. l. 10. *adde* & in peripneumonicis

p. 286. l. 2. *adde* Ejusmodi glutine pericardium cum osse conferruminatum fuisse passim lego apud illustres viros HENIUM *g*\*) & MORGAGNUM *g*\*\*)

p. 287. l. 20. *post* extant *adde* In tabe *b*\*), hydrope *b*\*\*), pectoris asthma *b*\*\*\*), post cordis *b*†) palpitationes, deliquia *b*††) animi, aliaque mala *b*†††).

p. 289. l. 15. *adde* Similia mala in cordis actione subnascuntur, quando pericardium crassescit *d*\*), & cartilagineum, & demum osseum fit, ut quidem non rarissime factum est. Durum cartilagineum, cum adhæreret VIEUSSENS *d*\*\*).

Adhæsiō enim respirationi nocet. Septum enim transversum difficilior explanatur, & respiratio impeditur *d*\*\*\*).

Per vulnus tantisper amisso humore motum cordis utique pergere non mireris *d*†).

*g*\*) MORGAGNI *de sed. & caus.* I. p. 184. II. p. 98. DUVERNEY *posth.* II. p. 92.

*s*\*) BIRCH T. IV. p. 429. SENAC II. p. 346. 354. LIEUTAUD *précis.* p. 166.

*s*\*\*) *Journal de Trevoux* 174 Avril, MEDICUS *Wahrnehmungen*, p. 653., HAEN *rat. med.* T. XIV.

*s*\*\*\*) STÖRK *ann.* II. DE HAEN T. XIV.

p. 285. *ad verbum* spissescit *in textu* lin. 6. *adde* not. *s*\*\*\*\*) Vitio COTUNNUS pag. 29. 30.

ibid. not. *x*) *adde* In febre frequens esse LIND. *fever. infect.* p. 280.

*g*\*) *Ratio medendi*, p. 45. *g*\*\*) *De sed. & caus. morb.* I. p. 171. II. p. 187.

pag. 287. not. *h*) *adde* Post vulnus cordis RICHARD *recueil* II. p. 594. Sæpe VIEUSSENS *mal. int.* II. p. 168.

*h*\*) *Journ. med.* 1761. Mars. STÖRK *ann.* II. A peripneumonia SARCONI p. 58.

*h*\*\*) BRUNNER *de corde occulto*, *Fränk. Anmerk.* T. IV. p. 278. BADER *obs.* 8. HEVERMANN *urin.*

*h*\*\*\*) JENTY *couf. se* T. III. p. 251.

*h*†) LIEUTAUD *sepulchret.* II. 47. 17. *Journal. de medecine*, 1756. Févr.

*h*††) Apoplexia ADAUS *obs.*

*h*†††) Cardialgia HAEN, XI. Anxietas, debilis pulsus, MECKEL *mem.* V. XI. Hoc malum per omnes gradus increfcens videt: paucis filis, MORG. *sed. caus.* II. pag. 96. ut ipse reperit, deinde latius per cartilagineum, demum totum pericardium

*d*\*). Ad pollicem BADER *obs.* 36. *d*\*\*) *Mem. int.* p. 165. *d*\*\*\*\*) ibid. p. 168.

*d*†) HAEN T. XI. *Journ. de med.* 1761. Mars. *Journ. des savans*, 1691. n. 2.



- pag. 290 l. 9. *adde* testudinem p\*),  
 p. 291. l. 16. *adde* cum cor alio fundamento destituatur.  
 ibid. l. ult. *adde* syncopas g\*)  
 p. 292. l. 15. *adde* Annotatum est, medio solo in dorso quiescere posse, quibus is hydrops est c\*). Hydropem in cellulosa tela circumposita PORTALIUS vidit c\*\*).  
 p. 293. l. 2. *adde* & passim testimonia reperimus.  
 p. 294. l. 17. *post* glandulæ *adde* aut PETRIOLIANÆ u\*)  
 ibid. l. 23. *adde* Proprios villos partem aquæ pericardii stillantes SANTORINUS depinxit, quos ejus interpretes pro cellulosa adipe ebria tela habet x\*).  
 p. 295. l. 4. PUTEI lege POZZI.  
 p. 296. l. 3. *adde* In vivo cane videas vaporem foetidum in guttas consistere o\*).

In cane strangulato rubrum liquorem de auriculis excludare PORTALIUS vidit o\*\*).

- pag. 290. not. o) *adde* TARGIONI *viaggio*, VII. p. 171.  
 ibid. not. p) *adde* Eph. Nat. Cur. II. 1. obs. 130.  
 p\*) *Feuillée suite du journ.*  
 p. 291. not. f) *adde* Cum cordis laceratione uncia 48. HAEN *rat. med.* IX. cap. 1.  
 ibid. not. g) *adde* PISO *colluv. sangu. sæpe*.  
 g\*) LIEUTAUD *sepulchr.* II. p. 15, MORG. l. c. p. 20.  
 p. 292. not. i) *adde* BARRERE, *obs.* 234. LIEUTAUD II. p. 60. 61. MORGAGNI, l. p. 136. 139. FANTON. *obs.* 37. *post* pleuritidem, BLASIIUS l. *obs.* 19.  
 ibid. not. p) *adde* HANNIBAL ALBERTINUS.  
 ibid. not. q) *adde* COTUNN. l. c. p. 15.  
 ibid. not. b) *adde* VIEUSSENS, *maladies internes*, p. 164. 165. &c.  
 c\*) VIEUSSENS *malad. inter.* p. 165.  
 c\*\*) l. c. p. 61.  
 p. 293. not. e) *lege* XXX.  
 u\*) Nam sibi tribuit in *otto* *stodere*.  
 x\*) SANTORIN. *posth.* p. 18.  
 p. 295. not. g) *adde* JENTY III. p. 451.  
 p. 296. not. o) *adde* de intervallis fibrarum cordis musculosarum se sudantem vidisse LA FOSSE *cours d'hippiatrique*.  
 o\*) KYPHER *hum. pericard.* n. 36.  
 o\*\*) Ad LIEUTAUD p. 383.

## S E C T I O II.

## C O R D I S A U R I C U L Æ.

Pag. 298. l. 1. adde lepore marino.

ibid. l. 3. adde De rotifero ambigitur; sunt, qui admittant l\*), sunt, qui dubitent l\*\*).

ibid. l. 10. post reperit adde Nullum est in seta aquatica m\*); nullum, quantum reperi, in tænia, in holothurio m\*\*), nullum in echino m\*\*\*).

ibid. l. antepen. Verum pisces aliqui ---- incumbente adipe habere observarunt, lege Sic & in cochlea veri nominis cor est, certe in cochlea, quæ vitalem humorem per sua vasa in corpus p) didit.

In vermibus terrestribus & aquaticis, in scolopendra & marina hystrice, inque multis insectis reperitur alternis nodis interstinctum q). Id cor in vermibus videtur intra canalem alimentarium contineri r), & ex duobus s), tribusve truncis fieri t). Idem vero cor, etsi salit, motuque videtur peristaltico agitari, tamen quod nulla in vasa suum humorem didat, Petrus LYONNET certe in eruca, cor verum esse negat. Analogia tamen & motus, & proportio ad corpus cylindricum animalis, cor esse suaserint, & paradoxum videtur, cum alii Cl. viri, minori cum vitrorum convexorum apparatu, insectorum vasa viderint, LYONNETO nulla apparuisse; de qua equidem lite nihil habeo, quod de meo lucis afferam t\*).

Unicum denique in omni animali cor est, neque enim exceptionem a monstrosis fetibus repetas, in quibus nonnunquam cum duobus capitibus duo corda fuerunt. Si unquam, ut in raro illo VIEUSSENII t\*\*) exemplo, vere duo corda in eodem homine, inque quadrupede visa sunt, putes mon-

p. 298. not. i) adde CORTI p. 177.

l\*) CORTI p. 173. oscillans ullum quamdiu rota circumagitur, FONTANA viper. p. 150.

l\*\*) SPALANZANUS, qui pro ventriculo habet.

m\*) FONTANA viper. p. 147.

m\*\*) Svensk. Vet. Acad. Handl. 1765.

m\*\*\*) Comment. Acad. Bonon. VI. p. 241.

p) HARDER in obs.

q) PALLAS miscell. p. 130. in Nereide.

r) MÜLLER Wasserwürmer, p. 27. 28. 29.

s) Id. ib. Naturforsch. Gesellsch. 373. 374. in animalculo aquatico.

t) Naturforsch. Gesellschaft, l. c.

t\*) Conf. Lib. II. & Auctar. p. 19.

t\*\*) Malad. intern. T. II.



strosa fabricæ fuisse vestigium, qualis est in corde inverso, quod mucrone suo dextrorsum inclinatur. Duo esse in perdicibus doleas SPONIO excidisse, erudito viro. VIEUSSENII secundum cor dilatatam venam cavam fuisse Cl. SABBATIER autumat.

Si cor longum erucarum & vermium quemque nodum habet seorsim fallentem *u)*, videbitur potius esse canalus alterne dilatatus, quam cordum series. In nereide cuique articulo suam esse arteriam MÜLLERUS *x)*. Verum non dubium est, quin a cauda, una continua serie, sanguis ad caput promoveatur.

p. 299. l. 18. *lege rectilineo.*

p. 302. l. 13. *adde* Sed etiam nuperiores medici pro re insolita habuerunt, quod cor mucroni suo non diaphragma, verum sinistras costas respiceret *l\*)*.

p. 303. l. 8. *post* mutare *adde* & inspirante animali retrorsum descendere, expirante sursum & extrorsum *c\*)*.

p. 304. l. 10. *post* perciperetur *adde* In latere dextro cor frequenter pulsavit, idque vitium sæpius STORCHIIUS vidit, quando aqua in pectus effusa erat *k)*.

ibid. l. 13. *post* TORREZ *adde* & apud Ill. SANDYFORTIUM Cl. DINKLER.

ibid. l. 19. *lege* de pectore emerisse.

p. 305. l. 10. *adde* Cor venarum esse principium olim ARISTOTELES dixit *r\*)*.

Cor ad venas pertinere idem Stagyriles *r\*\*)*. De auriculis res manifestior est. ibid. l. penult. *adde* Ranæ aliquid simile est, vena nempe cava sub corde amplissima; sic in piscibus video, inque phoca, animali calido, quod ex vitæ suæ ratione diu sub aquis degere cogitur. Amplissimum receptaculum in bipede amphibio HUNTERUS reperit, pericardii simile, & perinde cor comprehendens.

p. 306. l. 14. *retro lege pone.*

p. 307. l. 1. *adde* inque amphibio animali bipede HUNTERI.

*u)* MÜLLER l. c. p. 175.

*x)* Wasserwürmer, p. 27. 28.

*l\*)* Eph. Nat. Cur. Dec. III. ann. 3. obs. 188.

*c\*)* Habet etiam SABBATIER anat. II. p. 136. 137.

p. 303. *ad verbum* declinat in textu *adde* not. d) SABBATIER, ibid.

p. 304. not. e) *adde* AUBERTIN Journ. de Médec. 1776. May. Stuttgard. ökonom. Samml. n. 2.

p. 304. not. k) *adde* J. L. TARGIONE raccolta I. p. 122.

*k\*)* Jahrgang. 1721. p. 58. & alias.

*r\*)* Sonn. vigil. part. anim. II. c. 4.

*r\*\*)* Part. Anim. II. c. 4.

p. 306. not. i) *adde* In Xiphia KÖLPIN Svenska Vet. Handlingar.

pag. 307. l. 6. adde Suspiceris alteram auriculam hoc ipsum carnosum esse receptaculum, vel demum imperfecto septo auriculam dividi, ut in lacertæ apode<sup>s</sup>).

ibid. l. 9. adde cochleæ.

p. 308. l. 17. post duas adde MORGAGNUS <sup>g</sup>), & PORTALIUS <sup>i</sup>).

ibid. l. 21. adde ut tamen veræ carnis aliqua crassitie distingui videantur.

*Ultima sexta paragraphi verbo : Quare non male --- relatæ fuerunt Autor in nova editione ad quintam paragraphum retulit.*

p. 309. l. 16. adde in equo & bove certe in basin auriculæ LANCISIUS.

ibid. l. 17. lege ea fabrica

p. 310. l. 6. adde duas Cl. POHL <sup>e</sup>), quæ aortæ utrumque latus tegebant, & quarum dextra major erat, sinistra ex renali sinistra orta in duas iliacas findebatur. Alio modo duæ cavæ venæ sunt, & constanter, in oviparis frigidis, un in crocodilo <sup>e</sup>).

ibid. l. 10. post donarunt adde minus commode, cum numquam ad sphincteris modum suam venam claudant.

p. 312. l. 6. adde Nuper demum Cl. PORTALIUS <sup>z</sup>\*) has fibras auriculæ dextræ noviter descriptas dedit. In universum enim fere alias longitudinales, cordi parallelas esse; non oriri a fibris cordis, hinc auriculam coctam de corde decedere, ut in morbo etiam visum est <sup>z</sup>\*\*). Aliæ porro fibræ auriculæ dextræ circumducuntur, æque uberiores sunt. In apice uniformiter contorqueri addit, & vasa (quæ?) ambire, denique in fasciculos abire; supremas sibi propiores esse; in conjunctione auris dextræ cum vena cava superiore in torum intumescere. In fundo auricularum telam esse fibrarum muscularium, sub iis duos latos fasciculos se decussare, in ventriculos terminatos, & pone utramque aortam uniri. Sub istis planum esse continuum fibrarum longitudinalium pene parallelarum, transversarum, quæ se circa orificia ventriculorum circumducant. Ex fundo auriculæ dextræ in columnas recurvas secedere, & in diversa abire versus auriculæ convexitatem; alias compositas, simplices alias, quarum illæ passim tendineæ sint, istæ totæ carneæ. Hæ columnæ simplices & compositæ faciunt rete, ventriculorum reti fere simile.

<sup>s</sup>\*) Nov. Comment. Acad. Petrop. Vol. 19.

<sup>g</sup>\*) Adv. Anat. V. 22.

<sup>i</sup>\*) Ad LIEUTAUD T. I. p. 414. 415.

<sup>e</sup>\*) Progr. de venar. variet. 1773. 4.

<sup>e</sup>\*\*) Acad. Parisi. Mem. pour l'histoire &c.

<sup>z</sup>\*) l. c. p. 400 seqq.

<sup>z</sup>\*\*) Apud QUEYE Sync. p. 76. sacculus pulmonalis ab auricula divulsus dicitur.



Exterius fasciculo musculoſo ambiuntur, & duos fasciculos conſtituunt, in vena cava inferiori, inque ſuperiori poſitos, ad latera diſcedentes, etiam circulares. Nolim nuperriman deſcriptionem per me ignorari, etſi mihi intellectu difficilis fuit.

pag. 312. l. 17. *lege* ſanguinis

ibid. l. 18. *adde* In pullo incubato aliquoties nimiam dextræ auriculæ dilatationem, vidi & *dele* ea, quæ in huius paragraphi fine de irritabilitate muſculorum auriculæ dicta ſunt.

p. 314. l. 14. *lege* venæ cavæ inferioris, ſed in nova quoque editione corruptus eſt hic locus; videtur legendum eſſe: ad avertendum a ſanguine venæ cavæ inferioris pondus ſanguinis venæ cavæ ſuperioris, &c.

p. 316. l. 6. *lege* Vittam

p. 318. l. ult. *poſt* interponitur *adde* tum fibræ carnæ venæ.

p. 319. l. 18. *adde* Sed neque facile puto valvulam deſiderari, etſi ea DUVERNEYI VOX extat.

ibid. l. 25. *poſt* fabrica *adde* in noſtra valvula

p. 320. l. 14. *lege* eandem intercedere poſſe,

ibid. l. 16. *adde* in eo ſanguinem verſus foramen ovale ducere, fibrasque muſculares valvulam anguſtiorẽ reddere dictum eſt, ut aditus ad aurem lateſcat.

Quare nuper ab Ill. LOBSTEINIO annotatum eſt, foramen ovale etiam in adulto homine patere, quoties valvula deleta eſt, aut certe in reticulum reſoluta; quando autem foramen ovale clauſum eſt, valvula ſolet integrior ſuper-eſſe. Quo ipſo confirmatur, eam ab impetu nitentis ſanguinis rumpi.

p. 321. l. ult. *adde* Ita nuper vidit F. A. WEBER y\*).

p. 323. l. 9. *adde* Aliam deſcriptionem vide apud PORTALIUM g\*).

ibid. l. 13. *adde* denique annuli ovalis foramen ovale ambientis partem inferiorem, tranſitui ſuppoſitam; & muſculum in foſſam ovalem deſcendentem.

ibid. l. 24. *poſt* exponas *adde* Majorem rationem invenit Ill. MECKELIUS, quæ ſit 16. ad. 7.

p. 324. l. 2. *adde* In fetu auriculæ ventriculis capaciores ſunt. Contra in adultis hominibus o\*). Sic in lacerta apode auricula ventriculum magnitudine ſuperat o\*\*).

pag. 312. *ad* verbum poſtulant in textu *adde* not. b\*) Don. MONRO in *Eſſ. phyſ. and litterar.* III. p. 272.

pag. 317. not. g\*) lin. 1. Tab. II. *lege* Tab. I.

y\*) *Obſ. anat.* 4.

g\*) l. c.

p. 323. not. k) 24. *lege* 14.

q\*) PORTAL l. c. p. 435.

o\*\*) *Nov. Comm. Acad. Petrop. T. XIX.*

S E C T I O III.

C O R D I S I P S I U S F A B R I C A.

**P**ag. 325. l. 6. *post* colligitur *adde* Idem per inflammationem & suppurationem consumitur, ut in vulnere cordis *d*<sup>\*</sup>).

Minime enim rarum est, cor etiam in epidemicis malis inflammari, & abscissibus extus erodi; quorum pus in pericardium effluit. Per alios morbos vix evanescit, & in phthisicis reperitur, quando non alibi pinguedo superest. Est etiam, ubi præter morem auctus cor compressit, & in minorem molem redegit.

ibid. l. 7. eo *lege* in has cellulas

ibid. l. 11. *adde* quæ numerosissimis aliis augere possem; cartilaginæ, osseæ, lapidæ materiæ inter fibras, & in cordis superficie effusæ.

p. 326. l. 3. *post* æstimatum *adde* ab alio ad 13. nonnunquam etiam 24 & 28 unciarum pondus attigit, & in *Gustavo Adolpho* unciarum 26.

ibid. l. 15. *adde* In fetu uterque ventriculus æquali est crassitie.

ibid. l. 16. *post* ventriculus *adde* & facilius dilatatur,

ibid. l. 22. *post* crepat *adde* Et ea etiam in sede in augustissimo olim principe diffiluit.

p. 328. l. 9. *post* desit *adde* In senibus magnum discrimen esse PORTALIUS *a*<sup>\*</sup>), ut in ventriculo dextro septem, in sinistro quinque uncie liquoris contineantur. Huic ipsi senio eam enormem cordis latitudinem tribuas.

ibid. l. 11. *lege* quæ in cadavere apparuit,

ibid. l. 14. *dele* & L. N. WEISS,

ibid. l. 15. *lege* invenit *Et* *adde* alii que nuperi, mira *e*) distinctione usi, utique ventriculum dextrum ampliorem videri, neque tamen vere ampliorem esse, dilatabilem vero magis, & a sanguine de vena pulmonali redeunte fortius di-

*d*<sup>\*</sup>) RICHARD p. 559.

pag. 325. not. f.) *lin.* 1. *adde* In MAXIMILIANO II. asthmatico ossea natura prope valvulas cordis cum hydrope pectoris A. THANMÜLLER apud WELSCH Cent. IV. Caf. 35. — *lin.* 11. *adde* Duo ossa sollicite descripta, tum alia quasi testacea, & cartilagine in intimis cordis, & in aorta pariter squamæ osseæ CRUWEL cord. *vaf. osseogen.* — *lin.* 14. *adde* Anseris cor totum osse factum, le MEILLEUR Journ. de med. Mars 1770. — *lin.* ult. Tom. noviss. p. 106. 107. *lege* T. XII. p. 52.

pag. 327. not. u) *adde* Æquales SABATIER II. p. 159.

*a*<sup>\*</sup>) PORTAL l. c. p. 495.

*e*) *lege* L. N. WEISS Progr. anat. V. p. 15. 16. & in disp. de dextro cordis ventriculo *post* mortem ampliorem. Nempe in vivo homine negat differre.



stentum latiorē videri. Poterant meminisse Cl. viri, in vivo homine, de quo negant, eam ipsam causam ventriculū dextrum perinde latiorē reddere.

p. 328. l. 18. *post* ventriculū *adde* in adulto homine

ibid. l. 22. *adde* Hic interim moneo, ventriculū dextrum senioris temporis partem videri, ut aliquamdiu cor embrionis unico ventriculo constet, qui nempe aortam educit arteriam: deinde ad tuberculi similitudinē de unico sinistro ventriculo dexter incipit emergere, & aliquamdiu, ad quintum mensem, minor est, quam sinister, minor etiam in phoca, cujus foramen ovale apertum, & fabrica eadem est, quæ fetui. In maturo infante eadem utriusque ventriculi est capacitas. Deinde paulatim vincit dexter, & eo majori fere ratione, quo ætas est provecior. Casu utique hæc ratio turbari potest. Cum aorta arteria ossea esset, & ventriculus sinister malignius se inaniret, idem dextro amplior fuit g\*).

p. 331. l. 13. *lege* si omnino aliquam cet.

p. 333. l. 20. *adde* Quæ pars ventriculi ad arteriam ducit, eadem levior est, & minus elatis musculis carnosus distinguitur.

p. 335. l. 14. *post* duas *adde* In Xiphia valvulas arteriosas similes vidit Cl. KÖLPIN k\*).

ibid. l. 21. *lege* arteria pulmonalis

p. 336. l. 7. *adde* Splendidi quid subesse nonnunquam non repugno.

p. 338. l. 21. *post* occurrit *adde* neque eam PORTALIUS recipit s\*).

p. 341. l. 7. *adde* Nescio an forte ARISTOTELI occurrerit aliquid simile ejus, quod nuper DONALDUS MONRO vidit, sinus nempe ad apicem cordis ascendebat polypis plenus, in sinistram ventriculū apertus a\*).

p. 343. *Paragraphus decima quarta in nova editione sic incipit*: Primigenius iste solus cor constituit cum minimo dextro, quamdiu pulmo nondum evolutus exiguum sanguinem admittit. Idem *ventriculus* cordis sinister rectius *posterior* vocatus, & nuper *secundus* minus commode, qui primus existat t\*).

Idem fere cum dextro descriptus est, cet.

ibid. l. 9. *adde* Musculi papillares valvulas retinentes tres, quatuorve.

ibid. l. 12. *lege* & aliquando dextro minus.

g\*) Apud MECKELIUM.

pag. 331. not. t) *lege* Tab. 28.

k\*) l. c.

s\*) l. c. p. 427.

a\*) *Prælect.* p. 107.

t\*) 342. *ad* PAYANI nomen in *textu* lin. 6. *adde* not. k\*) *Epist. de septo cordis*, p. 262.

- pag. 344. l. 9. *adde* tendines numerosi ex muculis papillaribus orti plurimum ordinum, & sibi incumbunt imbricati, & in triangula expansi.
- ibid. lin ult. *adde* Cartilagineas cum polipo vidit Cl. LOEBER a\*).
- p. 347. l. 16. *lege* via.
- ibid. l. 18. *adde* Neque rarum est, coalescere, ut ostium perangustum ex corde pateat. Post orthopnoeam, aut asphyxiam valvulae ossæ & lapidae ostium aortæ pene clausere p\*).
- p. 348. l. 7. *post* IDEM *adde* sed omnino nullum nuper vir ill. P. CAMPER y\*).
- ibid. l. 11. *post* PLEMPIUS *adde*, Et in eo animali ab ipsa natura pendere videtur, non a morbo, cum in vituli corde amici Amstelodamenses jam officulum cum medulla repererint b\*).
- ibid. l. 15. *adde* In Alce, de cervi genere, perinde repertum est.
- p. 351. l. 14. *adde* Consentit nobiscum Ill. LUDWIGIUS a\*).
- p. 354. l. 25. *adde* Ita Ill. LIEUTAUD sinistrum ventriculum a dextro & ejus fibras comprehendi reliquit.
- p. 357. l. 16. *adde* Ill. denique LIEUTAUD ita has fibras descripsit, ut summam operis difficultatem ipse sentiret.
- pag. 358. l. 6. *dele* nondum autem jus acquisivi edendæ.
- ibid. l. 15. *post* demum *adde* aliorum ad experimenta.
- ibid. l. ead. hæc *lege* hoc.
- p. 360. l. 8. ad *lege* a
- ibid. l. 9. *lege* confiniis.
- p. 364. l. 16. *adde* Qui vero nuper ejusmodi vertebralem nervum dixerunt, ad cor tamen non duxerunt b\*).
- p. 366. l. 16. *adde* His post primam editionem addi possunt, quæ in posthumis *Josephus Guichard* DUVERNEY, & in disputatione ann. 1772. vir doctiss. *Adolphus MYRRAY* de his cordis nervis dederunt. Demum non possum PORTALII nervos omittere, quos icone illustraverit, nostrasque & SENACI descriptiones incompletas vocet. Duos esse plexus, *superiorem* majorem, in-

a\*) *De cordis fabrica*, edit. 1767. 4°.

p\*) LIEUTAUD *Sepulchr.* II. p. 40. 44. & 45.

y\*) In *letter-Oeffening*.

b\*) *Colleg. priv. Amstel.* II.

pag. 350. not. p) *adde* CHIRAC *advers.* p. 250.

a\*) *Epistol.* 169. ad. me.

p. 358. not. i) *lege* Prostat hæc tabula in *Nov. Comm. Soc. Reg. Acad. Gott.* T. II.

p. 360. not. u) *lege* 85.

p. 363. not. o) *lege* 36. 37.

ibid. not. s) *lege* 29. 30.

h\*) SABBATIER *anatomia*.



ter duos bronchos positum magis ad sinistra: dare ei broncho furculos o\*), tamen ut alius sit, aliusque. Esse, ubi fere a solo octavo nervo fiat.

*Inferiorem plexum* & minorem imponi basi cordis ad latus radices magnarum arteriarum, magis in sinistris. Oriti a nervis plexus superis, qui rami coronarias arterias ambiunt o\*\*).

Alios nervos super magnas arterias spargi o\*\*\*). In dextro latere ramos a laryngeo nervo octavi paris, a trunco octavo sub clavicula, a cordiaco superiori intercostalis ramo, a recurrente dextro, ab octavo sub eo nervo nasci.

In sinistro latere ab octavo prope glandulam thyroideam nervum venire, cujus furculus alter in aortam spargitur, alter pulmonem adit & cor. Tum a recurrente sinistro flabelliformem ramum prodire ad plexum magnum; in faciem superiorem ventriculi, & alium posteriorem in aortam.

Ramos aliquos plexum superiorem perficere, alios super nervos incedere, venasque cordis, serpentino ductu. Porro alios ramos octavum par dare ad aurem sinistram, ejusque venas.

Intercostalis nervus dat nervum superiorem prælongum a laryngeo furculo natum, sub aortæ arcu transeuntem, conjunctum cum ramis ganglii vertebralis inferioris euntem ad plexum superiorem. Non constantem esse ot).

Alius nervus, ex media cervice aut inferius natus, recipit ramum paris octavi, descendit, in fila dividitur, posteriora ad magnum plexum, anteriora ad magnas arterias ot+).

Iterum a ganglio cervicali inferiori furculis it, multos abiens in ramos, quorum aliqui cum recurrentis furculis conjunguntur, etiam alio modo ludens.

Truncus sinister intercostalis fere similes dextro furculos dat, tantum ut sinistrum ramum fere antrorsum, dextri retrorsum eant, sinistri inferius oriantur, cardiacus superior fere ex medio collo nascatur, ejus unus ramus inter duas arterias magnas cor adeat, furculus pulmones ot+++).

A ganglio cervicali ultimo furculus etiam a primo dorsali accedit. Hæc PORTALIUS, quæ pleniora nostris videtur existimare. Multa nos aliter vidimus; superiorem cardiacum plerumque in sinistro latere supremo loco, multo pluribus ramis conspicuum; ex ganglio cervicali medio ramos alio ordine, denique non omnes, sed multos ex imo.

§. XXVIII\*.

o\*) Ad LIEUTAUD anat. p. 651. T. I. g.

o\*\*) p. 652. T. I. g.

o\*\*\*) T. I.

ot) p. 653.

ot+) p. 654.

ot++) p. 655.

§. XXVIII\*. *Job. Ernesti* NEUBAUER, *Nervi dextri.*

Hunc egregium virum nuper amissimus. Pleraque o††††) cum meis satis consentiunt, quorum ecce compendium.

Nervus cardiacus superficialis raro ex solis nervis mollibus, plerumque ex ganglio cervicali superiori, conjunctis cum molli furculis, & ex aliis nervi intercostalis ramis in collo natis, etiam cum ramo ex thyreoideo ganglio, prodit, commistus cum ramis ab eo ganglio cardiacis, trans subclaviam arteriam it, in ea potissimum finitur, ramis nonnunquam in plexum cardiacum datis.

Ganglion cervicale medium nervi intercostalis ramos ad plexum cardiacum emittit, aliis cum nervo cardiaco superficiali communicat, & nonnunquam principes cordis nervos constituit.

Ganglion cervicale infimum cum recurrente communicat, & cum superficiali cardiaco; sed potissimum principem cordis plexum constituit, tantum ut in ramorum numero & situ ludat, tum ganglion thoracicum primum augeat. Plexus ipse inter duos magnos arteriarum principum truncos ponitur. pag. 367. l. 2. *adde* Habet tamen simile quid PORTALIUS, nervum natum supra diaphragma, ab intercostali, unum, alterumve s\*).

p. 368. l. 13. *post* salire *adde* Cl. etiam SPALANZANUS in suis minutis animalculis vidit, vasa cordis in ejus systole repleti, in diastole evanescere. Nobiscum sentit, quem honoris causa nomino, Cl. SABBATIER b\*).

Nuper Cl. MIEG & a corde has arterias repleti docuit, & ab aorta, cujus sanguis retrorsum versus cor nitatur; huc puto referas, quod etiam in diastole cordis coronaria percussa saliat, equidem debilius. Verum si in spirante bestia &c.

p. 369. l. 4. *post* expallescit *adde* uti jam 1740 in prælectionibus BOERHAAVIANIS monui.

ibid. l. 7. *post* quadrupedum *adde* Vidit nuper in infantis humani pendulo corde Cl. DINKLER apud SANDYFORTUM.

ibid. l. 16. *lege* residet in majoribus

p. 370. l. 1. admisi *lege* non negat

ibid. l. 3. *adde* & MIEGIO

o††††) In proprio libello, Francf. 1772. 4.

s\*) p. 655.

b\*) Cl. Vir Achilles MIEG. theses 1776.

pag. 380. not. d) *adde* Nobiscum etiam Cl. PORTALIUS p. 443. & in iconz.

ibid *ad verbum* expallescere in *textulin.* penult. *adde* not. g\*) CHIRAC *advers.* 232. &c.



pag. 370. l. 7. *adde* Necdum certo puto oculis constare, in sano homine, cui libera vasa sunt, tantam esse arteriæ constrictionem, ut sanguis contra subsequens in plena aorta fluentum retroagatur. Valvulas callosas vidi, ut non possent ostia arteriarum tegere \*).

p. 371. l. 1. *lege* neque alium ductum fere necessitas tulit,

ibid. l. 17. *post* reperitur *adde* etsi sunt, qui ejus modi quid in hac arteriæ tunica viderunt.

ibid. l. antepenult. *adde* Ruptam fuisse in variolis exemplum extat.

p. 373. l. antepen. *adde* sed exiguum, quam Cl. NEUBAUER aliquando insigniorem vidit, sæpe & plures vidi.

p. 374. l. 13. *dele* umerosi.

p. 376. l. 17. *post* valvulas *adde* Parisiis a 1727.

p. 380. l. 20. *adde* Ex vena cava ad sinistram sinum euntem venam vidî.

ibid. l. 26. *lege* impulsus in ejus caveam emittere.

p. 382. l. 8. *post* mora *adde* etiam in Cl. Viri *Arnoldi* DUNZII experimentis,

p. 383. l. ult. *adde* neque innatum calorem ARISTOTELI dictum,

p. 384. l. 20. sunt *lege* esse dicuntur,

ibid. l. 26. *post* admitti *adde* Sed neque in elephante *Petrus* CAMPER, peritus incisor, glandulas DUVERNOII reperit.

p. 385. l. 17. *adde* neque nuper Cl. *Guilielmus* HEWSON.

\* \*) SANTORIN. p. 117.

pag. 382 *ad* verbum auricula *in* textu lin. 6. *adde* not. a\*) VIEUSSENS *mal. int.* p. 85. & *ad* verbum sinu not. b\*) VIEUSSENS l. c, *mal. int.* p. 12. 85.

ibid. not. q) *adde* PORTAL.

ibid. not. r) *adde* PORTAL.

ibid. not. s) *adde* PORTAL.

ibid. not. t) *adde* PORTAL.

ibid. not. a) *adde* PORTAL p. 445. *mal. int.* II. p. 54. 12.

ibid. not. c) *lin. adde* Tantundem & *in* dextro *mal. int.* II. p. 85. & *lin. 5. adde* In ventriculum sinistram PORTAL l. c.

ibid. not. e) *adde* SABBATIER *anat.* II. p. 152.

pag. 368. not. l) *adde* In animalculo microscopico WRISBERG *satur.* p. 69.

pag. 387. not. a) *adde* FONTANA *leg. irritabilitat.*

pag. 388. *ad* verbum manet *in* textu lin. 19. *adde* not. b) Legem nuper confirmavit Ill. FONTANA & *in* *ricerche fisiologiche.*

## S E C T I O IV.

## M O T U S C O R D I S.

**P** Ag. 389. l. 5. *adde* Videtur enim contractio musculi ejus irritabilitatem debilitare, & demum destruere, ut quiescere ei necesse sit, etiam si causa stimuli superfuerit: nam cor etiam, quod fufius repetetur *n*\*.), lapideo concremento perpetuo irritatum, alterne tamen quiescit.

p. 390. l. 10. *post* durius fit, *adde* dum contrahitur,

ibid. l. 14. quam in systole minui scripsi, *lege* quam in diastole minorem nunc esse scripsi,

ibid. l. 20. brevius *lege* longius

p. 392. l. 5. *post* QUEYE *adde* aut vir Cl. qui calamum amico præstitisse dicitur, FOURNIER.

p. 392. l. 2. excitavi *adde* Vidit in homine Cl. DINKLER.

ibid. l. 13. Denique, quid Cl. QUEYE --- cordibus insigniter differt, *lege* De animalibus frigidi sanguinis lis nondum confecta videtur. Mecum equidem Cl. SPALLANZANUS sentit, qui in salamandra, etiam mensuris captis, apicem ad basin accedere vidit. Deinde cum *Felix* FONTANA & in rana, & in anguilla, & in testudine, cor in agendo longius esse confirmaret, eam que anomaliam peculiari cordis fabricæ tribueret, molle enim esse, & in diastole sanguinem in cor receptum, a mucrone ad basin descendere, cum idem superior sit, sic accedente ad basin mucrone cor brevius fieri: in systole vero cor sanguinem suum expellere, ita distendente humore se liberare, & naturalem longitudinem recuperare *e*).

Verum in rana quidem hic Ill. viro aliquid imposuisse certus sum, qui oppositum acús mucronem a corde animalculi in systole non attingi, in diastole omnino feriri repetito viderim.

Sed neque in anguilla quicquam reperio, cur alio modo in constrictione mutetur.

p. 392. l. 19. *lege* longius fieri putatum est.

ibid. l. 22. *post* scripserunt *adde* Verum nuper vir acutissimi judicii M. Ant.

L. CALDANUS & in testitudine cor contractum brevius fieri vidit, & in rana, & in anguilla, in qua ego quidem propria experimenta non habeo, nihil reperio, cur aliter se habeat, quam in affinibus frigidi sanguinis quadrupedibus.

*n*\*) L. XI. L. IV. Sect. V.

*e*) *Rcherche fisiologique*, p. 221. In testudine brevius fieri olim scripserat *Epist.* T. IV.



- pag. 392. l. penult. ejusmodi *lege* aliam
- p. 393. l. 24. *lege* perfectissime intumescit & repletur, eo magis quod etiam aliquis ex contracto eo ventriculo sanguis in auriculam redeat o\*), & ipse præterea &c.
- ibid. l. penult. *adde* Addit Cl. FERREIN motum conversionis. Cor nempe circa medium in basi punctum arcum circuli describere: ejus motus causam esse, quod sinister sinus vehementius compressus cor magis ad sinistra repellat, quam dexter sinus ad dextra, per sua experimenta p\*).
- p. 394. l. 11. *adde* Ita nuper Cl. FOURNIER r\*) ostendit, cordis pulsationem non esse a resistentia sinus sinistri repleti. Aqua sinum dextrum replevit, vidit cor perinde ad costas accedere, uti accedit, quando auriculam sinistram repleverat.
- p. 395. l. 7. *lege* latiore
- p. 396. l. 2. *lege* quem errorem ab ARISTOTELE ortum CARTESIUM &c.
- p. 397. l. 10. *post* evacuari *adde* Et nuper eo rediit Ill. Felix FONTANA, in ipso pullo e\*), & in frigidis animalibus ruborem aliquem in corde contracto superesse e\*\*), in calidis vero animalibus enectis nunquam non aliquam sanguinis copiam se in corde reperisse e\*\*\*). A nuce vomica data cor sanguine plenum et). Nam etiam in sistole aliquantum sanguinis in cor redire ex arteriis coronariis et†), cum pariter etiam a sanguine de carotide redeunte repleatur et††).
- p. 398. l. 2. *dele* neque editis
- ibid. l. 5. *adde* Eadem phænomena in salamandra, & in rana SPALANZANUS, in pullo, qui ovo continetur, HARVEIUS & CALDANUS viderunt. Id facile dederim, debile m\*\*) cor nonnunquam minus bene evacuari, cujus even-

e\*) SABATIER II. p. 146. 147

pag. 393. *ad verba* cedere possit *in textu* *adde* o\*\*) FERREIN *duodecim quæst.* qui hunc motum rectum vocat, & sinibus repletis tribuit.

p\*) l. c.

pag. 394. not. g) *adde* LAMURE Anonymus ad. l. de Cacao. Aliquid conferre SABATIER.

r\*) Journ. de médec. 1774. Juillet

pag. 394. not. z) *adde* Vide in Oper. anat. min. T. I. p. 164. seqq.

e\*) Ricerche p. 117.

e\*\*) Ibid. p. 118.

e\*\*\*) Ibid. p. 120.

et) Strahlsund. Magaz. I.

et†) Ricerche p. 105.

et††) MIEG thes. a 1776.

p. 397. not. l) *adde* CHIRAC *advers.* p. 292, de corde in universum.

pag. 398. *ad verbum* feci *in textu* lin. 2. *adde* not. m\*) Oper. min. p. 265.

m\*) Irritabilitate destructa Strahlsund. Magazin.

tus testimonium est in historia monstrosi infantis DINKLERIANI, ejus enim cor nudum non evacuabatur. Robustum vero cor, & impatiens stimuli, utique in homine perinde inaniri æquum est, ut in pullo & cane inanitur. Ipse demum sibi FONTANA respondet, qui cor, ut alios musculos, irritabilitatem ipsam per motum amittere scripsit, quare minime evacuatum tamen alterne laxari, quo & ipse vidi *m\*\*\**).

Si autem omnino cor non integre evacuatur, tamen necesse fuerit ad eam angustiam idem reduci, ut quolibet in pulsu nihil de sanguine retineat, nisi eandem semper sanguinis copiam, quæ in primo pulsu in corde superfuerat.

Si unica gutta in quoque pulsu intra ventriculos relinqueretur, & decem guttæ in decem pulsibus intra unicum diem, in fere 100000 pulsationibus, enormem copiam sanguinis in corde manere necesse foret, qualem omnino continere non posset.

Quare quoties cor ob valvulas aorticas obstructas, ob concrementum osseum cor comprimens, aut ob aortam arteriam osseam, aut ob arctatam, aut polypos maligne evacuatur, toties innumerabilibus in exemplis idem miram in molem dilatatur, qualem, quæ totum pectus repleret, in juvene vidi. Vidit id LANCISIUS *m†*), & exempla collegit valde numerosa.

Neque defunt exempla, ubi vel auricula, vel cor ipsum eam ob causam denique dissiluit, cum arteria aorta concremento osseo urgeretur, aut valvulæ induratæ maligne *p\*)* paterent.

Corollarium ejus theorematis est, quod cor eo minus sit, quo robustius & perfectius se deplet. In leone & auriculæ, & cor ipsum parvum est Cl. viro teste C. F. WOLF *m††*). Contra in debilibus, in hydropicis cor amplum est *m†††*). Denique uti frequenter aliquantum cruoris in cordibus hominum ægrorum reperitur, quem debilitas funesta non sinit expellere, ita & exempla sunt cordis integre inaniti *m††††*).

pag. 398. l. 9. lege perfecta cordis systole.

ibid. l. 12. lege & perfecta diastole

p. 399. l. 13. adde aut ab electrica scintilla.

p. 400. l. 18. post recipit adde Aliquam etiam a cordis ventriculis retro-

*m\*\*\**) Ricerche p. 129.

*m†*) LIEUTAUD II. p. 49. *Medical Transactions* III. p. 16. V. p. 146. VIEUSSENS *mal. int.* II. p. 178. E. N. C. Dec. III. ann. 3. *obs.* 24. FANTON *obs.* & c.

*p\*)* maligne legendum esse opinari aliquis posset. Nescio quæ alia medela conveniat. *Not. Edit. Aufl.*

*m††*) *Nov. Comm. Acad. Petrop.* XVII.

*m†††*) HARDER *apiar* 77. *obs.* ROBERT *traité de médecine* II. p. 385. E. N. C. Dec. III. *cur.* 5. 6. *obs.* 8. & *cur.* 3. *obs.* 3.

*m††††*) GREDING in *advers.* LUDWIGII. Vol. III. P. IV.



gradum o\*) diximus: nonnihil denique addit Cl. FONTANA o\*\*) ab arteriis coronariis, quæ nunquam non plenæ cum sint, & incisæ nunquam non sanguinem fundant, nullo etiam non tempore sanguinem suum per venas in auriculas dabunt. Denique addimus sanguinem ostiolorum, five minimarum venularum in auriculæ caveam patentium o\*\*\*).

- p. 402. l. 1. *post* pulmo *adde* Exemplorum iterum plus satis est. A solo impedimento in valvulis arteriæ pulmonalis apud VIEUSSENIUM g\*), MORGAGNUM g\*\*).

Ab aneurismate arteriæ pulmonalis in *Philippo NERIO* g\*\*\*). Ab impedimento in aortæ exitu, & valvulis aorticis offeïs aut crassioribus.

In orthopnoea & pulmone & sanguine impedito dextræ caveæ cordis amplissimæ sunt.

- p. 406. l. 16. *adde* Deinde per intervalla fibrarum tendinearum valvulofarum aliquid sanguinis in contractione cordis retrorsum in auriculas rediisse testimonium adest r\*).
- p. 407. l. 5. *lege* orthopnoicis
- p. 408. l. 11. *post* arteria alia *adde* quæ omnia absunt a frigidis.
- p. 409. l. 20. *adde* Asthma, hydrothorax, auris dextra vasta, sinistra perparva d\*).
- ibid. l. 25. *post* subita *adde* A valvulis aorticis offeïs aut calculosis cor vastius fieri frequens est annotatio g\*).
- p. 411. l. 17. *lege* contractæ, & offeæ
- p. 412. l. 12. *lege* per vas vero sinistro sinui commissum

o\*) n. 13.

o\*\*) FONTANA *ricerche*, p. 106. MIEG *thes.* 1776.

o\*\*\*) Sect II.

g\*) *Hist. de l'acad.* 1701.

g\*\*) MANETT. in vita COCHI Cl. GUARNIERO *dedicat.* ORTESCHI *Giorn. di medic.* T. II. PISONI.

g\*\*\*) HAEN *rat. med.* VI. LANAIS. MECKEL in *Mem. de l'Acad. de Berlin.*

pag. 405. not. i) *adde* Olim. GALENUS valvulas intercedere, ne sanguis ex ventriculo in venam cavam (auriculam) rediret.

p. 406. not. g) *adde* SABBATIER *anat.* II. p. 146. 147.

r\*) CHIRAC *advers.*

p. 408. not. k) *lege* *Opera min.* T. I. p. 168.

p. 409. not. d) *adde* *Malad. intern.* II. p. 179.

d\*) E. N. C. *Dec.* III. a. 5. 6. obs. 8.

g\*) LIEUTAUD. *sepulchr.* II. p. 40. VIEUSSENS *mal. int.* II. p. 181. 182. *Med. Transf.* III. p. 16.

p. 410. *ad verbum* vidi [in *textu* lin. 13. *adde* not. m\*) *Oper. min.* I. p. 144. seqq.

ibid *ad verbum* reditur in *textu* lin. 28. *adde* not. m\*\*) *Oper. min.* T. I. p. 144. seqq.

p. 411. not. t) *adde* LIEUTAUD II. p. 40.

pag. 412. l. 13. *adde* Modice calidum ex venis sanguinem in cor venire, ex arteriis calidissimum *Idem d\*)*

p. 413. l. 8. *lege* aortam.

ibid. l. 17. *adde* Conus vero sanguinis, quem annulus valvulosus in basi ambit, etiam in auriculam repellitur.

p. 414. l. 21. *post* rediisse vidi *adde* per arterias vero coronarias III. FONTANA.

ibid. l. penult. *lege* a sanguine sinus earum subeunte distendi,

p. 415. l. 7. *adde* Similia exempla sunt, ubi vel totum cor, vel solus sinister ventriculus mole increvit, cum valvulae aortae induratae, pene coalitae, vel aorta angustior, vel cartilagineis & osseis squamis varia esset. Est, ubi non solae sinistrae caveae; sed & pariter dextrae, ob ejusmodi vitia, dilatatae fuerunt. Numerosa adeo exempla collegi, ut enarrari nequeant.

ibid. l. 9. *adde* Aliquantum tamen sanguinis de aorta subside in cor redit. Aquam aortae injectam refluxisse vidit III. FONTANA *l\*)*. Sed eo experimento nollem uti, cum valvulae in vivo animali, sanguine cor replente, utique perverso sanguinis reditui melius resistent. Verum utique, uti de venis dictum, ita in arteriis is sanguis, qui inter convexitatem valvularum & parietem aortae est, is intra cor rejicitur, dum arteria subidet & contrahitur *l\*\*)*. Annotat idem vir sagacissimus valvulis in retinendo sanguine laborantibus subvenire arteriarum coronarum ostiola, parata partem sanguinis contra cor nitentis recipere, valvularum pressionem minuere, intercedere, ne valvulae rumpantur *l\*\*\*)*, aut ipse demum ventriculus laceretur *l\*\*\*\*)*

p. 418. l. 2. *post* confirmaverint *adde* Inter eos & Cl. SPALANZANUM, egregium in natura observanda virum, cito, & viros minime mihi faventes Cl. VERSCHUUR & van GEUNS.

ibid. l. 13. *post* LANCISIUS *adde* PETRIOLIUM forte secutus est, quo in administrationibus anatomicis ministro vir splendidus utebatur: idem ad sua etc.

p. 419. l. 4. *adde* Aliquid simile habet III. FONTANA in avibus, nempe finem contractionis cum initio relaxationis fere coincidere *q\*)*.

ibid. l. 20. *adde* Cl. MEZGERUS adeo certam legem esse reperit, ut etiam tunc auriculas & ventriculos alternis vicibus moveri viderit, cum utrisque eodem tempore stimulum admovisset *u\*)*.

*d\*)* Form. fet. c. 3.

*l\*)* Recherche p. 110.

*l\*\*)* FONTANA ricerch. p. 100.

*l\*\*\*)* Ibid. p. 113.

*l\*\*\*\*)* Ibid. p. 111.

*q\*)* Irritab. leg. diff. V.

*u\*)* MEZGER Advers. p. 134.



pag. 419. l. 25. *post* sequatur *adde* Hæc princeps auricularum micatio frequens omnino est visu, VESLINGIO olim dicta, & in puella nuper Cl. DINKLER, inque pullo Ill. CALDANO.

p. 420. l. 6. *post* agunt *adde* Alias ventriculus dexter frequentius sinistro contrahitur. In ultimis etiam incubationis diebus non raro vidi, successionem motus in cordis regionibus turbari.

ibid. l. 8. *adde* Primis diebus, nempe secundo, tertio & quarto, quibus cor animalculi manifestissime coram micat oculis subjectum, ordo perpetuus est, quem dixi, neque hæc sani animalis constantia debet per confusio- nem refutari, quæ debili aut moribundo animali supervenit.

ibid. l. 11. *lege* frustra in cordis systole laboraret ista,

p. 421. l. 23. *lege* nondum divisam & *adde* Adeo connexæ sunt duorum ventriculorum, duarumque aurium carnes, ut quiescens altera cavea, ab altera per stimulum in motum revocata, pariter ad contractionem intermissam redeat.

p. 423. l. 14. *adde* Nuper Cl. MONFILS receptam sententiam impugnare suscepit; negavit enim utrumque ventriculum una contrahi, neque cessit experimentis in animali captis, quæ non vult demonstrare quicquam. Nihil tamen attulit, cur paradoxam opinionem receptæ præferamus b\*).

ibid. l. penult. *adde* Vidit in pullo Ill. CALDANUS pulsus ante mortem ad 25. 21. 12. & 8. in minuto primo rediisse; clar. vero WHYTT in ranis ad 28. 18. 16. ad 45. 40. 36. 30. ad. 15. 6. & 2. & ad 11. 10. In cane CALDANUS ad 25. 21. 12. 8. in minuto primo f\*) vidit reductos.

Demum ventriculus cordis in rana post longam quietem quasi expergiscit, iterumque sopitur, & denuo post quindecim minutorum moram pulsus molitur.

p. 424. l. 2. *adde* quiescunt.

ibid. l. 10. percipiantur *lege* solæ appareant & *adde* Et dextra auricula, & dexter thalamus in cane motum suum diutissime conservarunt, in Ill. viri experimento, quem nuper amisimus p\*). Cordis vero languentis motus frequentiores sunt, quam arteriarum micationes, ut omnino ad aliquot cordis pulsus semel arteria respondeat p\*\*).

p. 425. l. 3. *post* salit *adde* Cor semel, auricula decies novies micavit d\*).

b\*) *Journal de médecine* &c. ann. 1776. Sept.

pag. 423 not. g) nundum editis anno 1756 *lege* in *Oper. min.* T. II. p. 164. editis.

p\*) *Rat. medendi* IX. p. 218. 219.

p\*\*) PORTAL apud COLOMB. p. 31.

d\*) MASSIMI *esp. anat.* II. exp. 2.

pag. 426. l. 10. *adde* Finem motus cordis, qui nonnunquam cum contracto

(statu conjungitur 2\*) alias dicemus. Ipsa plenitudo contractioni resistit 2\*\*).

ibid. l. 25. *post* efficitur *adde* atque paulo post eadem aorta in pullo constrin-  
gitur atque expallescit; quousque vero hæc pulsatio cet.

p. 427. l. 13. *adde* Ita vidi frequentissime, vidit vir acutissimus *Felix FONTA-*  
*NA*, vidit *Cl. SPALANZANUS*, vidit *Cl. REICHELIIUS*.

ibid. l. 18. *post* viri *adde* inter eos *Cl. SPALANZANUS*.

p. 428. l. 1. *post* circuitum *adde* ciendum

ibid. l. 4. *adde* In medias usque venas pulsus non pertinet *SPALANZANO* teste.

ibid. l. antepend. *post* dicitur *adde* quod quidem experimentum a me repetitum  
ad superstitem post mortem motum musculorum redit, quem sopitum scin-  
tilla electrica potenter fuscitat. Huc referas demum notissima &c.

p. 429. l. 3. *dele* aut nervi cordis

ibid. l. 12. *post* tangi potuit *adde* Frequentia sunt exempla mortis subitæ, cum  
valvulæ aorte offæ factæ denique conniverent, neque sanguini ex corde  
in aortam aditum concederent.

Deliquium animi, quod cordis est quies, subito & pulsui finem facit,  
& hæmorrhagias omnes, adeoque motum arteriosi sanguinis supprimit

ibid. l. 15. *post* occidit *adde* & polypus subito in ventriculum dextrum delap-  
sus a\*), qui suspensus fuerat a\*\*)

ibid. l. antepen. *post* liceat *adde* multosque demum post dies in musculis, in-  
que intestinis, motus aliquis irritationem sequi incipiat.

ibid. l. ult. corpori *lege* torpori.

p. 430. l. 4. *adde* Sic vir mathematicis innutritus *Matth. GABLER b\*)*

ibid. l. 15. *adde* Die demum 14. irritabilis apparuit in intestinis c\*) die vige-  
simo in musculis, in corde ante secundum c\*\*).

Ita in deliquio animi, quando & sensuum officium interceptum filet, &  
cordis pulsus, prius semper cor ad officium redit, tunc demum cerebrum.

ibid. l. 20. *adde* In pullo cor primis animalculi diebus multo pulmone majus  
est, artuve quolibet.

p. 431. l. 8. *Verba*: Iterum cor ferocibus animalibus --- Sed & macilentis  
majus est in nova editione desunt.

2\*) In pullis *CALDAN. rîflessioni*, p. 253.

2\*\*) *Kongl. Svenska Vet. Acad. Handling. 1764. Tom. 4.*

a\*) *VERSCHUUR Exp. 1. SPALANZAN. mot. sangu.*

a\*\*) *POSTEL factum p. 49.*

b\*) *de tubul. capill. Ingolstadt 1774. 4.*

c\*) *Form. du poulet, II. p. 391.*

c\*\*) *lb. p. 416.*



pag. 431. l. 19. *post* habent *adde* Cor canis piscis, Germanice *Seekatze* dicti, exiguu nummo Danico (*Schilling*) non majus est *t*\*)

ibid. l. 21. *dele* Et in universum habitus --- maximam rationem habet.

ibid. l. penult. *post* pendere *adde* quam etiam sententiam Ill. SPALANZANUS mecum tuetur, cujus consensum plurimi facio.

p. 432. l. 13. *adde* Aliud Cl. CURTIUS egregie descripsit, aliud Cl. HENKEL, Fetus capite destitutus & corde *b*\*); fetus absque pulmone, corde *b*\*\*); sic absque corde apud Cl. AZZOGUIDIUM *b*\*\*\*), Cl. COOPER nuper fetum descripsit, cui neque caput, neque cor, sed umbilicalis vena motus principium fuit *b*†). Cl. SABBATIER de corde refert, de quo ad BOERHAAVIUM a. 1720 Edimburgo rescriptum fuerit. In eo nihil de corde supererat, præter auriculam dextram, ut pulmonis arteriæ ex aorta prodirent *b*††).

ibid. l. 14. *post* narrationes *adde* Inflammati cordis *c*\*) & ulcerosi, & laceri *c*\*\*).

ibid. l. ult. *adde* Cordis loco nihil nisi putrida caro *m*\*). In tabidis cor erosum passim lego *m*\*\*). Ulcera in corde, & post syncopen mors *m*\*\*\*).

Vulnera etiam cordis non rara sunt, quæ aut sero valde & quarto, nono, decimo octavo demum die mortem intulerunt, aut omnino sanationem admiserunt. Nam de globo plumbeo in corde cervi reperto BARTHOLINI est testimonium, & de sagitta *Caspari a REYES*, de bacillo *Henrici ab HEERS*. Cervos etiam, qui vulneri cordis superfuerunt, recenset *C. a REYES*.

p. 433. l. 12, *adde* Dudum STAHLIUS negat, corde quiescente mortem extemplo adesse *z*\*), nec animal corde evulso mori vult, dum venas ligaveris *z*\*\*).

p. 434. l. 18. *lege* pendere.

*t*\*) *Abhandlung. der Drontheim. Gesellschaft*, T. II.

*b*\*) BIRCH I. p. 393.

*b*\*\*) *Guilielm. COOPER Philosophical Transactions* T. LXV. P. II.

*b*\*\*\*) *Observat.* p. 55.

*b*†) *Phil. Trans.* T. LXV.

*b*††) SABBATIER, II. p. 62.

*c*\*) BÜTTNER *Zweyköpf. Kind*, TRE COURT *Mémoires* inde pus in pericardio.

*c*\*\*) HAEN *rat. met.* IX. c. 1. in hydrope pectoris.

*m*\*) *Euth. E. N. C. Dec.* III. ann. 2. obs. 3.

*m*\*\*) FANTON, *obs.* 14.

*m*\*\*\*) FERNEL *patholog.* V. p. 288.

pag. 433. *ad verba* sanguis evulso corde *in textu* lin. 3. *adde* not. *n*\*) Nempe vivit animal tardigradum in *Hist. nat. Brasil.* L. I.

*z*\*) *Theor. mort.*

*z*\*\*) GLOS ad J. FRAGOSI *chirurgiam*.

- p. 434. l. 20. *post* pertineat *adde* Cordis vires non majores esse, quam  $\frac{252}{168}$  intra minutum secundum elevatis, cum voluntariæ vires sint = 70 l. intra idem tempus *n*\*).
- pag. 435. l. 19. *adde* Multum existimarunt contra cordis prærogativam experimentum valere, per quod constat, in singula parte corporis humani, inque ea sola, posse inflammationem cieri, adeoque in eam solam partem sanguinis fluentum invitari. Nunc id fieri non posse si ponas, solum cor sanguinis motus fontem esse & causam: cor enim æqua vi in omnes corporis animalis partes sanguinem didere.
- ibid. l. ult. *adde* Ita porro vulgare est visu, quod ex DINKLERI relatione repeto, quiescentibus arteriis cor porro moveri *d*\*).
- p. 437. l. 6. *lege* Dudum I. *Sophronius* KOZAK a vaporibus sanguinis motum derivavit *r*\*); inde Cl. HUTCHINSON &c.
- ibid. l. 9. *post* ostendimus *adde* a calore hæmorrhagias fuscitari, quæ con- quieverant *u*).
- ibid. l. antepen. *adde* Veterum ergo huc revocarunt numerosis animalibus familiarem, meli, erinaceo, muribus montanis, aliisve calidissimis etiam bestiolis, cum certum sit, hirundines, & magna sæpe copia, in arundinetis atque fluviorum ripis a frigore hiberno constrictas & exanimis proximas repertas, aut aëreo calore, aut igne suppeditato revixisse. Pulsus, & calor, & cordis motus in his animalibus frigore tolluntur, a calore restituntur.
- p. 438. l. 24. *dele* sensim cor consumtum, &
- ibid. l. penult. *post* sustinuerunt *adde* Accurate AZZOGUIDIUS, quoties cor nullum aduisset *p*\*). analogum aliquid superfuisset.
- p. 440. l. 3. *adde* Calculi etiam illi, quibus Cl. viri ostendere voluerunt, non posse magnam cordis potestatem esse, omnino nihil evincunt, cum eorum auctores vim irritabilitatis ignoraverint, quæ nullis legibus ponderum regatur, & cujus ope pondera multo corde majora ab eo moto sublevantur, quæ a resistentiis augeatur, quæ potentiam vulgarem minuunt.
- ibid. l. 8. *adde* Embolo percutienti confert Cl. FOURNIER *b*\*).

*n*\*) SAUVAGES *inflamm.* p. 229.

pag. 435. not. c) *adde* RÖDERER *Comment. Gott. T. IV. p. 212*

*d*\*) Apud SANDYFORT *biblioth.*

*r*\*) *De hæmorrhagia.*

pag. 437. not. b) *adde* Conf. Lib. VI.

pag. 438. o) *adde* RÖDERER *Comment. Gott. IV. p. 212.*

*p*\*) pag. 16.

*b*\*) *Journal de médecine.* 1774.



pag. 440. l. 10. Ad potentias transeo, quæ cordi ---- Ceterum natura irritabili debilissima gaudent *lege* Ostendi alibi, arterias contrahi & mortua vi c), & procul dubio insita, quatenus in iis fibræ musculares sunt d) quam vim præter nos Cl. aliqui incisores in vivo animali viderunt. Id volo, vim mortuam non plurimum quidem posse, insitam, ut aliqua sit, debilem videri, quam neque sponte agentem unquam viderim e), neque irritatio mechanica fuscitet.

p. 441. l. 22. *post esse adde* Dudum CALDESIUS testudinis arteriam magnam immotam cordi unice obsequi, & in galeo pisce Cl. GOYEAU aortam immotam vidit.

ibid. l. antepen. *post vixerunt adde* Exempla ejusmodi senum, in quibus a morte arteriæ ossæ apparuerunt, passim collegi, & VESALUS olim habet m\*); & nuper c. LUCAS m\*\*), interque senii symptomata FISCHERUS ossæ arterias retulit.

p. 442. l. 6. Denique arteriarum vis contractilis ---- arteriis impensæ sunt *lege* Denique si viceris arterias, & potentissime, contrahi, nihil certe de cordis prærogativa demes. Quo potentius arteriæ contrahuntur, eo major erit resistentia, quam cordi universum arteriosum systema, una unda sanguinis impulsæ, dilataturæ opponit. Da in cordis diastole sanguinem novum motum a contractis arteriis accipere, ut non subsultorie, sed perpetuo utique fluente progrediatur, primo tempusculo a corde impulsus, altero ab arteriis. Posset inde progressivus motus sanguinis adjuvari, cordi nihil accedet, quod contractum nunc, ex hac hypothese, & sanguinis universum pondus superandum habet, & nova velocitate propellendum, & præterea insignem partem, dimidiam fere virium, super illam priorem resistentiam, in vincenda arteriarum resistentia impendere debet; nempe cordis nunc dupla potentia requiritur ejus, qua egeret, si arteriæ omnino vi contractili destituerentur.

ibid. l. 15. *adde* Neque de vasis lacteis, de vasis ex cellulosa tela, ex magnis caveis, ex cute humorem sorbentibus, de vasis fetus in utero radicatis attractionem excludero.

p. 444. l. 20. *post arteriarum adde* equidem probabilem,

c) *adde* & Auctar p. 21. L. VI.

m\*) *Exam. obs.* FALL. p. 36.

m\*\*) *Essay on waters*, T. I.

p. 442. *ad verbum* attractionem *in textu* lin. 10. *adde* not. p\*) Lib. VI. Ei multum tribuit RÖDERER *Uter* p. 212.

pag. 443. *ad verbum* reducuntur *in textu* *adde* not. q\*) HALES *veget. stat.* IV. p. 122.

pag. 445. l. 8. *adde* Totam illam oscillantem vasorum vim *Matth. GABLER* mecum rejecit *g\**), & vir Cl. I. C. D. SCHREBER *g\*\**).

p. 446. l. 13. *adde* Denique quam parum calor in promovendis humoribus animalis possit, manifestum est ex pullo, qui ovo continetur. Cor si destrueris, si id alioquin quieverit, in eodem calore incubantis gallinæ nulla pars animalis crescit, nullus sanguinis per sua vasa motus est. Et contra pergit cordis motus, & sanguinis, ut certo vidi, multis horis in ipsa circumfusa frigida.

§. XL\*. *Ad Cl. WILSONI objectiones.*

Non ideo nulla foret cordis vis, etsi aliqua ei auxilia accederent. De motu musculari ostendetur, accelerari inde utique sanguinem. De cibo sumto, utcunque id fiat, ipsum phænomenon certum est, & ab eo incalescimus. In venas portarum non nulla erit cordis potestas, cum ejus musculi vis in venas usque penetret. Verum in universum vir Cl. motum intestinum cum progressivo confundit, iste enim ab intestino motu minime juvatur, neque aqua stagnans ab evaporatione in fluentum concitatur, neque fermentatio magis versus partes externas, quam contra cor sanguinem urgeret. Musculos, interque eos sphincteres, ab irritatione laxari omni experimento adversatur. Vacuum spatium a corde parari, quo se sanguis venosus recipiat, hætenus potest admitti, ut credas, si cor plenum maneret, nullum ei sanguini de vena exitum fore, qui nunc sit aliquis, quod auricula se in ventriculum depleat.

p. 446. l. 15. *lege* cum aliquo non satis certo ab arteriis &c.

ibid. l. antepenult. *adde* Nobiscum sentit, quem honoris causa citamus, *Lazarus SPALANZANUS*.

p. 447. l. 12. *post* Cl. viri *adde* *Joh. DUVERNEY*, *Th. SCHWENKE*, *JADELOT*, *ARTHAUD* & Cl. *LAMURE*; & *post* *BOURGELAT* Cl. etiam *SPALANZANUS* in vivo animali nunquam potuit in sanguinis motu successionem aliquam percipere.

ibid. l. ult. *adde* In animalibus frigidis longum illud cor erucæ, monoculi, nereidis utique peristaltice conspicuo movetur; ut sanguis in primum nodulum veniat, tunc iste contrahatur, ita secundus nodulus repleatur, paulo post secundus arctetur, sic ex ordine ad ultimum. Conspiciam autem

*g\*) De tub. capill.*

*g\*\*) Atque I. LEONH. MAK. de comparativa sanguinis in diversis vasis celeritate, Erlang. 1775. 4.*



successionem reddit longitudo arteriæ, & motus minus velox humoris vitalis.

pag. 448. l. 17. *lege* alii a fortioribus demum stimulis &c.

ibid. l. 20. *post* sumsit *adde* ZENDRINUS vim cordis facit ad resistentias, ut  $48\frac{2}{3}$  ad 1.

p. 449. l. 22. *post* impulsa *adde* in minuto primo

p. 450. l. ult. *adde* s' GRAVESANDIO, MUSSCHENBROEKIO,

p. 451. l. 20. *adde* Aortæ diametrum a KEILIO nimis parvam sumi Cl. de SAUVAGES objicit.

ibid. l. penult. *dele* & decolorum immensam vim

ibid. l. ult. *lege* humor ex corde expulsum celerrime replet

p. 453. l. 14. *lege* præpositas

ibid. l. 15. *lege* Huic theoremati analogiam superstruit,

p. 455. l. 20. *lege* vero

p. 456. l. 19. *lege*  $\frac{1}{6}$

ibid. l. 28. *lege* 5000.

p. 457. l. penult. *lege* & lineæ longitudo

p. 458. l. 19. *lege* non raro efficiunt

p. 459. l. 7. *dele* proximo libro

ibid. l. 12. *lege* cogitur.

ibid. l. 19. *lege* harum

pag. 456. *ad verbum* sequitur in *textu* lin. 9. *adde* not. d\*) *Mem. de l'Acad. de Berlin, 1775.*  
II. A. N. C. *obs.* I.

pag. 459. *ad verbum* superantur in *textu* lin. 6. *adde* not. x\*). L. VI.

ibid. l. 7. *ad verbum* autem *adde* not. x\*\*) L. VI. L. IV. §. 42.

## S E C T I O V.

## CAUSSÆ MOTUS CORDIS.

**P**ag. 461. l. 9. *lege an a Nervis?*

ibid l. 18. *post fecerunt adde aut in recurrente*

p. 462. l. 11. *post tamen adde totis decem horis.*

ibid. l. 23. *adde Sic Cl. LAGHI.*

p. 463. l. 10. *post necessarium adde* Sed etiam Cl. MASSIMI experimenta sua producit, quæ his nostris placitis, si nostra dicere licet, undique contraria obnituntur. Nervis nempe irritatis, motum cordis accelerari *a\*)*, & cor a quiete ad motum redire *a\*\*)*. Medulla spinali irritata, cor quietum ad motum rediisse, aliisve nervis irritatis *a\*\*\*)*. Sed etiam tunc cor ad motum reversum irritato nervo, cum ipsum irritatum nihil mutaretur *a†)*; Resectis vero nervis recurrentibus, irritabilitatem cordi subtractam fuisse *a††)*; cordis etiam evulsi motum, recurrentibus nervis irritatis, accelerari *a†††)*.

pag. 463. l. ead. Sed neque vidi *lege* Verum abunde est testium

ibid. l. 11. *lege* cordis motum nunquam acceleratum fuisse, neque pulsum &c.

ibid. l. 12. *post erupisse adde* Ita ego vidi.

ibid. l. antepen. *adde* A convulsione, per irritatem medullam spinalem excitata, aliquantum quidem sanguinis motum turbari, sed cito in ordinem redire vidit accuratior L. SPALANZANUS; neque irritamenta nervorum, neque resectam medullam spinalem, neque cerebrum resectum motum cordis interrumpisse. Vidit MONROUS junior destructa medulla spinali tamen pulsum superesse. Nuper Cl. JOHNSON medullam spinalem irritatam negavit quicquam in cordis motu mutare. In repetitis experimentis CALDANUS nervorum irritationem convulsionem fecisse, cor immotum ad motum non revocasse reperit. Perinde in III FONTANÆ experimentis, octavus nervus & medulla spinalis, & cerebrum, stimulo suo motum cordis neque accelerant, neque suscitant quando conquievit *n\*)*, ut omnino is motus voluntati non obediat *n\*\*)*. Qui minime mecum amat sentire Cl. TRABUCCHI, ligatis nervis, pulsum cordis potius augeri vidit. In experimento III. SWIETENII, a Cl. MARHERR relato, & intercostalibus, & vagis nervis ligatis

pag. 462. not. b) *lege Advers. anat.* p. 65.

*a\*)* DASSIMI II. *esper.* 15. recusum octavo & bronchialibus.

*a\*\*)* Id. *esper.* 4. *a\*\*\*)* *Esper.* 14.

*a†)* *Esp.* 2. *a††)* *Obs.* 3. *a†††)* *Esp.* 13.

*n\*)* *Ricerche* p. 90. *n\*\*)* p. 98.



animal vitale superfuit. Resectis nervis octavi paris, pulsus cordis per 50 horas superfuit, testibus Cl. viris BONIOLO & PAGANO. Demum ipse Cl. MASSIMI vidit, nervis irritatis & medulla spinali lacerata, cor nihil mutatum, & ab effectu *u*<sup>\*</sup>), ut puto, opii *u*<sup>\*\*</sup>), & absque opio in plusculis experimentis.

pag. 463. l. penult. *lege* Poterat motus cordis ligatis nervis superstes ab iis majoribus &c.

p. 464. l. 18. Primus experimentum GALENUS protulit ---- Neque irritata medulla mihi cordis modum revocasse visa est \*) *lege* Verum his experimentis enarrandis suus erit locus c), & ostendendum, etiam hic vulnere medullæ spinalis vim in occidendo animali nimium fuisse ornatam d).

p. 465. l. 20. *adde* Video etiam pro nervosa in cor potestate opii vim produci, quod in aqua solutum infusum cor celerrime ad quietem reducat *r*<sup>\*\*\*</sup>), in ipsum cor impulsus promte motus finem faciat. Verum experimenta hæc partim nondum satis firma sunt, partim aliam admittunt interpretationem. Cl. TRABUCCHI, scriptor rebus meis potius infensus, opiatam aquam cordis motum accelerare reperit, cicutæ extractum & hyoscyami nihil omnino mutare. Ill. FONTANA opium extus musculis admotum nunquam vim insitam minuisse vidit. Cl. CARMINATI nuper in plurimis experimentis ab opio cordis actionem vidit *r*<sup>†</sup>) aut augeri, aut certe conservari. Denique ex insigni effectu, quem opium in ventriculum, atque in intestinum edit, locus est suspicioni, non nerveam solum vim ab opio imminui, sed pariter etiam vim insitam.

Quare puto, libratis contrariis experimentis, me iis, quæ ipse vidi, quæ summi in experiundo viri constanter viderunt, omnino assensum debere. Cor nempe ab aliis musculis hactenus dissidere, quod nervorum vis in ejus motu producendo non ea sit, quæ experimento possit demonstrari. Posse ad integritatem cordis, ad vim fibrarum sustentandam, nervorum aliquam esse potentiam. Alia tamen potentior cordi est causa motrix, quæ absque nervis

*u*<sup>\*</sup>) *Esp.* II. p. 15. Lente se contraxit *esp.* 22. 39. 19. 20.

*u*<sup>\*\*</sup>) *Esp.* 23.

\*) Notæ ad hunc textum spectantes a nova editione quoque absunt.

c) L. X. S. I. n. 36.

d) Ibid. n. 37.

pag. 465. ad verbum *irritabilis in textu lin. 9. adde* not. *r*<sup>\*\*</sup>) MASSIMI II. *esp.* 20. 22. 24. 26.

*r*<sup>\*\*\*</sup>) ALBIN. *nat. hom.* p. 33. 34.

*r*<sup>†</sup>) *De anim. in mephit. interitu*, pag. 134. 135. 137. 139. 143. 144. 145. 147. 149. 150. 151

vis omnino excitari nequit. Is, qui integro libro me refutare suscepit, fatetur tamen vim volantis & nervorum in cordis motum comparatam cum vi stimuli pene nullam esse r††).

Superest aliud dignum ingenio F. FONTANÆ experimentum. Vidimus in experimento r†††) ventriculum dextrum ante sinistrum quiescere, si prior vacuetur; sinistrum ante dextrum, si, ut vulgo fit, prior inanis fuerit. Sed iidem nervi utrumque ventriculum adeunt. Quiescit ergo alter subtracto stimulo, etsi nervi vis præsto est, dum alter pergit operari; ergo iidem & motum producant, & nullum producant r††††).

Eodem pertinet, quod irritatis nervis recurrentibus etiam solus ventriculus dexter ad motum incitatus fuerit, absque sinistro r†\*†).

Ex FONTANÆ porro experimentis sequitur irritationem admotam necessariam esse, neque ea si absit, etiam integros nervos operari. In altero experimento MASSIMI apparet, posse partem musculi ad motum inidoneam esse, dum altera integram facultatem motricem conservat.

§. II\*. CL. D. A. WILSONI objectiones.

Qui nuperrime ad vim cordis refutandam accessit, *Andreas WILSON*, non ille quidem per experimenta ad hanc litem præparatus, ingenio tamen non vulgari vir, alias vires esse objecit, quæ omnino ad cor referri nequeant, qualis vis est resorbens vasorum lacteorum aut lymphaticorum, vis etiam sanguinis venosi, qui portarum venam perfluit. Cordis motui nihil a corde accedere, neque enim plus in sanguine arteriarum motus esse, quam in venarum cavarum sanguine, cujus momentum potius majus sit. Neque sanguinem fetus venosum a corde fetus suum motum accipere. Non debere vires cordis ita æstimari, ut sint ultima ejus musculi exserta potestas, quam nullus musculus diu ferre possit. Principia motus in sanguine multa esse, quæ cordi non tribuas, ut evaporabilis elementi ad avolandum agilitatem, ut fermentationem certe inchoatam, ut conatum ad extricandum aërem fixum. Accedere præcipuam systematis nervosi potentiam, quæ tam violenta cum sit in animi passionibus, non possit in homine tranquilli animi nulla esse. In ipsis fluidis habitare vitam & activitatem propriam. Irritabilitatem *Idem* aggreditur, quod per irritationem musculi aliqui, & potissimum sphincteres relaxentur. Videri cordis effectum potius esse depletionem primo venarum,

r††) *Observ.* p. 140.

r†††) *In propr. diff. Comm. Gotting.* T. I.

r††††) *Ricerche* p. 94.

r†\*†) *MASSIMI esper.* 15.

*Fascic. I.*



ut sanguini redeunti vacuum spatium præparetur, quo tendere possit: tunc sanguinis in partes solidas impulsus, quo stimulentur, & earum robur augeatur: sed etiam vitam partium fluidarum a cordis impulsu suscitari, & chylum cum sanguine, cum eodem aëre in pulmone resorptum misceri: effluvia dissipari, ne in massas coalescant.

Hinc RÖDERERUS in fetu quidem non a corde, sed a calore, aut a vi attractili motum sanguinis derivabat at\*\*).

pag. 466. l. 4. *post* continuat *adde* anguilla ad quadragesimam.

ibid. l. 12. *dele* qui in corde a frigore coactus motum cordis sufflammat,

ibid. l. 14. *post* habeat *adde* Fere semper superare CIGNA d\*), ut in experimentis *van den BOS* c\*)

ibid. l. 23. *adde* Adde nunc multo violentiorem, quam ullius alterius musculi, cordis motum esse.

In his experimentis consentiunt nobiscum alienissimi alias a rebus nostris scriptores, ut Cl. *van den BOS*. Sesequihora aliorum musculorum irritabilitati naturam cordis irritabilem superfuisset vidit vir Cl.

Pauca equidem experimenta passim lego, in quibus cor irritabilitatem amississe dicitur, dum ea potestas in musculis f\*), in oesophago, in ventriculo, in lingua supererat. Nihil equidem unquam simile vidi. Si alii Cl. viri viderent, putem pectus ante abdomen apertum fuisse, & aëri expositum adipem ejus cojuisse: frigidum autem cor, & coacto adipe tectum utique ad motum ineptum fit, dum interim muscoli, oesophagus & ventriculus, suis tecti velamentis, calorem & necessariam mollitiem conservarunt. Manifesto Ill. FONTANA, quo cor pinguius est, eo citius desinere moveri, & eo diutius ejus

††\*) *Comment. Gotting. T. IV.*

pag. 465. not. t) *adde* *Sermon second* p. 32. exp. 420. 421. 438. 372. 364. CARMINATI lib. cit.

pag. 466. not. y\*) *lege* *Oper. min.* p. 263.

ibid. not. z) *adde* CARMINATI p. 9. a fumo sulphuris incensi, tum p. 18. 19.

ibid. not. a) *adde* CARMINATI p. 121. 124. 116. 118. 183. 62. 63. 64. 171. 169. 151. 150. 149. 147. 144. 139. 137.

ibid. *ad verbum* secum in *textu* l. 14. *adde* not. c\*) p. 4.

d\*) *Vir. corp. solid. exper.* 12.

d\*\*) *Philos. Transf. Vol. H. P. II.* p. 404. Non ideo neges, vehementiorem fumi carbonum efficaciam demum animal occidere, & cordis irritabilitatem destruere, FONTANA *ricerche*, p. 131.

ibid. *ad verbum* pulsare in *textu* lin. 21. *adde* not. e\*) A tabaci fumo CARMINATI p. 169. 175. A camphora p. 181. 183. ab aëre renovato p. 90. 105. 106. a pulvere pyrio p. 30. a vapore ferri in spiritu nitri soluti p. 43. 44. ab arsenici vapore p. 62. a plurico aëre p. 116. 118. a carbonum fumo PRESSAVIN *recherches*.

f\*) MASSIMI II. *esp.* XI. ad quadraginta minuta, FONTANA p. 153. de bobus CARMINATI a tabaci fumo, p. 115. & sulphuris p. 8. 9. 18. 19. 14. 15.

motum superesse, quo magis in calido servatur *f\*\**). De mum etiam ideo fatetur cordis irritabilitatem superare, quod interna facies cordis ab aëre tuior sit *f\*\*\**) Nos in solo experimento nos continemus.

pag. 466. l. ult. *post* aliam *adde* præter nervos,

p. 467. l. 1. *post* subjunxisse *adde* Ab omni utique stimulo cor irritatum motum concipit. Pericardio solo tacto motum cordis acceleratum fuisse, nondum tangente musculus instrumento *ft*). Id mihi nimium videtur, qui cor, ut irritetur, contingi debere expertus sim. Minimum stimulum sufficere Cl. viris credo & mihi, ut ab aquæ guttula, a contactu capilli ad motum revocetur *ft†*).

*ibid.* l. 5. *adde* In animalibus simplicissimis, quorum summa est irritabilitas, sola aqua sufficit, ut in rotifero animale, quod in aridum polinem dilapsum, humectatum ad motum, vitamque redit.

*ibid.* l. 6. *lege* & solo digito calido, aut adpersa calida &c.

*ibid.* l. 7. *post* anguilla *adde* in mure demum marmota, aliisque animalibus per totam hiemem sopitis & frigentibus, quibus solus veris gratus tepor pulsus, vitamque reddit. Subito etiam latentem vitam effusa fervida suscitatur;

*ibid.* l. 16. *post* contemplari *adde* Cuniculi languidi a calore foci tamen refocillantur, etsi paralytis in musculis superest *n\**)

*ibid.* l. ead. A fervida occiditur *lege* A fervida idem vehementer palpitatur, ut brevi quiescat *o*), & *adde* Audiendi vero hic potissimum sunt Cl. MARTIN & POITEVIN, qui annotarunt, quot pulsibus quisque gradus caloris aucti, aut diminuti pulsus priorem augeat vel minuat.

Ita in experimentis D. POITEVIN *o\**), cum medius calor esset 29 gr. REAUMURI, duos pulsus legas accessisse ad gradum 30, sex ad 31½, triginta duos ad gr. 35, quadraginta & unum cum palpitationibus ad gr. 36. Vicissi detracti duo gradus demserunt pulsus duos; ad gradus 26 fuerunt diminuti fenis, gradibus ad gr. 25. reductis defecerunt pulsus 12, ad gr. 22 pulsus 17, ad gr. 16 caloris pulsus 25.

Cl. MARTIN *o\*\**) demtis gradibus caloris 15 reduxit pulsus a 78 ad 64½.

*f\*\**) *Ricerche* p. 151. 152 etiam evulsus p. 154.

*f\*\*\**) p. 155.

*ft*) MASSIMI II. *esp.* 30.

*ft†*) FONTANA *ricerch.* p. 93.

p. 467. not. l) *adde* CALDAN.

*n\**) CAVERHILL *heat*.

*o\**) *In propr. lit.*

*o\*\**) *Sw. Wet. Acad. Handlingar* 1773.

pag. 467. l. 18. *ad verbum* instrumento *in textu* *adde* not. *o\*\*\**) Punctura acus auriculam ad vehementem contractionem incitat CALDAN. *riflessioni* p. 245.



Auxit  $33\frac{1}{2}$  gradu ad 94 cum sudore, tum gradu 35 ad 107 cum vehementer sudore, & gradu 36 ad 117 pulsus cum palpitatione.

Rationem aucti a colore pulsu, aut a pulsu caloris non constantem esse alias ostendemus, cujus anomalix multæ causæ sunt.

pag. 468. l. 4. *adde* & moribunda animalia suscitatur *b\*)*, certa tamen cum mediocritate, violentior enim necat.

ibid. l. 7. *post* fueris *adde* Si una in fede cor irritaveris, ea sedes post contractionem irritabilitatem amittit; cum alia particula cordis irritata motum recuperet *c\*)*.

ibid. l. ead. *lege* Multum

p. 469. l. 8. *post* tentavi *adde* Demum accurate apparet, aërem in cor quiescens impulsus, ex ordine venam cavam, auriculam, ventriculum ad motum revocasse. Sic pueros a partu pene inanimos obstetrices suscitare norunt stricto funiculo umbilicali, ut aliqua sanguinis penus in cor quiescens repellatur. Evidentius etiam in corde longo, quod diximus, erucæ, naidis, aliorumque vermium, humor vitalis primum nodulum replet & distendit; tunc idem evacuatur, & alterum nodulum sanguine inundat. Is nodulus, uti sanguinem accepit, ita irritatus se contrahit & evacuat. Ita sanguis ad tertium & sequentes nodulos venit, & dilatationi contractio in quoque nodulo succedit.

Video contra ista Cl. MEZGERUM objicere, has successiones in cordis motu antagonismo regi, non stimulo. Auriculam enim extractam de corpore, ventriculum extractum, vicibus alternis laxari & contrahi, licet eodem tempore stimulus adveniat *q\*)*. Mihi, si hæc recte intelligo, hæc contraria videntur experimentis dudum productis *q\*\*)*, quibus uterque simul ventriculus, utraque simul auris, uno tempore, sed quæque auris ante ventriculum contrahitur.

ibid. l. 12. *adde* Quare cum natura irritabilis cordi propria sit, poterat expectari, quod etiam experimento confirmatur, cor primum inter omnia corporis humani organa irritabilem vim conspicuam demonstrare. Ita in pullo

*b\*)* BOSCH *febr. epid.* p. 366 in ranis

pag. 468. not. c) *adde* MASSIMI *esp.* 28. P. H.

*c\*)* MASSIMI *ib.*

pag. 468. not. d) lin. 3. *adde* CALDAN. *risteff.* p. 253.

pag. 469. not. k) *adde* Huc referas experimentum, quo aër in asperam arteriam impulsus cordis silentem motum revocavit, PORTAL apud COLOMB p. 15.

*q\*)* *Advers.* p. 134.

*q\*\*)* *vid.* Sect. IV. §§. XX. XXI.

p. 469. not. f) *adde* Ob aërio contactum hanc esse diuturnam irritabilitatem, FONTANA. *ricerche*, p. 155.

incubato cor altero die vividissime micat, & stimuli impatientissimum est; quo tempore serum pro cerebro est, pro musculis iners gelatina, pro intestinis surdæ ad stimulos chordulæ. Ita ut primum irritabilitatem expedit, ita ultimum eam deponit.

pag. 470. l. 2. adde Diutius a\*) pulsat cor cati, quam canis, sed minus diu, quam ranæ.

§. IV\*. *Causæ, quæ irritabilitatem destruunt: in corde potissimum.*

In universum, quæ necant, ea putes cordis irritabilitatem aut ipsam destruere, aut certe ita statum hujus musculi vitari, ut motum producere ineptus sit.

Ita agit sulphuris vapor & nux vomica a<sup>2</sup>); ita morsus viperæ a<sup>3</sup>); ita electrica vis auctior, qualis est in fulgure, & quæ facit, ut cor irritatum non nisi tremores aliquos cieat.

Ita frigus irritabilitatem aufert, etiam adipis circumpositi a<sup>4</sup>). Sic nimius fervor, qui post breves tremores quietem facit irrevocabilem a<sup>5</sup>). Sic, ut multa omittam, nimia plenitudo; ad certum enim gradum distenta auris, aut ventriculus cordis, vim irritabilem amittit a<sup>6</sup>). Porro rigor tonicus, ut in universum musculos aliquamdiu ad novas contractiones ineptos reddit, ita & cor ipsum a<sup>7</sup>). Hunc in pullis ultimum cordis statum esse CALDANUS annotavit a<sup>8</sup>).

Sed potissimum ipsa contractio vim irritabilem exhaurit. Accuratius propria experimenta contemplati Cl. viri invenerunt, in frigidis etiam potissimum animalibus, unam irritationem a<sup>9</sup>) unam contractionem ciere: mallem ego a<sup>10</sup>), ad mea pericula, aliquot contractiones. Verum Ill. viri docent, succedere, etiam præsentē stimulo, quietem a<sup>11</sup>), & videri irritabilem vim reparari debere, & sensim quasi accumulari a<sup>12</sup>), quoad in novam contrac-

a\*) CARMINATI p. 9. &c. & pene a foetore putrido.

a<sup>2</sup>) Strahlst. Magaz. I.

a<sup>3</sup>) Ricerche sub finem.

a<sup>4</sup>) p. 397.

a<sup>5</sup>) p. 400.

a<sup>6</sup>) Sw. Wet. Acad. 1764. Trimestr. 4.

a<sup>7</sup>) In experimentis CALDAN. risseff. p. 241. 243. 249. FONTANA leg. irritab. diff. II.

a<sup>8</sup>) Risseff. p. 233.

a<sup>9</sup>) CALDAN. risseff. p. 249. FONTANA leg. p. 13.

a<sup>10</sup>) Id. p. 14. CALDAN. ib. subinde

a<sup>11</sup>) FONTANA ib.

a<sup>12</sup>) Idem. ricerch. p. 129.



tionem perfici possit ; ita ex quiete cor sponte videri ad motum redire , quod in ranis frequenter vidi <sup>a<sup>13</sup></sup>). Junioribus animalibus eam vim celerius reparari <sup>a<sup>14</sup></sup>).

pag. 470. l. 5. *post* habere *adde* Rejicit undique FONTANA , ut in nervis non solum non sit efficax causa motus cordis , quod ostensum est <sup>a<sup>15</sup></sup>), sed ne excitans quietem. Neque enim in ratione vis irritabilis esse effectum , levemque stimulum , qualis est in aëre afflato , cor melius ad motum excitare , quam graves acrimonias ; pressamque vehementissime cutim vix sensum sui facere , cum titillatio animam pene ad desperationem agat <sup>a<sup>16</sup></sup>).

ibid. l. 13. *adde* efficacem ejus motus causam. Neque hic ullum in objectione robor est ; in experimentis paucis quidem , tamen certis , cor irritabilem naturam deposuisse , quo tempore muscoli , & œsophagus & ventriculus vim insitam , & impatientiam stimuli demonstrabant. Id enim phænomenon , quod ego quidem nunquam vidi , frigido aëri tribuo , qui cor in aperto pectore nudatum percusserit , dum clauso in abdomine , velatisque per cutum & adipem musculis , calor aliquis superfuit ; frigidum enim cor , & adipe coactum , utique ad motum ineptum est.

p. 471. l. 3. *adde* sturione <sup>p<sup>\*</sup></sup>)

ibid. l. 8. *post* viri *adde* quadragenis CALDANUS. <sup>z<sup>\*</sup></sup>)

ibid. l. 9. *post* duodecim *adde* & lucii <sup>a<sup>\*</sup></sup>), tum

ibid. l. 13. *post* redeat *adde* Salamandræ aquaticæ ad octo & novem horas cor micat.

ibid. l. 14. *post* residet *adde* Solebat in nostris experimentis mane factis multam in noctem cordis micatio supereffe , ut altero demum mane siccum jam cor irritabilem naturam deposuisset

p. 472. l. 6. *lege* alii viderunt ,

ibid. l. 11. *post* reperiuntur *adde* & in isto quidem tenero animalculo multarum horarum constantiam sæpe sum admiratus , quam olim Angli philosophi quatuor horis superfuisset viderunt.

<sup>a<sup>13</sup></sup>) FONTANA p. 10.

<sup>a<sup>14</sup></sup>) FONTAN.

<sup>a<sup>15</sup></sup>) Lib. IV. 5. V. §. 2.

<sup>a<sup>16</sup></sup>) *Ricerche* p. 88. 89. de spiritu animali , sed de nervis perinde verum est.

<sup>p<sup>\*</sup></sup>) ANDRIOLI febr. p. 72.

<sup>z<sup>\*</sup></sup>) *Risèss.* p. 70.

<sup>a<sup>\*</sup></sup>) VALERIOI. loc. com. I. c. 15.

pag. 471. not. m) *adde* CHIRAC *advers.* p. 122.

pag. 472. l. 15. *adde* Non recusabo evulsum citius quiescere, quam suo loco relictum c\*).

ibid. l. 19. *adde* cane rana g\*)

ibid. l. 20. *lege* similia vidi & *adde* Inter cōquorum manus de sartagine, in qua frigebatur, cor salmonis exiliit HOUTTUYN.

p. 473. l. 16. *post* exstinguatur *adde* Olim ARISTOTELES pulsum cordis fieri scripsit a calore, qui sanguinem elevet, & alternis vicibus subsideat. Deinde CARTESIUS ab eo igne aiebat, sanguinis &c.

ibid. l. 17. *lege* ad modum

ibid. l. 21. *lege* limitibus

ibid. l. 24. *adde* Fermentatione aliqua cordis motum continuari equidem NEWTONI fuit conjectura, quam omittimus.

p. 474. l. 18. *lege* & cerebelli vulnera læsiones cerebri periculo superare;

ibid. l. 20. ejus particulæ *lege* ejus cerebelli

ibid. lin. ead. *post* repetemus *adde* Verum rationes Cl. viri, & affectas ejus late patentis opinionis, & nostras, quæ fecerunt, ne in ea parte manerem, dicam libro X. *Hæc in nova editione ultima octava paragraphi verba sunt; cuncta enim reliqua, prout & nonam paragraphum Auctor delevit.*

p. 481. l. 14. *post* confirmare *adde* Cochleam citant, & mytulum & gagnum, in quibus cor modo moveatur, modo quiescat, ut ex arbitrio animalis ejus motus pendere videatur. Rotiferum animal t\*) cor habere voluntati obnoxiam Cl. viri conjectura fuit, quod tamdiu ageret, quamdiu rota animalculi in gyrum circumiret. Sed id cor alii accurati viri pro venticulo habent.

p. 482. l. 8. *adde* Experimenta quoque in cochlea & in buccino facta non demonstrant, a voluntate motum cordis pendere, qui ex defectu stimuli cessare, & cum stimulo reparato renascit queat.

ibid. l. 20. *lege* quinquaginta

p. 483. l. penult. *lege* penitus suppressus nihilo magis voluntati obedit, quando a quiete ad motum rediit

ibid. l. ult. *post* recensebo *adde* Celeberrimum exemplum est Card. ESPINOZA, qui, cum cadaver balsamo condire aggredierentur, aperto pectore, corde

c\*) MASSIMI II. p. 7.

g\*) TRABUCCHI *respir.* p. 106.

pag. 472 not. t) *adde* MASSIMI II. *esp.* 11.

t\*) FONTANA *ricerche*, p. 98.



palpitante, vitæ indicia dedit, quem medici, ut culpam tegerent, taciti extinxerunt *g*\*). Satis simile exemplum habet Cl. PEU. Cum enim speculum nullum halitum demonstraret, neque in corde motus esset, femina se concussit, cum pectus incidere vellent *g*\*\*).

pag. 484. l. 8. *post* fuit *adde* Femina absque pulsu pro mortua habita, multis ab eventu annis vitam *m*\*) redditam conservavit.

ibid. l. 12. *post* vitalis *adde* Post septem dierum asphyxiam reconciliata femina *p*\*).

ibid. l. 13. *lege* cum a frictione excitata *q*) fuisset *Et adde* Sepulchro erepta, quæ absque pulsu fuerat *q*\*).

ibid. l. 16. sex integris septimanis *lege* quadraginta sex diebus integris

ibid. l. 18. *post* celebravit *adde* redivivam,

ibid. l. 19. *post* vixisset *adde* In mure montano simplicius est experimentum, quo tamen perinde nostra sententia confirmatur; in eo enim animali, tum in erinaceo, in hirundine, post multorum mensium quietem frigidum animal & exanimi proximum facillime, calore reddito, cum vita reconciliatur.

ibid. l. antepen. *post* producit *adde* Maxime vero memorabile hujus rotiferæ bestiolæ exemplum est, & veræ resuscitationi proximum. Neque enim flaccescit unice, & immotum per duos & per quatuor annos manet, sed omnino exarescit.

ibid. l. ult. *adde* Sic anguillæ in tectorum impluviis habitantes, & animalculum tardigradum, quod de rotiferi affinitate est *x*\*).

p. 485. l. 23. *post* separatum *adde* Testudinis (caput) avulso corde vivere jam ARISTOTELES vidit, & anguillæ. Limaces, in experimento sæpissime repetito, detruncato capite, & vivunt, & novum cum oculis caput reparant. Inter calida animalia aviculæ, capite celeriter defecto, currunt & pene semihorio supervivunt.

p. 485. l. 6. *adde* A cordis quiete experimenta expulfare *n*\*).

pag.

*g*\*) CABRERA apud BRUHIER, II. p. 459.

*g*\*\*) PEU p. 334.

*m*\*) HAMILTON de febre miliari.

*p*\*) VALISNERI raccolt. p. 64.

*q*\*) TIMONI bains des orient. p. 32.

pag. 484. not. *x*) *adde* Rachitici SPALANZANI Opuscoli II, ROFREDI ap. ROZIER, Journ. de physique 1775, Janvier, Avril.

*x*\*) SPALANZANI, ib.

pag. 485. not. *c*) *lege* XII.

*n*\*) STAHL theor. mort.

pag. 486. not. *s*) *lege* de locust. I. p. 26. lin. 2. *lege* capite *Et dele* solum.

pag. 487. l. 10. *post animam dele* hætenus.

p. 488. l. 25. *adde* Nuper vir Ill. hanc cordis prærogativam rejecit, cum & diaphragma & intestina perpetuo motu exerceantur *l*\*). Verum directe ostendemus, irritabilitatem cordis in frigidis animalibus majorem, constantiorem esse, præcociorem denique, ut immensum musculorum privilegium superet. Sed & in calido pullo manifestò cor ante musculos movetur, & omnibus denique carnibus constantius. Intestina enim non perpetuo, sed per intervalla, peristaltico motu agitantur, quem adeo longa quietis intervalla interrumpunt, ut Cl. viri negaverint, omnino eo motu gaudere. Diaphragmatis privilegium ad cordis privilegium proxime accedit, multo tamen lentius, & quadruplo longioribus intervallis agit, & certis in occasionibus quiescit, ut in graviditate, & in universum in feminis, quæ pectore magis respirant. Denique diaphragma soli classi animalium quadrupedi datum, non potest cum corde comparari, quod in animalibus vegetum adsit, quibus nullum, aut immotum membranaceum septum sit, quale in avibus est, & in piscibus.

p. 489. l. 14. *post obtusum esse adde* Insensibile repererunt in experimentis *Anna Car.* LORRY, & CARRERE, & HAENIUS, & stimulum certe sanguinis sensu non percipi, verissima est CALDANI annotatio.

Alia conjectura est, ideo cor magis irritabile esse, quod &c.

ibid. l. 22. *adde* Hanc pro hypothese affero, pro ea nolens contendere. Rejecit Cl. FONTANA *t*\*), rejecit Cl. YPEY *t*\*\*). Loco hujus conjecturæ aliam affert Cl. FONTANA. Sufficere putat, quod cor diu moveatur, ut porro facilius motum continuet *t*\*\*\*). Mihi contra, musculus, qui diu operatur, enormiter fatigari, & ad motum præ dolore ineptum fieri videtur, quod in rectis & vastis expertus sum, cum biduo continuo in cuniculos subterraneos descendissem.

pag. 485. not. *t*) *adde* CALDAN epist. ad nos.

*t*\*) FONTANA *ricerche*, p. 151. 161.

pag. 489. not. *s*) lin. 2. *adde* FONTANA *ricerche*, p. 158. 159. — lin. 4. *adde* Ego, qui palpitationibus cordis & pulsui intermittenti obnoxius fui, sæpe in cordis sede dolorem percepi, quem tamen, accuratius sensationem meam scrutatus, in musculis pectoris residere reperi.

*t*\*) *Ricerche* p. 151.

*t*\*\*) *Observ. physiol.*

*t*\*\*\*) *ib.* p. 161.



pag. 489. l. penult. *lege* eo enim in moribundo animali ex vena in aurem expresso.

p. 490. l. 16. *post ferre adde* Perit equus, cujus sanguis non supra duos pedes salit, teste *Stephano* HALEs *k\*)*. Pulli, carotidibus apertis, continuo extinguuntur.

ibid. l. 20. *lege* Hinc in vivo animali, in nostris & Cl. BOHNII experimentis, cor atrociter laborat, cet.

p. 491. l. 6. *post aërem adde* In experimento Cl. PORTALII, cum aër per venam iugularem impelleretur, ut exinde in venam cavam superiorem, auriculam dextram, & ventriculum dextrum advenit, ita eae cavæ se contraxerunt.

ibid. l. 18. *lege* in meis *y)*, inque clarissimorum CALDANI, FONTANÆ, SICHII *y\*)* & adversariorum pariter *z)* experimentis: & ventriculos, dum auriculæ integræ pergunt moveri, atque omni sanguine, aërisque parte majori substracta, continuo de motu desistere, sive in ventriculo cordis experimentum feceris, in aure perinde successurum.

p. 492. l. 8. *adde* Est etiam, ubi ventriculus sinister non inane dextrum in locietatem sui motus traxit, & vicissim.

Denique aër in corde relictus mobilissimum musculum in motum ciere potuit. Eum si extraxeris, in Ill. CALDANI experimentis, cor porro perpetuam quietem agit.

p. 493. l. 5. *lege* ut cor integre evacuaretur *n)*.

ibid. l. 21. *lege* vel fortiolem & celeriolem efficiat, vel certe ad animi motus contemperet.

ibid. l. 22. *adde* Objectum est, sæpe in cadaveribus cor non inane, inque eo sanguinem reperiri, plerumque in thrombos coactum. Non perpetuum est. Ipse Ill. HAENIUS cor inane vidit; vidit, qui plurima cadavera incidit, Cl.

pag. 494. *ad verba* certum est in textu lin. 10. *adde* not *e\*)* Contrarium, ut videtur, experimentum MASSIMI *esp.* 10. 11, qui sanguinem in cor venire, & de corde per vulnus exire vidit, nullo cum ejus musculi motu. Verum stimulus excitat vires, non generat. Si cor ad motum ineptum fuit, si irritabilitatem amisit, qui temporis effectus est, omnino sanguis illapsus motum ciere non potuit, uti nec in cadavere humano potest.

*k\*) Hamast.* p. 16.

*y\*) FONTANA ricerch.* p. 97, JOHNSTON *gangl.* p. 31.

GREEDING *r*\*). Ceterum intelligitur, in moriente animali vires cordis exhaustas denique, ante quietem perpetuam, eo redire debilitatis, ut stimulum quidem sentiat, tamen se contrahere atque stimulo se liberare minime valeat. Perinde obiectum est, in corde calculos & ossea concrementa reperta esse, neque tamen minus cordis alternas contractiones locum habuisse *r*\*\*).

pag. 494. l. 5. *adde Felicis FONTANÆ, Cl. JOHNSTON h*\*),

ibid. l. 6. *adde* Accuratius viri præstantissimi F. FONTANA & M. Ant. L. CALDANUS viderunt, cor relaxatum, irritatum semel, & in frigidis etiam aliquoties contrahi, non tamen continuo, sed post tempusculum, in quo stimulus in fibram potuit vim suam exerere, celerius tamen in juniore animali.

ibid. l. 12. *dele* totus

p. 495. l. 9. *post* adeo *adde* cavæ sinistræ

p. 496. l. 12. *adde* Hanc successionem quietis sæpe observavi, annotavit etiam Ill. CALBANUS. Ventriculus sinister primus quiescit; tunc auricula ejus lateris, porro ventriculus dexter, dum auricula dextra pergit micare, ultimo vena cava quiescit.

p. 497. l. 25. *adde* De puero nuper nato diximus, quem sanguine de funiculo in cor impulsio ad vitam revocamus. Hæc repetentur Libro IX.

p. 498. l. 3. *post* motus *adde* serius

p. 502. l. 12. *adde* Deinde ex sapiente NEWTONI lege, cum causam habeamus sufficientem, quare cor per stimuli ipsius alternam absentiam & restitutionem alterne quiescat, & ad motum redeat, non attinet pro eodem phænomeno exponendo alias causas conquirere.

ibid. l. 22. *post* nervo *adde* plerumque

p. 503. l. 10. *adde* Causam, cur supra valvulas ponantur, Ill. FONTANA suspicatur eam esse, ut sanguis ex aorta retrogradus in eas effugium inveniat *i*\*).

ibid. l. 18. retro *lege* pone

*r*\*) In *Adversar. LUDWIGII*:

*r*\*\*) *Ricerch.* p. 121.

*h*\*) *Of ganglions* p. 18.

pag. 503. not. *h*) lin. 1. *adde Advers.* p. 121.

*i*\*) *Ricerche* p. 119.



pag. 503. l. 19. *lege arterias*

ibid. l. 20. *post excavatis adde nervi*

p. 504. l. 13. *adde* Sed etiam longe vehementiorem compressionem nervi musculum non reddere paralyticum FONTANA expertus est *a\*)*.

p. 506. l. ult. *adde* Ceterum de motu five simultaneo, five peristaltico per arterias non potest res oculi, aut ullius sensus testimonio definiri; id enim in tanta celeritate tempusculum nec alternam cordis efficaciam demonstrat *p)*, neque in duobus distantium partium pulsibus successione percipit.

*a\*) Ricerche p. 85.*

*p) SPALANZANUS p. 23.*

---

AUCTARIUM  
AD  
ALBERTI HALLERI  
ELEMENTA  
PHYSIOLOGIÆ  
CORPORIS HUMANI.

*FASCICULUS SECUNDUS.*

SANGUIS. EJUS MOTUS. HUMORUM SEPARATIO.



LAUSANNÆ HELVETIORUM;  
Sumptibus JULII HENRICI POTT ET SOCIORUM

---

M. D. CC. LXXXII.



PHYSIOLOGIA

ALBERT HALL

EXHIBITION

PHYSIOLOGIA

CONCORDIA HUMANI

CONCORDIA HUMANI

CONCORDIA



CONCORDIA HUMANI

CONCORDIA HUMANI

CONCORDIA HUMANI

CONCORDIA HUMANI

# ELEMENTORUM PHYSIOLOGIÆ

CORPORIS HUMANI.

TOMUS SECUNDUS. (\*)

## PRÆFATIO.

**P** Ag. II. lin. 8. *dele* Repetitiones exofam mihi vitium---dum facilia ea sint,  
p. III. l. 3. *post* inventione *adde* me  
ibid. l. 5. *dele* deque valvula coli.  
ibid. l. 24. *lege* alienove  
ibid. l. 27. *dele* De valvula coli ignoscat --- excusat deteriora.  
p. IV. l. 19. *dele* Ceterum in his ipsis --- ad verum accedere possim.

## EXCERPTUM EX PRÆFATIONE AD NOVAM EDITIONEM.

In nova editione pluscula mutata fuerunt, maxime in sectione secunda, in qua de sanguinis elementis agitur. Non potui de electrica materie, non potui de phlogisto silere, quam utramque materiem inter sanguinis elementa præcipua, eaque numerant, quorum efficacia mortuas alias humorum particulas incitat, vitæque causa est.

Breviter equidem; neque enim ausus sum in re nova, mihi per propria experimenta non perspecta, in minuta quæque me diffundere, neque satis confirmata sunt, quæ de utriusque elementi phænomenis prodierunt; & superfuit, qui de ipso etiam novorum experimentorum eventu dubitent. De calore, & eo potissimum, quem in aëre circumposito corpus humanum cum vita superstiti fere potest, nova experimenta extant, quæ nostris prioribus subvenerunt, & coegerunt me, ut ordinem sermonis mutarem, ne omnino similium testimoniorum nimia turba fieret. De globulorum etiam colore, figura, fabrica,

\*) Primam hujus tomi partem Auctor FELICI FONTANÆ, secundam LAZARO SPALANZANO & tertiam JOHANNI VIVENZO dicavit.

pag. III. *ad verbum prævideram in textu lin. 4. adde* not. a) Ea epistola inter amicorum epistolas nunc prodit.

pag. IV. *ad numerum 1742. in textu lin. 11. adde* not. b) COMES THOMSIUS, cujus epistola propediem inter alias amicorum epistolas edetur.



extant egregia nupera Cl. virorum experimenta, tantum ut aliqua a meis undique aliena sint, quæ cum meis audiisse oportuit. Nihil autem inveni causæ, cur a prioribus meis effatis recederem. De duplici coagulabili lymphæ Anglicæ nova est hypothesis; neque enim mihi etiam in eorum descriptionibus causæ videtur esse satis, cur duo elementa, undique sibi similia, & nullo alio discrimine separata distinguerem, præter facilitatem paulo majorem ad coagulationem, quam serum ab igne patitur, & cujus coagulabilis indolis limites putredinis initia, & calor externus, & cibi ratio, & millæ aliæ causæ mutant. Ceterum in his elementis multa non dubie parum plena, multa hiulca: incerta tamen, & de quibus justis dubiis sit locus, non puto superesse, agnitus si videretur.

Analyses sanguinis nimis fere fusas deprecor: laborem exhauseram ponendorum calculorum, ut pondera elementorum sanguinis ad drachmas librasque reducerem; eum forte laborem neque totum in nova editione desiderari mihi non utile visum est, neque in aliquod compendium reduci posse speravi. Minus etiam ceterum hæc mihi placent, quod nihil sit mei, nunquam enim ea mea fuit felicitas, ut inter tot alterna vitæ officia in chemicis laboribus proficerem.

*Berna*, d. III. Jul. cIdcccLXXVII.

## LIBER QUINTUS.

## SANGUIS.

## SECT. I.

## AD SANGUINIS HISTORIAM IN UNIVERSUM CONSIDERATI.

- P** Ag. 1. l. 18. aut *lege* tunc.  
 p. 2. l. 19. *post* adeo *adde* universi corporis  
 p. 3. l. 16. *post* maximam *adde* vim  
 p. 4. l. 12. *post* evasit *adde* Hæmorrhagia 20 & ultra librarum, cum placenta supra os uteri adnata secessisset, HENKEL l\*).  
 ibid. l. 15. *post* nares *adde* & quadraginta intra quatrimum SARTORIUS p\*)  
 ibid. l. 18. *adde* Intra quatrimum Jesuita 40 libras amisit q\*).  
 p. 5. l. 9. *post* passa est *adde* Libræ 412 sanguinis intra annum amissæ, teste Ill. TISSOT u\*).  
 p. 6. l. 24. *adde* In diuturnis morbis sanguinis penus sæpe ita exhausta, ut pene nullus supersit p\*). GUILIELMI III cadaver totum exsangue fuit p\*\*).  
 p. 9. l. 13. *adde* Calidiorum nuper DAVID fecit o\*\*). Magis animalisatum D. WILSON o\*\*\*), cum sanguis arteriosus minus de animali natura haberet.  
 ibid. l. 18. *post* auctor est *adde* hinc citius cogi, firmitusque dare coagulum.  
 p. 10. l. 6. *dele* & rubicundiorum & *adde* veræ x\*) lymphæ coagulabilis & colore differre Cl. BUTT x\*\*). Frigidiorum esse STEPHENSON x\*\*\*) x\*\*\*\*).

l\*) HENKEL *neue Sammlung*.p\*) *Admirand. Hæmorrhag.*q\*) *Journal des Savans*. 1663. T. XI.u\*) *Opusc. var.* p. 299.pag. 6. not. l) *adde* In leone marino BYRON *voy.* p. 296.p\*) *Journ. de médec.* 1770. Janvier. In vivo vix duas uncias fuisse HEUERMANN *Untersuch.* p. 362. SCHELHAMMER *de pulsu* p. 67. Incidisse se corpora, quibus non supra duas sanguinis uncias superfuerint J. de GORTER *perspir. insensib.* p. 385.p\*\*) *Bibl. anat.* Tom. II. p. 394. ex RONGEATI testimonio.o\*\*) *de respir.* - o\*\*\*) *Antumn. disordres*, p. 44.pag. 10. not. x) *dele* Nunc demum invenio -- P. II. p. 813.x\*) in textu *bere* reperimus, & ejus loco *veræ* legendum esse putamus. *Not. edit. auct. huj.*x\*\*) *Spontan. sangu. separ.* p. 26. 46. 47.x\*\*\*) *Ess. of a Societ. at Edimburgh*, II. p. 813.

x\*\*\*\*) Intellectu profecto difficile non est, hunc locum typographi potissimum incuria admodum corruptum redditum esse, eumque proinde medela quadam egere. Equidem hæc



pag. 10. l. ult. *lege* in altera

p. 12. l. 4. *adde* Nobiscum Cl. SPALANZANUS, qui pariter, ut ego, plurimum laborem in contemplando per vitreas lentes sanguine posuit.

ibid. l. 21. *lege* uti 169. ad 132.

p. 13. l. 3. *adde* De carotidis sanguine dicemus g\*). Negat de eo ipso sanguine ALBINUS g\*\*).

ibid. l. 5. *post* repugnat *adde* Nuper Ill. SPIELMANNUS sanguinem venæ cavæ cum sanguine venæ portarum comparavit. In venæ portarum sanguine debilis liquoris, paulum alcalini, partes 13 fuerunt, 16 alcalini, 6 fortiter urinosi & saturate alcalini; olei pars  $\frac{1}{28}$ , salis volatilis  $\frac{1}{27}$ , qui demum cum tartari sale tritus urinosum odorem spargebat; carbonis denique partes  $\frac{22}{33}$ , in eo ferrum & sal lixiviosus.

Contra in sanguine venæ cavæ liquoris alcalini partes erant  $\frac{36}{49}$ , paulo plures omnibus computatis, quam in sanguine venæ portarum, olei empyreumatici  $\frac{1}{47}$ , sive pene  $\frac{1}{36}$ , duplo adeo plus; salis contra volatilis minima portio, non supra  $\frac{1}{455}$ , quam putes compensari per uberiorem spiritum alcalinum; carbonis tantum  $\frac{7}{8}$ , & dimidio minus. In eo perinde ferrum & sal lixiviosus fuit.

Quærit vir Cl. an adeo plus sit salis, plus etiam acoris, in sanguine venæ portarum, minus olei: de eo negat, ut potius plus habeat olei.

ibid. l. 6. *post* peculiari *adde* sanguinis in portarum vena

ibid. l. 11. *post* superante *adde* De Europæo homine, alboque liquor: nam æthiopibus ab HELMONTIO h\*) nigricans tribuitur. Nuper annotatum est, æthiopis sanguinem emissum primum fuscum fuisse cum admistis exiguis particulis nigris, deinde floridum; & in centro placentæ nigrum, in ambitu fuscum. Non ergo niger est, nisi ob crassitiem laminæ sanguineæ h\*\*).

In diversis animalibus aliquam in colore sanguinis diversitatem esse non repugnat, ut vitæ genus aliud fuerit, & victus; non quod ipse testem me dare queam, nam & in frigidis animalibus rubrum sanguinem & concrescibilem vidi, ut in rana, inque bufone, & in calidis, & in pullo incubato. Legi tamen in piscibus, anguillarum ad modum teretibus, sanguinem in corde ni-

ipsi ratione succurrendum putaverim, ut, quæ ad MICHELOTTUM spectant, ita legantur, prout in veteri editione prostant; quæ vero in nova editione Auctor addidit, ea huc videntur redire, ut & coagulabilis lymphæ copia, & colore arteriosum sanguinem a venoso differre BUTTHI sententia fuerit, frigidiorum autem eum STEPHENSON existimaverit. Not. edit. huj. auct.

g\*) L. X. g\*\*) Nat. hom. p. 117.

h\*) Schol. pass. decept. MECKEL mém. de l'acad. de Berlin 1757.

h\*\*) ROUME de St. LAURENT ap. ROZIER 1775.

- grum esse & coactum, in cartilagineis rubrum & splendentem *b\*\*\*)*; equo sæpe piceum & nigrum de vena incisa manare *b\*\*\*\*)*; & in universum utique in majoribus quadrupedibus viscidior est & densior, ut in equo vidi. In cane mihi magis glutinosus, & ad coëundum pronior visus est, in ovibus potissimum junioribus fluidior. Globulorum etiam magnitudo dicitur differre, quod discrimen in tabula HEWSONUS ex variis animalibus expressit.
- pag. 13. l. 17. *post* denique *adde* primis vitæ horis
- ibid. l. 18. *post* pellucet *adde* Immature fetui humano pro sanguine flavum humorem in aorta vidit Ill. vir C. J. RÜTTNER.
- ibid. l. antepen. *post* languent *adde* Non ignoro hæc nuper infirmari, aque viris, quos magni facio. Verum ea certe scribo, quæ vidi. In minimis ramulis figuræ venosæ, tertio die, sanguinis purpura læta est in magnis truncis; idem die secundo rubiginosus fuit, ut appareat, hunc rubiginosum colorem non esse a pellucente flavedine vitelli; ea enim multo magis minorum vasorum ruborem a paucis globulis natum obruisset, quam majorum. Nobiscum Cl. WOLF.
- p. 14. l. 3. *post* flavent *adde* Sola ex aëris insigni mutatione Europæi in fervidis Americæ insulis continuo flavescunt, & a multa venæsectione pallor diu sæpe ipsis adhæret, aque febribus intermittentibus.
- ibid. l. 4. *post* rubore *adde* per cæruleum & viridem colorem
- ibid. l. 7. *adde* Non ignoro Cl. virum, & quem plurimi facio, SPALANZANUM *u\*)* flavum colorem globulorum sanguineorum non admisisse, & flavedinem a me visam luci refractæ tribuisse, qua ego usus sum. Verum lentis vitreæ usus in colore certe mutando nihil potuit. Nam in robusto animali solitarii globuli, unica serie mesenterii vasa percurrentes, ruberrimi mihi visi sunt, aut certe albi fulgidi cum læto rubore, nunquam flavi; languidi contra animalis glomerati globuli constanter flavi apparuerunt, cum eadem luce uterentur.
- p. 15. l. 4. *adde* quæ interim, uti legi, ita refero. Nam Cl. HUNTERUS chylum avium & piscium pellucidum facit, crocodilo excepto, cui albus fit.
- ibid. l. 11. *post* fuit *adde* Lacteus albus humor de venâ eductus CABALLI *o)*).
- ibid. l. 14. *adde* & a lacte retento *r\*)*).

*b\*\*\*)* VICO d'AZYR. *Mem. pres.* VII. p. 239.

*b\*\*\*\*)* *Naturforsch. Gesellsch.* p. 192.

*u\*)* *Fenomeni della circolazione.*

*o)* *Phanom. med.* p. 64.

*r\*)* *Journal de médec.* 1770. supplém. n. 4. Si enim id lac per urinam & per diarrhoeam depositum fuit, utique in sanguinem redierat

pag. 15. not. *u)* l. 4. *adde* BARTHOLIN, p. 192. 193.



pag. 16. l. 1. *post* negent *adde* & ad serum quoddam referant. Quod ego vidi, id evidentissime chylus erat, ut etiam ex ductu thoracico in venam subclaviam infundi viderim;

ibid. l. 2. *post* elabatur *adde* In Suecia equidem  $x^*)$  experimenta feri chylosi aliquam feri a lacte diversitatem demonstrant, a sero nempe lac verum exigua differre copia olei & solidarum partium, quibus in magna ratione superetur ut 1 ad 6. Constare aqua, gelatina & corpore gelatinoso muscoso, quarum illa =  $\frac{2}{240}$  hoc sit =  $\frac{18}{240}$ . Hæc videntur omnia de chylo vera esse posse cum lymphâ animali conjuncto, quæ in lacte decedit. Sed etiam Cl. HEWSON  $x^{**})$  album illud, quod sanguini innatat, serum esse, globulos habere flavos  $x^{***})$ , neque aut chylum  $x^{\dagger})$  esse, aut unice a pastu reperiri  $x^{\dagger\dagger})$ , cum sero vero candorem ab adipe  $x^{\dagger\dagger\dagger})$  communicari. Album etiam liquorem hydropicum J. L. TARGIONUS vidit, cui nulli essent globuli  $x^{\dagger\dagger\dagger\dagger})$ .

ibid. l. 4. *adde* Tempus ergo aliquod est, in quo chylus conspicuus cum sanguine circumvivit. Humorem autem alium mucosum nonnunquam in sanguine contineri non repugno. Chylum esse nobiscum Cl. BRAMBILLA  $x^{\dagger\dagger\dagger\dagger})$

ibid. l. 7. *post* loco *adde* Niger & foetidus atque serofus de naribus puellæ decennis manabat  $x^*)$ .

ibid. l. 12. *post* tingat *adde* tum in polypo, qui pulicem aquaticum devoravit.

ibid. l. 14. *post* exhaustur *adde* qui carnes tingebat.

ibid. l. 16. *post* commune est *adde*, & ni fallor in omnibus animalium classibus constanter accidit, ut vitalis humor spissescat, & sanguis in sano homine continuo &c.

ibid. l. penult. *post* delet *adde* A minutis septem ad 11 cl. viri numerarunt, quibus sanguis egeat, ut in placentam consistat.

pag.

pag. 16. not.  $x^*)$  spectat ad verbum elabatur in textu lin. 2.

$x^*)$  Sw. Wetensk. acad. Handl. 1770. n. 3.

$x^{**})$  Inquiries p. 115.

$x^{***})$  p. 116.

$x^{\dagger})$  p. 118.

$x^{\dagger\dagger})$  p. 122. etiam diu a cibo.

$x^{\dagger\dagger\dagger})$  p. 127.

$x^{\dagger\dagger\dagger\dagger})$  Raccolta T. I.

$x^{\dagger\dagger\dagger\dagger})$  De inflamm. p. 43.

$2^*)$  WERLHOF variol. morbill. p. 540. edit. quam Ill. WICHMANNUS curavit.

pag. 16. not. h) *adde* Contra sanguis in gradu 125 coactus fuit in vena ligata canis, HEWSON phil. Transf. Vol. LX.

ibid. *ad* verbum toti in textu lin. 16. *adde* not.  $f^*)$ . Diversa est descriptio a phaenomenis grumi sanguinis.

pag. 17. l. 1. *post* magis adde tum in calore, qui 90 gradus superat, ad 108 gr. usque.

ibid. l. 7. *post* turgerent adde Non repugno frigesfactum solidius coire, calentem tenerius *n*<sup>\*)</sup>); tamen non eo processurus, ut calori amisso coagulationem tribuam *n*<sup>\*\*)</sup>), cum frigidorum animalium sanguis cogatur, de quo nullus calor decedit. Possis negare, a sola quiete in coagulum abire *n*<sup>\*\*\*)</sup>), cum concussus coëat, suilli exemplo, & in vivo homine coivisse visus sit. Plurimum tamen quies ad coagulationem confert, siquidem sanissimi hominis sanguis, qui rapide per venas circumibat, & idem per aërem fluidus saliebat, continuo cogitur, quamprimum in patinam receptus quiescit.

p. 18. l. 2. *post* subest adde Demum in febribus malignis sub initia mali sæpius fere cogitur, etsi in posterioribus mali stadiis idem resolvitur; quam quidem legem plurimorum & peritissimorum medicorum consensu confirmari video, & ab ipso etiã potissimum HUNTERO.

ibid. l. 8. *post* coactum vidi adde Vasa sanguinea coacto crüore plena in febre maligna fuerunt, quam ROEDERERUS morbum mucosum vocabat *e*<sup>\*)</sup>).

ibid. l. ead. Sed etiã in variolis ---- quod alias fusius repetemus *lege* Nempe in univèrsum magis magisque nunc confirmamur, febres acutas fere cum crasso sanguine incipere, ipsas etiã variolas *f*) & Siamensem febrem flavam *g*), aliasque maligniores febres *h*), ut sanguis in peste *i*) præ tenacitate venæ inhæreat, & vix possit educi, tum in contagiosa lue armentorum *k*). Cum ipso vero morbi progressu, ut putredo in humoribus invalescit, ita sanguis dissolvitur, ut demum mihi ipsi in febre tertiana pulli sanguine vix crassior de vena secta fluxerit, & in febribus malignis totus dissolutus per omnes corporis poros exsudet *k*<sup>\*)</sup>). Quare ipsa in curatione ad hanc theoriam acida sub initia damus, & cremorem tartari, aliaque tum putredini, tum spissitudini sanguinis contraria: in progressu fere cardiaca, cum sanguinem dissolutum debilitas perpetua sequatur. Neque enim de dissoluto sanguine desperari debet, quem certum sit, cum vita superstitè nativam densitatem recuperare. Et meo sanguini, cum aquosus & pallidus fluxisset, solita densitas rediit; & olim annotavit *Fac. ANGELINUS l*<sup>\*)</sup>).

*u*<sup>\*)</sup>) BUTT *separ. sangu. spont.* p. 10. 11.

*n*<sup>\*\*)</sup>) p. 12.

*n*<sup>\*\*\*)</sup>) HEWSON *Philosophical Transactions*, vol. LX.

*e*<sup>\*)</sup>) *Morb. mucos.* p. 162.

Notæ *f*) *i*) & *k*) p. 18. mutandæ non sunt, notæ *g*) autem litt. *h*) & huic litt. *g*) præfigenda est.

*k*<sup>\*)</sup>) Lib. I.

*l*<sup>\*)</sup>) *Elef. ven.* p. 28.

*Fascic. II.*



pag. 19. l. 16. *post* concretus erat *adde* Olim POSTELLUS in peripneumonia gluten medullæ simile extraxit, quod ad corallii modum consistentem arbusculam imitaretur *z*<sup>\*)</sup>). In magnis arteriis a frigore sanguinem coagulari SPRIGELIUS *z*<sup>\*\*)</sup>).

ibid. l. antepenult. *post* esset *adde* III. HAENIUS universas arterias, venasque chorda polyposa fartas vidit, & olim BECKERUS *a*<sup>\*)</sup>), & MORGAGNUS, & WALTHERUS *a*<sup>\*\*)</sup>).

p. 20 l. 1. *lege* Sed etiam in anevrysmatibus sanguis in grumos coactus reperitur, inque carnis speciem *b*<sup>\*)</sup>) inter duo vincula immotus coit *c*), &c.

ibid. l. 17. *post* superesset *adde* Et in alio exemplo, cum abscessus cor pene totum exedisset, polypus ea ipsa sede annatus foramen obturavit, vitamque ægri produxit.

p. 21. l. 9. *post* reperio *adde* Hæc est glandulosa in corde caro VESALIO dicta.

p. 33. l. 1. *post* relegatos *adde* etsi raro appareant.

p. 25. l. 7. *post* sollicitare *adde* Cordis etiam extensa est amplitudo.

## S E C T I O II.

### ELEMENTA SANGUINIS.

**P**ag. 29. l. 16. *adde* Sanguinem ex vena secta de vivo homine emissum frigidum fuisse, insignes testes adsunt, & ipse MORGAGNUS. Eum sanguinem credas alicubi quievissse, ut nonnunquam in gravibus deliquis quiescit, & cum motu calorem amittit. Sed totum hominem dysenteria periturum friguissse vidi. In mura tamen citello, hyeme effosso, sanguis insigniter caluit.

ibid. l. 20. *post* testudinis *adde* caluit.

ibid. l. ead. Sed etiam vipera--- dum vixit frigebat *lege* Aliquando majorem calorem I. HUNTER in rana generari testis est, ut hydrargyrus tubi in os animalis dati per quatuor gradus ascendat, in ventricum detrusi etiam vigenis *s*).

*z*<sup>\*)</sup>) In *descr. peripneumoniae*.

*z*<sup>\*\*)</sup>) p. 174.

*a*<sup>\*)</sup>) De morte submersorum sine pota aqua.

*a*<sup>\*\*)</sup>) De atrabile.

*b*<sup>\*)</sup>) BOERHAAVE *præ. med.* I. p. 394.

p. 28. not. *c*) *adde* Nullus calor piscium & ranarum BRAUN *Comm. nov. Petropol.* XIII.

*s*) *lege* *Philos. Transact.* T. LXV. p. 2.

pag. 30. l. 1. *post* toleretur adde Numero apum tribuas, quod calorem generent, quem neque vespæ generant, neque crabrones.

ibid. l. 3. *adde* An vero calor ab animalibus generatus fecerit, ut eorum aliqua, quibus sanguis sponte frigere videtur, a frigore non occidantur? Vidit idem J. HUNTER cyprinos caloris tantum generasse, ut non possent rigescere, & tum demum murem occisum, cum, humectatis pilis, calor ab eo generatus diminutus esset x\*).

§. II. *An constanter major atmosphæa calore* \*).

Quando de calore agitur regionis, non attinet eum narrare, qui perpetuus sit, idemque mediocris, & qui passim in calidis regionibus non maximus est, neque ad 86 gr. ascendit, ut Jamaicæ, Curassaviæ, Cuduluri, in Antillis insulis, Bataviæ novæ, in Capite Bonæ Spei, in ipsa æstuosa Arabia, in qua æstus per æstatem 85 & 90, & paucis locis 95 graduum Fahr. fuit. Eæ regiones nobis fervidæ videntur, non quod adeo enormes earum ardores sint, sed quod ii toto anno parum diminuantur, & noctu etiam parum decrescant, uti Cuduluri totum discrimen fere a 74 ad 77 gr. fuit. In tropica regione Berbice calor non infra 70 descendit, neque ultra 96 ascendit.

Qui vulgo recensetur calor, is in umbra mensuratur, & multo, quam ad solem, minor est. Hæc diversitas insignis est momenti; nam in umbra 75 gradus, in sole 101 fuerunt, & ego Rupe, cum in umbra calor infra 100 esset, alias 117, alias 140 gradibus hydrargyrum secundum album murum solem reflectentem ascendisse. Majorem etiam vidit Ill. du HAMEL, ut in sole ad murum fuerit 167 graduum. Monspeli, cum in umbra esset gr. 30, in sole fuit 60 gr. Reaumur. omnino ut in priori annotatione 9. In cubiculo 80  $\frac{5}{8}$ , in sole 106 gr. fuit apud GIRARDI h). Conduluri constanter per 15 dies gr. fuit 97. 98. & in sole 109 i). Sed etiam Monspeli, si fidum est experimentum Cl. le BON k), cum in umbra calor esset graduum 31 Reaum. in sole fuit 80. In insulis Antillis in umbra ad 94, in sole ad 112 m). Sed etiam in Carolina calor solis fuit 120 n),

x\*) *Philos. Transact.* T. LXV. p. 2.

\*) Cum secunda & tertia paragraphus, notæque ad eas spectantes in nova editione admodum mutatae sint, ita, ut vix ulla periodus alicui veteris editionis periodo exacte respondeat, utramque paragraphum simul cum notis verbotenus, ut vocant, describendam censui; veritus, ne, si fecus facerem, eademque, qua in aliis paragraphis usus sum, ratione & hic vellem uti, tædiosissimum Lectoribus imponerem laborem. *Not. edit. huj. auctar.*

h) *Vua Vrsi* p. 41.

i) FREYLINGSHAUSEN in *Missionsberichten.*

k) *Mem. de l'Acad. de Montpellier. Mem. de l'Acad. des sciences* 1706.

m) MOULTRIE Febr. *flav.* In Martinique 100 ad 14. THIBAUT.

n) *Philos. Transf.* n. 487. 496.



& 126 o) gr. calculisque recte positis 140. Ad fluvium Senega calor ad 152, & in fabulo ad 191 ascendit.

De eo nunc ergo calore quæritur, qui sit summus, quem homo tolerare possit. Eum utique non oportet in Septentrione quærere, ubi non solum breviori tempore aër calet, sed etiam minori gradu, ut omnino non intelligam, quomodo sint, qui scripserint, calorem in universo terrarum orbe, omnibus computatis, summa totius anni inita, fere eundem esse. Et si enim nonnunquam æstivi calores in borealibus ad solem 100, & paulo ultra, graduum fuerunt, in Islandia, Petropoli, in sinu Hudsoni: in tabulis tamen nuperorum itinerum marinorum p\*) sub gradu 69 calor summus fuit 72 gr. Fahr. Borgefundi in Norvegia non superavit 70 gr. q\*). Et qui balænas in summo Septentrione persecuti sunt, media æstate gr. fere 32 Fahr. repererunt.

Mosambicensem aut aut Suaquensem calorem nimium credas, in quo sigilla liquecant r\*), plumbeæque glandes & calcei torreantur, & cutis decedat s). Neque tamen penitus fabulosas vel istas historias dixerim, quoties eas cum venti Samiel, aut Harmattan violentia comparavero, qui in desertis circa Euphratem fluvium, Jamaica & alibi, subito mortales occidit t), etiam una die ad 4000, & pecora, quæ deprehendit, necat, faciemque amburit u), ut rubra tumeat, quasi ab ebulliente aqua percussa, & aquæ calorem eundem imprimat, qui sanguinis est x). Ipse jam sirocco ventus Italis molestus a 72 gr. thermometer coëgit ad 112 ascendere, & denique languorem facit, ægre tolerabilem futurum, si diuturnus esset y). In Carolina calor 88 gr. somnum aufert & gradu jam 97 vel 98 ægre fertur.

Deinde in ipsa mea patria non rarum est, ictus solis subito aut graves capitis morbos facere, aut ipsam mortem. Pekingi intra unicum diem, cum calore tantum 103 graduum, plurimos mortales interiisse lego.

o) CHALMERS *diseases of South Carolina* p. 19. 22. 81. 26. 27. 130. 131. 133.

p\*) *K. Svenska Vet. Handl.* 1759.

q\*) *Act. Societ. Drontheim.*

r\*) BOYLE *nat. hist. of the air* p. 165. KAEMPFER p. 322.

s) LUDOLPH *hist. Acad.* l. c.

t) Quatuor millia hominum occidit THEVENOT T. II. L. 2. c. 10. 16. vide KAEMPFER p. 671. BALBY *itin.* p. 33. Est Alseman AVICENNÆ L. I. D. II. doct. 2. c. 8.

u) CHARDIN T. IX. p. 223. 224. 225. qui in Caramania ipse expertus est, & T. IV. p. 22. THEVENOT *voyag.* T. III. L. I. c. 10. 11. 12. DAMBIER *of winds* p. 50. In arenosis Barbariæ BOYLE *histor. of the air* p. 150. in Agypto MALLETT T. II. p. 366. ed. belg. Habet etiam PERRY p. 256. & KAEMPFER.

x) THEVENOTUS, nisi fallor, T. II. c. 34. 80. nec enim nunc ad manus est.

y) BRYDONE Aponenses calent 52  $\frac{1}{2}$  gradu: si Reaumuriani sunt, erunt gradus Fahr. 134. VANDELLI *differt.* p. 7.

Demum peculiaris ille calor, quem in balneis experimur, plerosque in orbe terrarum liberi aëris æstus aut æquat, aut superat. Aquæ equidem minerales ad 114. 116, demum ad 150 ad 187 Fahr. ut in *acqua di S. Angelo & delle Colate* z); ad 189½ gr. Pisciatellæ; ad 190, ut in Philippinis insulis; ad 190, ut in thermis *Aix en Foix*; ad 192, ut Cascianenses thermæ. Non tamen ideo eo gradu summum calorem continuerim, quem homo tolerat. Fert enim certa per exempla dudum nota 97. 98. 99. a), 100 b), 100 c), & 116 gradus d), licet le MONNIER calorem 40 graduum Reaumurianorum, sive 120 fere gr. Fahr. tolerare non potuerit e). Sunt porro ægri, qui etiam 42½ & demum 47 gradum Reaum. per 7 vel 8 minuta in thermis ferant f), qui est 138. gr. Fahr. diutius toleraturi, si consuetudo g) accefferit, multum enim ea potest. CELSIUS in hypocaustis Finnicis toleravit gr. 50 suos, inde didicit 60 ferre, & sunt, qui ferant 75, qui æquales sunt gradibus Fahrenh. 167. Facilius vero tolerari siccum calorem, quam humidum, ibidem lego h). Quare etiam puella illa du HAMELIO dicta calorem fornacis per 15 minuta ferre potuit, qui erat 135 gr. Reaumur. & æquabat gradus caloris Fahrenh. 336, calorem ideo multo majorem eo calore, quo aqua ebullit. Demum in illo æstu Caroliniano, ut aliqui mortales perierunt i), ita alii & plerique vitales edurarunt k); calor vero Senegallensis & Caroliniensis etiam a laborantibus in sole æthiopibus toleratur, & calorem 115 graduum iidem æthiopes l) amant. Ita canes in vaporariis inclusi, gradu demum 113 m), 115 n), 122 o) & 146 p) perierunt, & tolera-

z) Nic. ANDRIA.

a) Libere in eo calore respiratur, SENAC in HEISTER T. III. p. 250.

b) MARTINE *anim. simil.* p. 144.

c) In aquis Bathonianis per horas tolerari GLASS *of Bath*, p. 27. Gradum 39. Reaum. plerisque convenire, *Mém. de l'Acad.* 1752. p. 637. sed is est Fahr. 113.

d) In Rufforum vaporariis 108 & 116 gradu calentibus per integram horam durant GME-LIN *Flor Sibiric.* præfat. p. LXXXI. Pene ardentem calorem ferre WEBER *verändert. Ruffland*, T. I. p. 22.

e) *Mém. de l'Acad.* 1747. Multos non ultra gradus 36 ferre. *Mémoire*, 1752. p. 637. aut 113 grad. Fahr. PLANCUS *aqu. Pisan.*

f) *Mém. de l'Acad.* 1757. p. 636.

g) In balneo vaporis prima die vix 6 minutis durant & pene diffuunt, inde ad 15 minuta edurant SPRINGSFELD *it. Carlsbad.* p. 262.

h) K. Swens. *Wet. Handl.* 1765.

i) Etiam in Europæ æstibus nonnunquam homines & animalia subito perierunt MASSA *de febr. pestilent.* p. 146. DERHAM *phys. theol.* p. 17. die 8 Jul. 1707. Gamroni & homines pereunt, & canes KEMPFER, p. 721.

k) *Phil. Transf.* n. 478.

l) CHALMERS l. c. p. 18.

m) DUNZE *exp. I.*

n) *Exp.* 2. 5. & 119 gradus.

o) *Exp.* 3. p) *Exp.* 4.



runt gradus 106 q), 109 r), 120 s), 126 t) & demum 146 u) in nostri DUNZII experimentis. Sed etiam in du HAMELII & TILLETII experimentis, cuculculos in calore 77 ad 59 Reaum. s. gradu 158 & 161. Fahr. vixisse videas. Idem III. Collega nuda animalia citius perire annotavit, quam operta vestibus, ut calor cutem penetrare, febremque excitare minus posset. Porro RICHMANNUM calorem 125 graduum tulisse testis est J. A. BRAUN.

Demum etiam hunc æstum nupera experimenta superare posse evicerunt. Canis x) quem 146 gradus dicebantur occidisse, sanus toleravit 220 gr. Deinde academici Angli gradus 198. 202. 210. 224 tolerarunt y), majores, quam est æstus ebullientis aquæ. Verum etiam istos æstus superavit ille, de quo Caroli BLAGDEN testimonium extat, calor nempe 244 & 260 graduum, ut anxietas post octo minuta accederet z).

Majorem ardoris excessum animalia frigida ferunt, si cum innato calore sui sanguinis comparaveris, & constantem atmosphærici caloris tolerantiam. Primum in aquis calorem humani sanguinis æquantibus cyprini perpetim vivunt a); qui tamen calor totis, ad minimum, 92 gradibus b) calorem, sanguini eorum piscium familiarem, superat, ut excessus inde idem sit, qui foret, si homo in calore fere 200 graduum viveret. Hæc vero omnino multo majora sunt, postquam nuper didicimus, in Philippinis insulis aquas esse 189 c) Fahr. calentes, in quibus pisces vivant. Hæc animalia cum ipsa ponas gradu 54 Fahrenheit. calere, nunc elemento 189 gr. calente vivunt, quod totis 120 gr. eorum nativum calorem superet, ejusque plus sit, quam triplum, fere gr. 288. Ranas in Budensi bulliente aqua supervivere olim BUSBEQUIUS. Arbores calorem ferunt 69 gr. Reaumur. & buccinum III. STRANGE teste vivit in thermis 88 graduum, cui calor nativus sit paucissimorum graduum supra 20.

q) *Exp. 6.* per quatuor horas cum dimidia.

r) *Exp. 6.* Venæsectione revocatus est, qui eum calorem toleraverat, p. 21.

s) *Exp. 3.*

t) Post sesquihoram demum in eo ardore periit canis *Experimenti 5.*

u) Demum post 57 min. periit canis *experimenti 4.* in calore 146 gr.

x) *Phil. Transf. T. LXV. p. 1.* cum ad 110 gr. animalis calor descenderet.

y) *Matth. DOBSON Phil. Tr. LXV. p. 2.*

z) *Ibid.*

a) LUCAS l. c. p. 205. 206. In calore gr. 72. vivunt MUSSCHENBROECK *instit. physic. p. 122.* inque tepidis oris thermarum ebullientium VALISNERI *oper. T. III. p. 471. 472. T. V. p. 112.* Ad gr. R. 27. 29. 38. vivunt cantharides & buccina VANDELLI p. 52. tepet autem aqua 27mo. In thermis pisces & ranæ vivunt CONRING *calid. innat. p. 42. 43.* inque thermis Islandiæ calentibus ANDERSON p. 17.

b) PLANCUS *in therm. Pisan. descr. p. 40.*

c) *Philos. Transf. p. 1.*

In summo vero æstu calor corporis humani non sequitur calorem aëris. Dudum *Benj. FRANKLIN d)* annotavit, se in aëre 100 gradu calente omnibus ambientibus corporibus frigidiorē fuisse, & hydrargyrum ex aëre exemptum sub alis descendere vidit L. CHALMERS: deinde in calidis thermis 124 gradus humanus calor non superavit 112 *e)*. In experimentis Cl. BANKS & sociorum calor humanus neque supra 108 ascendit, neque aëris calorem sivit in eo summo gradu aquæ ferventis persistere, sed a 211 gradu depreffit usque ad 198 *f)*. In calore aëris 120 & 130 gr. calor hominis sub lingua est 108 gr. *g)*. Aër 220 gr. calet, canis non supra 110 *h)*.

Non ideo nimii caloris in aëre ambiente nulli sunt effectus. Pulsuum numerum vehementer crescere diximus: spiritus etiam læditur & anxietas supervenit, & intolerabilis demum sensus est æstus, neque absque periculo experimentum foret, nisi homo fuga se letho eriperet. Quare neque mirum est, denique in majori caloris gradu animal perire. Avicula in calore 65 gr. Reaumur. s. 178 Fahr. periisse dicitur, ex febre, ut credit Cl. TILLET, putrida *i)*, neque tamen etiam post eam sanguinis violentiam putredo apparebat. Ex calore cubiculi lipothymia & pene suffocatio HAGEDORN. Sed etiam in aquis hoc ipso gradu calidioribus, quarum æstus ad gradus Fahr. fere 113 ascendit, etsi pisces pereunt *k)*, ranæ tamen vivunt *l)*, quarum sanguis 40 gradibus minus calet: quæ iterum memorabilis est caloris tolerantia.

### §. III. Calor Humanus varius.

In thermometro sub alas hominis dato argentum vivum ad 32 Reaumurii *m)* 94 *n)*, 95, 96 *o)*, 98 *p)*, 99 *q)* Fahr. gradus in temperato aëre ascen-

*d)* Ap. BROWN de viribus atmosphæra, Edimburg 1770. & FRANKLIN letters on different subjects p. 101.

*e)* HAYGARTH ap. FALCONNER II. p. 182.

*f)* LUCAS ibid de aquis etiam Porcetanis.

*g)* Phil. Transf. T. LXVI. *h)* Phil. Transf. T. LXV. p. 2.

*i)* Mém. de l'Acad. 1769.

*k)* Pereunt in gradu 96 MUSSCHENBROEK. In calidissimis aquis ranæ pereunt TARGIONI viaggi T. II. p. 419. De Porcetanis LUCAS of waters T. III.

*l)* COCCHI delle bagne di Pisa p. 59.

*m)* In thermis Aponensibus plantæ vivunt MAPPUS de potu calido, p. 27. Mém. de l'Acad. 1734. p. 562. 563. 1738. p. 492.

*n)* BOERHAAVE Elem. Chem. T. I. 415.

*o)* SCHWENKE p. 44. 46. RUTTY synopsis of miner. waters p. 594. FAHRENHEIT apud MARTINE, A. de HAEN l. c. p. 153.

*p)* MARTINE anim. simil. p. 142 de suo calore Essays p. 335. In Minorca inf. 98, & semel 100 RUTTY l. c.

*q)* MATTY Journ. Bibl. 1750. p. 447. Nimis frigidum sanguinem fecerat BOERHAAVIUS qui calorem humanum ad 92. gr. Fahr. calculis positus putat. Veget. stat. c. 1. p. 59. &



dit, ut alius homo alio fervidiorem temperiem nactus est, & diutius mensura adhibetur r). Sanguinis ipsius, aut viscerum abdominis vivi animalis aliquanto major s) calor est, ut uno, duobusve gradibus Fahr. superet. Accuratus Cl. *Ant. Martin* ROLANDI fil. reperit calorem humanum esse fere 36, 37 gradus Celsii, qui fere essent 96 gr. Fahr. Urinæ & lactis fere 93½ calorem æstivo æquales & paulo majorem; calorem in ala & inguine fere 93½, in pectore 90 t).

Calorem hunc paulo majorem facit Cl. HOME, ut in infante nuper nato sit a 94 ad 100, anno 4½ a 94 ad 99, ætate media a 95 ad 98, in senibus a 98 ad 100.

Iterum calor uno, alterove gradu vesperi, quam matutinis horis, major est, & per noctem decrescit. Nuper Cl. BRAUN u) reperit calorem in ore hominis esse 97½ gr. calorem urinæ uno gradu, vel 1½ majorem. In febre hominem caluisse ad usque 108 gr.

Inde Cl. *Antonius Martin* ROLANDI fil. variis experimentis reperit, in variolis calorem pectoris fuisse 37. gr. Celsii; eundem calorem in manibus 36, pedum 34. Deinde tertio die calorem in pectore & in manu 38. Iterum alarum calorem 35, pectoris 34, manus 36, pedum 31.

Inter animalia multa sunt, quæ aliquanto magis calent, ut ex quadrupedibus carnivoris canes x), felesque y) & cuniculi, quorum calor est fere 103 z) graduum, tum porci, phocæ, sanguinei animalis, quibus 102 in cute, & 103 graduum in abdomine calor est a). Deinde aves etiam istas bestias superant. Inter femora enim gallinarum, & columbarum, & monedularum liquor thermometri ad 103, 104, 106, 107, 107½ & 108 gr. ascendit b); in anserem ad 107½, in rubicilla ad 111½ c). In corde monedulæ d) 109 gradus WHYT-TIUS reperit, in recto intestino 107¹.

Sed

Cl. SAUVAGES, qui 30 Reaumurianos gr. admittit *effets de l'air* & magis adhuc FITCARNIUS apud MARTINE, qui 90 Fahr. Nimis calidus potius sit, si dimidium calorem aquæ ebullientis ipsi tribueris, *Ph. Tr.* n. 27.

r) HAEN l. c. p. 157. ad sex dentum gradus liquor per moram ascendit.

s) MARTINE *anim. simil.* p. 178. *Essays* p. 336. 337. 338. WHYT-T *Physiol. essays* p. 16. non adeo 12 gradibus, ut *Theophilus LOBB de febr.* n. 259. Urinam quatuor gradibus calidiorem facit HALES l. c.

t) In *K. Svenska Acad. Vet. Handl.* 1764. 4. 1768. trimestr. 2. 1773. trim. 3.

u) *N. Comm. Acad. Petrop.* XIII.

x) MARTINE *anim. simil.* l. c. *essays* p. 336.

y) Sanguinis calor duobus gradibus major est.

z) BRAUN.

a) MARTINE *ibid.* p. 337.

b) MARTINE *anim. simil.* p. 142. *essays* l. c. WHYT-T l. c.

c) BRAUN, d) WHYT-T.

Sed etiam in hominibus per febres calor major nascitur *e*). In febre rubra tantum fuisse æstum legimus, qui de faucibus ægri exibat, ut medicus caput a vapore detorqueret *f*). In morbo bouum sanguis calidissimus *g*) etiam ad tactum fuit, inque malignis febribus æstus acerrimus *h*). Fuit, quæ balnei aquam suo vehemente æstu calefaceret; calida vero æstimatur aqua, quæ 100 gradum attingit. In pleuritide inf. Minorcæ *i*), ægrotantium æstus fuit grad. 102 & 104, idemque 102 grad. in flava febre *k*), in febre vero intermittente 104 *l*) gr. & alias 106 & 108 *m*), in continua ad 109 *n*). Ultimum gradum caloris MARTINUS & NAESMAN ad 110 gr. Fahr. fixerunt. Certe, qui summus caloris animalis gradus est, is in cane fuit, quem *Arnoldus* DUNZE vaporario 146 gr. calenti incluserat. Is tamen in abdomine 110 grad. non excessit *o*), in homine 112 *p*). Unicum enim experimentum nondum recipio, hominis, qui manus suæ calore thermometrum Fahrenheitianum fregerit, qualia spiritu vini repleta 112 gradu terminantur *q*). Neque Surinami, in calidissima regione, sanguis magis incalescit, quam nostratibus. In ore enim ipso thermometrum gradum 94 ad 97  $\frac{1}{2}$  indicavit *r*), & calorem humanum cum calore aëris non pariter intendi, neque sub æquinoctiali linea, quam in Europa, majorem esse, annotavit Ill. SENACUS *s*), neque in maxima febre ultra 8, vel 10 gradus calorem animalelem superare *t*). In nuperis Britannorum periculis vidimus calorem humanum non supra 108 grad. ascendisse, etsi calor atmosphæræ ad 200 & 260 grad. auctus fuerat. Quare putarunt Cl. viri gaudere hominem vi, quæ calorem in atmosphæra minuat. Id repugnat experimentis alias repetendis, quæ ostendunt, hominem aërem ambientem per respirationem phlogisto saturare. Quare non plus inde deduxeris, quam eam esse legem, ut nulla violentia caloris exteri in vivo animale calorem supra 112. possit augere.

*e*) NAVIER *sur plusieurs maladies populaires.*

*f*) *Fränkische Anmerkungen* T. II. p. 105.

*g*) HUXHAM *fore throat*, p. 58.

*h*) Cl. CHOMEL in thesi *Ergo tumidis hæmorrhoidibus hirudines.*

*i*) CLEGHORNE of *Minorca*, p. 245. 246.

*k*) *Essays Medical and literary of a Society at Edimburgh*, T. II. art. 29.

*l*) SCHWENKE p. 57.

*m*) MARTINE *Essays*, p. 342. SCHWENKE p. 77. Tantum 100 in quartana SCHWENKE.

*n*) *Ant. de HAEN*, p. 168.

*o*) DUNZE *exper.* 4. p. 26.

*p*) SAUVAGES *inflamm.* p. 238.

*q*) WOLF *vernünftige Absichten* n. 208.

*r*) *Allgemeines Magazin*, T. V.

*s*) l. c. T. II p. 247.

*t*) Idem *ibid.* p. 246.



§. III\*. *Electrica Materies.*

Sequitur, ut de elemento agam duplici, pariter, ut halitus, volatili, quod nuper in sanguine Cl. viri coeperunt admittere, & cuius levem quandam hic gustum offero, cum rem novam, nondum satis constitutam, nullo meo proprio experimento illustratam, omnino indicare potius possim, quam plene exponere.

Primum *electrica materies* in sanguine nostro perinde, ut in omni alio fere corpore, reperitur, ignea ea, cum phlogisto comparata proxime affinis *u)*, odore certe proprio phlogisti *x)* subgravi, potentissimarum eadem virium. Ea in solito corporis humani statu nullum sui indicium edit, æquabiliter, ut videtur, per universum corpus distributa.

Eadem quando in torrentem per frictionem incitata, vel in corpus humanum congesta, se in vicinum corpus exonerat, minus ubertim ea dotatum, vel vicissim ex corpore electri pleno in nostrum, minus eo elemento dives, recipitur, insignes utrobique effectus edit. Scintilla nempe ex quacunque corporis parte educta ignis vim habet, vaporem pulveris pyrii & spiritus vini accendit, in corpore nostro, qua scintilla recipitur, dolorem facit insignem & concussionem, quæ late propagatur, uti major ejus vis est, demum si scintilla potentior, & ictus validior fuerit, animalia minora occidit, laceratis eorum vasis, & effuso sanguine: potentior etiam magna animalia denique necat, qualis ex ferreo cylindro exiens, cum scintilla atmosphærico electro tonitruali onerata esset, RICHMANNUM subito exanimavit. Singulare vero est, ictum in caput electricum animal fere occidisse, ut tamen ictus in sternum datus idem *y)* suscitaret.

Idem elementum in torrentem incitatum pulsum duplo accelerat *z)*, & humorum motum duplo auget, respirationem incitat, ovorumque exclusionem præcipitat.

In sanguine habitat, & de sanguine ex vasis effuso scintillæ specie exsilit, & conspicuum etiam de vena incisa cum sanguine exsilit, ut de musculo, tendine, nervo.

Negativa electricitas contraria facit, & liquorum motum retardat. Cum perspirante materia Sanctioriana potissimum de pilis *a)* & plumis psittaci emicat.

*u)* WINKLER *qua ratione ignis & mater. electric. cet. p. 167.*

*x)* GERHARD *Mém. de l'Acad. de Berlin, 1752.*

*y)* Coll. *Hafniens. II. p. 60.*

*z)* GERHARD *Mém. de l'Acad. de Berlin, 1772. RÖSTLIN de effectibus electricit. in corp. organ. Tubing. 1775. 4.*

*a)* CASTILLON *in se ipso Berlin. Magaf. II, p. 485. 486.*

In dorso felium notissimum, etiam in nonnullis hominibus abundat, ut electricas scintillas de linteis excutiant, quibus amiciuntur *b*). Limbus electricus de corpore humano undique exhalat *b*\*).

Per communicationem electrici *b*\*\*\*) sunt nervi, cula \*), fibra lignea. Non recipiunt electricam naturam pars serosa sanguinis, feri, muscoli sicci, intestina sicca, gelatina sicca. Perfert & communicat oleum animale, medulla, lymphæ, ungues, capilli. Conductores sunt globuli rubri, sal urinæ fusilis, intestina, ossa recentia, cutis humida, nec sicca; & uno verbo videtur per experimenta confici, corpora animantium sicca non esse electri conductores, & quæ videantur conductores esse, ea in ratione aquæ, quam continent, eo officio fungi.

Potentissimus stimulus idem electrum est, qui musculos & cor ipsum ad motum suscitât, quo tempore ad omnes alios stimulos obsurduerunt. Vidi in gallinis aquis merfis tactum electrica virgula musculum caudam animalis, & crus erexisse, vitam tamen non rediisse. Eadem est scintilla, quæ nunc demum de anguilla stuporifera conspicue emicuisse visa est, ut concussionis electricæ torpedinis non alia causa sit.

Idem electrum corrigit aërem *b*\*\*\*\*) clausum nec renovatum, & animal refocillat, quod in ejusmodi aëre perituum anhelat.

pag. 37. l. 16. & in animalibus carnivoris *g*), herbivoris mitior lege gravissimus in variolis *f*\*) aliisque acutis morbis *f*\*\*). Cum feri odore comparatus est *f*†).

Sed etiam urtica marina, quæ ab urendo nomen habet, vaporem, dum se constringit & dilatat, emittit, qui oculos acrimonia inflamat *f*††). In animalibus carnivoris fastidiosior est *g*), herbivoris mitior. De eo odore, qui epidemia Neapolitana *g*\*) infecti fuerant, ipsi querebantur, & a miliari febre mori vidi, qui mortem suam se olfacere clamabat.

ibid. l. ult. adde Lochiorum sanguis foetet *h*\*), sed id loco tribuas, ex quo fluit, & stagnanti in calore cruori.

*b*) ROUX Journ. de med. Sept. 1775. Nov. 1776.

*b*\*) PONCELET.

*b*\*\*) ROZIER, 1776.

\*) Caro forte legendum est. Not. Edit. huj. auct.

*b*\*\*\*\*) SCHINZ de electric. p. 28.

*f*) Barthol. MESNY ap. TARGIONI raccolta, III.

*f*\*\*) P. G. WERLHOF oper. p. 140.

*f*†) BUTT Spont. separ. p. 56.

*f*††) BERTHOLET de l'air.

*g*\*) FASAN. p. 204.

*h*\*) BÜTTNER Kindermord. p. 12.



Utique magis exhalat in calore majori, & plus feri etiam de grumo secedit *h\*\**).

*Paragraphum quartam excipit in nova editione*

§. IV\*. *Phlogiston.*

Phlogiston, s. id quod ignem capit, purum, aliud est a pinguedine, quæ præter id inflammabile plurimo acore constat. Hujus elementi incipimus doctes aliquas detegere.

Phlogisti odor cum acore in electrica est materie *p\**). In alimentis habitat, & a natura animali in electrum perficitur *p\*\**).

Ejus certa portio in sanguinis parte rubra salubriter inest. Pars superflua *p\*\*\**) de pulmone exhalat, nisi exharet magnorum morborum causa futura. In sanguinem ex aëre transiens eum reddit inflammabilem. In adipe etiam abundat *p†*). A phlogisto calorem esse, & a ferro ruborem puto hunc a ferro phlogiston accipit *\*)*.

Eidem phlogisto motum muscularem tribuit Cl. PRIESTLEY. Per universum autem etiam continuo exhalat, & æquilibrium requiritur ad hominis integritatem, inter id phlogiston, quod alimentis accedit, & id, quod exhalat *p††*).

Longius progressus I. HUNTERUS *p†††*) sanguinem vivere docet, & in vasa coagulatum se fingere. De ista quidem hypothese dicemus, quando de formatione partium corporis animalis dicetur. Vitam nostram in humore esse, cui pene toti amisso supervivimus, omnino non videtur probabile.

p. 38. l. 18. *post* moram *adde* in vase ampliter aperto, lentius in clauso *q\*)*.

ibid. l. 19. *post* ascendunt *adde* qualis etiam aquula de compuncta placenta per foramina stillat. Eadem aqua super cruorem natat, magna cet.

p. 39. l. 7. *post* rubet *adde* Partem colorantem sanguinis perexiguam esse <sup>1)</sup> novimus, & magnam vim aquæ tingere, etiam millecuplam <sup>2)</sup>, & globulum

*h\*\**) BUTT *Spont. sangu. separ.*

*p\*)* GERHARD l. c.

*p\*\**) PRIESTLEY *sur différentes sortes d'air.*

*p\*\*\**) MOSCATI

*p†*) Id.

*\*)* Nescio profecto, quæ conveniat his verbis medela; quanquam enim ruborem a puto commate separandum, & puto loco puto legendum esse opinari aliquis possit, tamen non video, quâ ratione phlogiston ruborem a ferro accipere queat; etenim inflammabilem equidem materiem omnis potius coloris expertem existimaverim. *Not. editor. hujus auctar.*

*p††*) Idem.

*p†††*) *Comment. Med. XI.*

*q\*)* BUTT p. 6.

<sup>1)</sup> BUTT l. p. 40.

<sup>2)</sup> lb. p. 41.

ipsum rubrum subviridem esse <sup>3)</sup>, atque a phlogisto <sup>4)</sup> demum ruborem concipere, & demum nigrum fieri, si repletus phlogisto, in aëre phlogiston recusante detentus, se suo phlogisto per exhalationem non possit liberare<sup>5)</sup>. Ea omnia cum meis experimentis comparata eo redeunt, ut totus quidem globulus ruber sit, in centro vero iste rubor congestus intensior appareat.

ibid. l. 14. *lege* permissum.

ibid. l. 22. *Petrus van MUSSCHENBROEK* rationes ---- tum 1084 & 1027 c) *lege* Sollicita cura *Petr. van MUSSCHENBROEK* c) hæc pondera definierat. In homine sanguinem totum reperit ad aquam se habere uti 1046 ad 1000, cruorem solum ut 1084, serum solum ut 1027 od 1030. In cane sanguis arteriosus erat 1082, venosus 1062. In agno sanguis pendet 1060, serum 1019. In vaccis sanguis 1058, serum 1042.

p. 42. l. 9. *post* circumfluit *adde* Eluta placenta quasi in cellulosum reticulum abit, in quo laminæ sunt.

ibid. l. 11. *post* ruforum *adde* hominum.

ibid. l. 13. *post* Europa *adde* aucto calore etiam magis ut ad 125 grad. Fahr. g). Maximo in æstu omnia fluida corpora dissipantur.

ibid. l. 19. dum *lege* in qua

p. 43. l. 7. *post* indurescit *adde* & similia in fila, coriique speciem in aneurysmatibus coit.

ibid. l. 12. *adde* Id quidem non recusavero, secedere sensim globulos ipsos, fundumque petere, per Cl. DAVIES experimenta.

ibid. l. 14. *post* circa *adde* 125,

p. 44. l. 7. *post* minori *adde* in majore tamen celerius

p. 45. l. 10. Sanguis in petechiis sub initia morbi ---- si fluidus de vena prodierit *lege* In morbis acutis deterioris generis sanguis in principio sæpe sani simillimus; alias & fluidus est, & coccinei coloris, ut tamen placenta cruoris tenerior sit c). Alias omnino crustam habet, ut in febre inflammatoria innatantem, aliquando densam, tenuem alias, sub qua nonnunquam sanguis dissolutus & tenuis fit b). Alias omnino nihil peculiare ostendit.

<sup>3)</sup> MOSCATI. <sup>4)</sup> Id. ib. <sup>5)</sup> Ibid.

pag. 39. not. u) *adde* BUTT p. 49.

pag. 42. not. l) *adde* etiam Cl. BUTT p. 6.

a) HUXHAM *of fevers* T. II. p. 83. *of sore throat*, p. 31. 39. In principio anginae malignæ densus, post aliquoties sectam venam merus nunc ichor est, MOULTRIE *febr. flau.*

b) WARREN *of the yellow fever*, p. 11. LININGS *Ess. med. and. philos.* T. II. art. 29. HUGHES *nat. hist. of Barbadoes* p. 38. *Nouveau voyage de Guinée* p. 311. Floridus absque ferro cogitur; post triduum vero flavus est, & naturam coagulabilem exuit. In variolis dissolutus educitur, sic in petechiis HUXHAM *of sore throat*, p. 37. *of fevers* p. 52. 53. 58. 59. 62.



Verum paucos intra dies hæc ita mutantur, ut nulla nunc crusta coriacea coëat, & universus sanguis tenuis, niger aut decolor, glutinosa natura destitutus appareat; demum in peculiari illa maligna insularum Antillarum & regionum tropico subjectarum febre tota corporis universitas, ipse demum adeps, flavo colore suffundatur, & serum sanguinis potissimum flavum sit. Ita variolæ sanguinem disponunt, ut cruor ruber facillime dissolvatur *b*\*)

pag. 46. l. antepen. neque malum auxilia fere admittit *lege* neque vulgo putetur, id malum auxilia fere admittere,

ibid. l. penult. *post* nequit *adde* Neque tamen hoc triste præsagium adeo fidum est *u* \*), quin subinde in variolis, petechiis, aliisque febribus putridis, post hæc funesta sanguinis dissoluti indicia, homo mortis periculo eripi potuerit, & sanguini prior densitas restitui, cortice peruviano, & acore potissimum minerali adhibito. Cl. *Prosper d'EMPORTES*, qui in Dominici insula medicinam fecit, ejusmodi hæmorrhagias minime reformidabat, neque infelix Jamaicensis medicus WILLIAMS.

Ceterum horum omnium testimonia adeo numerosa coram habeo, ut omisisse maluerim, ne lectori tædio sim.

ibid. l. ult. *adde* & ipsum unguen articularum, & adeps, & lac.

p. 47. l. 10. *lege* eam æstimavit

ibid. l. 17. *post* HOFFMANN *adde* & nuper Cl. DAVIES

p. 48. l. 10. *adde* Multa vero sunt, quæ hanc portionem turbant. Si ex amplo vulnere sanguis saliverit, plus fere in ratione 3. 2. feri secedet, quam quidem secederet, si vulnus exiguum fuisset, idem etiam majori parte feri liberatum crassamentum solidius erit *u* \*), & sanguis, qui pleno flumine exundaverit, plus feri amittit; minus, qui lente secundum brachium labitur *u* \*\*).

p. 49. l. 3. *lege* Porro

ibid. l. 13. *lege* Contra æstivus sanguinem in Carolina meridionali ita dissolvit, ut exigua de grumo portio supersit *k* \*\*). Contra in morbis, quo quisque cet.

SCHWENKE p. 129. LISTER *de variol.* p. 98. BLANCHINI *lettere* p. 135. In parisiensi morbo celeriter ad mortem tendente, sanguis tenuis fuit, ut pulli cruor. *Mém. de l'Acad. des. Sc.* 1749. p. 119. In angina maligna similia habet HUXHAM *of sore throat*, p. 52. & in febre nosodochiali jam provecta PRINGLE *de morb. castrens.* p. 296. Sanguis in malignis amittit mucosum elementorum vinculum BORDEU *du pouls*, p. 303. In peste sanguis floridus & ruber est *Obs. sur la peste*, p. 343. In vaccarum lue dissolutus est HANNÆUS in libello de ea lue proprio, p. 19. *Hannöver. Viehseuche* p. 27. Ipse adeps motus est ENS *morb. osterod.* p. 81.

*b*\*) SARCONE *vajuolo*, p. 156.

*u*\*) p. 33.

*u*\*) BUTT l. c. p. 12.

*u*\*\*) p. 13.

*k*\*\*) CHALMERS *diseases* P. I. p. 114.

pag. 50. l. 11. *post animalibus adde & in pullo, qui ovo continetur, calido animali s\*)*.

ibid. l. 13. *neque microscopii lege ne microscopii quidem*

ibid. l. ead. *Non absque ratione frigida animalia ---- quæ meos veri cupidos oculos fugerunt lege Eum enim tenuem liquorem continuatus motus demonstrat, quando uno globulo ex quiete in motum acto, alius longe distans globulus, & demum plures globuli in motum revocantur, quæ continuas communicati motus locum habere non posset, nisi primus globulus cum secundo per invisibilem liquorem conjungeretur. Mecum sentit Cl. SPALANZANUS.*

Hos globulos in propriis oculis meis sæpe vidi, quando ciliis lumen candelæ excluderam. Tunc enim in opposito linteo, vel in charta, & cylindrica vasa, & globuli per ea vasa celeriter moti nudo oculo conspiciuntur. Eisdem etiam globulos vidi, cum per exiguum foramen inspicerem. Hæc experimenta fusc & ornate Cl. MEISTERUS descripsit.

Sed sanguinem de vase eximere, aqua diluere, inter duas talci laminas recipere non placet: his enim artificiis nativa globulorum figura mutari potest.

p. 51. *Decima paragraphus in nova editione ita orditur: In horum globulorum historia oportet sollicitis & lentis passibus progredi. Cum enim nuper plures insignes viri in cruoris globulis microscopio contemplandis versati fuerint J. Maria a TURRE, F. FONTANA, Guil. HEWSON, Lazarus SPALANZANUS & alii, mirum est, quam diversa sint, quæ quisque horum clariorum vidisse se putat, ut neque inter se eos conciliare possim, neque cum meis numerosissimis certe contemplationibus. Commune noviter repertum cet.*

p. 52. l. 12. *lege & attractione mutua non egent, ut in globulos figurentur.*

p. 53. l. 6. *adde In chylo & lacte globuli etiam sunt, affinis cum sanguineis naturæ.*

ibid. l. 18. *lege Ego quidem & in frigidis bestiolis, & in calidis has particulas sum contemplatus, & quidem plus ducenties; eas vero semper cet.*

p. 54. l. 1. *post expallescant adde quod idem & Cl. MEISTERUS vidit, & HEWSONUS*

ibid. l. 9. *post percipiatur adde Cl. demum viri, & quibus plurimum tribuo, Lazarus SPALANZANUS, & Felix FONTANA, & Cl. MEISTERUS pariter sphaericas viderunt & Cas. POZZI.*

s\*) Huc spectant notæ t & u pag. 50.



pag. 54. l. 19. *adde* Cl. vero vir *J. Maria a TURRE*, microscopiis insignissime argentibus usus, vulgaribus quidem vitris, pariter ut nos, sphaericos vidit; acrioribus vero & diametrum 256es & demum 1960es argentibus, omnia alia reperit.

Esse nempe sacculos membranofos quos globulos vocant, complanatos, lymphæ plenos, qui ipsi fiant ex tribus ad sex usque particulis oblongis; quæ particulae & ipsæ vesiculæ sint, quæ in majorem annularem sacculum abeunt, & vicissim discedunt & separantur. Integra vero vesicula, quam globulum vocant, plana est & ovata.

Quæ causa sit hujus a nobis, & fere ab omnibus aliis incisoribus dissensus, nondum intelligo, nisi illa ipsa nimis acris vis microscopii mutatis umbris Cl. viro fraudi fuit, qui interim, dum mediocribus usus est vitris, similia vidit nostrorum.

Inde *Guilielmus HEWSON* simplices quidem particulas dixit, tamen ut planæ sint, & vesiculæ liquore plenæ. Memorabile vero est, quod in aqua sphaericam figuram recuperare fateatur.

Nunc globuli sanguinei perpetuo in aqua natant, parum ab aqua vulgari diversa, & is status iis naturalis est, quem Cl. viro teste in aqua induunt. In nonnullis etiam animalibus sphaericos vidit, & eandem crassitiem in medio sphaeræ, perinde ut nos. Ut omnino de solis conclusionibus, non vero de re visa, inter nos discrimen esse putem.

Legi & cum ea fide, quam Claris viris debemus. Neque tamen possum de mea sententia discedere, qui numerosissima ejusdem semper eventus experimenta fecerim, & consentientes viros peritissimos habeam FONTANAM, SPALANZANUM, *Cæsareum POZZI*.

ibid. l. 23. *lege* iisque fere frigidis.

p. 55. l. 11. *post* affirmat *adde* Cl. SPALANZANUS in salamandra duorum generum globulos facit, oblongos alios, minores alios & sphaericos, ceterum in omni animali æquales. Cl. HEWSON aliam, aliamque in diversis animalibus molem facit, minorem in cete, quam in piscibus frigidis, in raja skate maximam, in pullo majorem, quam in gallina.

ibid. l. ead. *post* experimenta *adde* discutienda

ibid. l. 13. *adde* nihil tamen vidi, quod suadeat, inæquali esse magnitudine.

ibid. l. 15. *post* habeat *adde* Nongentesimæ parti pollicis æqualem diametrum

Cl. a TURRE facit.

p. 56. l. 5. exponendo *lege* experiendo

ibid. l. antepen. iidem *lege* eadem.

pag. 56. l. ult. *post* rubescant *adde* ut plufculis cl. viris vifum eft, ut rari flavi vi-  
fi fint Cl. a TURRE & REICHELIO.

p. 57. l. 3. *post* infidere *adde* ut mecum vidit Ill. Felix FONTANA, & SPALAN-  
ZANUS,

ibid. l. 8. *post* inhæret *adde* verus tamen rubor inest.

ibid. l. 12. *adde* non decet diffimulaffe, Cl. SPALANZANUM, cui merito plu-  
rimum tribuo, flavum quidem globulorum colorem vidiffe, fed ad refrac-  
tam lucem rejeciffe. Verum mihi quidem, fi ulla oculo fides haberi poteft,  
de flavedine globulorum certiffime conftat. Vide quæ dixi a\*).

ibid. l. ult. *adde* Non vero unquam vafa animalis vivi fere inania effe, facile  
dederim, & pelluciditatem liquoris, quo permeantur, eum inconfpicuum  
reddere. Nam in ejufmodi vafis, quæ vacua videntur, folitarii & longe a fe  
invicem remoti globuli tamen celeriter moventur, & novas a corde acceptas  
fuccuffiones sentiunt, quod quidem fieri non poffet, nifi cordis impetum  
liquor aliquis ad anteriorem globulum perferret.

p. 58. l. 13. *adde* Sic in pullo, qui ovo continetur.

ibid. §. XV. *lege* *Figura num mutabilis?*

p. 59. l. 3. *adde* & I. M. a TURRE,

ibid. l. 5. *post* addidit *adde* porro Cl. REICHELIIUM, & L. SPALANZANUM uni-  
co fere in exemplo, & Felicem FONTANAM.

ibid. l. 14. *lege* alterna.

ibid. l. 18. *post* Sed *adde* neque G. HEWSON figuram mutari vidit, neque CAL-  
DANUS.

ibid. l. ult. *adde* Denique Cl. MEISTERUS globulos in proprio oculo, fæpiſſi-  
me repetito experimento, cum conſpexiffet; neque figuram variabilem repe-  
rit, neque magnitudinem.

p. 60. l. 18. *post* diftinximus *adde* multo, quam globuli rubri, majores, quos  
etiam L. SPALANZANUS vidit.

p. 61. *Paragraphum decimam sextam excipit*

#### §. XVI\*. *Num ex filis?*

Nova eft ſententia Cl. viri I. Henrici LANGE, qui globulos ſanguinis pro  
glomeribus filorum habet, in figuram globofam ita compactis, ut altero  
fine in centro conjungantur, altero ſe per ambitum diffundant r\*). Eam ſan-  
guinis fabricam putat in morbis acutis mutari, ut globulus in ſuas fibras dif-

a\*) Vid. Lib. V. Sect. I. §. VII. & auctar. ad hunc locum p. 7.

r\*) Remed. domeſt. p. 155. 165. Nov. verit. p. 46.



solvatur r\*\*). Verum ea fila neque ego unquam vidi, neque quisquam Cl. virorum, qui in globulorum natura indaganda laboraverunt.

pag. 63. l. 20. *lege sanguineum*

p. 64. l. 8. *post* HALES *adde* Seri flavos globulos vidit etiam Cl. LEDERMÜLLER & A. C. LORRY.

ibid. l. 15. *adde* Huc revoces *F. Maria a* TURRE experimentum, qui annulares suas vesiculas in particulas illas minores oblongas, quibus constant, quoties motus sanguinis acrior urgeret, dissiluisse vidit.

p. 65. l. ult. *lege* & voluminis aucti, globulorum majorum vera sit, quales LEEUWENHOEKIUS habet.

p. 66. l. 12. *adde* Nuper demum Cl. SPALANZANUS & Felix FONTANA & coalitum particularum unius globuli rejecerunt, & dissilitionem, tum Cl. DAVIES.

ibid. l. 21. *dele* aut quod solitarii apparerent, aut, quod magis probabile videtur,

p. 67. l. 21. *quæ lege* ob quam

p. 68. l. 22. *adde* *I. Maria a* TURRE idem se vidisse existimat, quod vidit LEEUWENHOEKIUS, nempe unum globulum, qui dissipatus fuerit.

#### §. XX\*. *Aliqua cum globulis facta experimenta.*

Cl. HEWSON globulos cum variis liquoribus & aquis composuit. Ab aqua diximus intumescere, & in sphærulas turgescere, & demum dissolvi: quod pene incredibile videtur; qui nativi aquosi feri hospites sint, ab acore non acerrimo pariter dissolui, non ab alcali; ab alumine, spiritu vini & vitrioli corrugari, a putrefactione asperos reddi & demum dividi. Nihil ego hujusmodi vidi, neque figuram, aut ab aceto, aut a spiritu nitri etiam fumante, mutatam; tantum ut terreum, luridumque colorem ab his acidis liquoribus contrahant.

p. 69. l. 22. *lege* ab elutis

ibid. l. 23. *adde* & Cl. KRÖNAUER

ibid. l. ult. *adde* Demum Cl. BUTT de sanguine rubram portionem eluit, ita massam albam superesse reperit firmam & tenacem, quæ sit pars fibrosa sanguinis.

p. 70. l. 14. *adde* Cl. DAVIES sanguinem in aquam emittum fieri docet in reticulum fibrarum albarum; & similes fibras obtineri, sanguine in phiala confuso, albas eas, glutinosas & elasticas.

pag. 71. l. 6. gravitatem *lege* gracilitatem

ibid. l. 9. quemque *lege* quamque

ibid. l. 11. vivo *lege* vivi

ibid. l. 24. aliqua *lege* pleraque

p. 72. l. 10. quam *lege* quem

ibid. l. 14. *lege* neque eos unius generis

ibid. l. 15. rubrumque *lege* cubicumque

p. 73. l. 10. *adde* Nihil nos, dum valemus, a sanguine vasa nostra percurrente patimur, quum continuo incommoda percipiamus, quamprimum puri sales cum sanguine circumfluunt. Cum salem polychrestum sumsissem, bis fornicationem in pedum plantis, manuumque volis per aliquot horas, inque lingua titillationem percepi, cum interim urina acris manaret.

p. 74. l. antepen. *adde* Putredini potenter resistit *g*\*).

Sal febrifugus SYLVII, & in universum sales neutri, ex alcali minerali & acore compositi, putredinem adjuvant *g*\*\*).

p. 76. l. 4. *adde* in cane etiam magis

ibid. l. 14. Non facile explices, ut CAELIUS AURELIANUS scripsisse potuerit, gelatum ab aceto solvi.

ibid. l. 19. *post* Alumen *adde* aliter & aliter egisse videtur. In Cl. STORMII experimentis sanguini livorem impertiit, atrumque colorem secundum alios solutum sanguinem cet.

p. 77. l. 12. *post* aluminis *adde* & sulphuris

p. 78. l. 6. venas *lege* membranas

ibid. l. antepen. *adde* in *Cesarei* POZZI experimento etiam subito & sanguinem coëgit.

p. 79. l. 1. *post* missus *adde* canem.

p. 80. l. ult. *adde* Alias in BOURGELATI experimento in floriditate nihil mutavit.

pag. 71. not. c) *adde* MOSCATI nuove esperienze, BUTT *separ. spont.* p. 30. qui serum coire ponit, filis inter se connatis.

*g*\*) MESNY ap. TARGIONI III. p. 38.

*g*\*\*) YPEY *Verhandeligen der Maatschappij te Harlem*, XVI. 2.

pag. 77. *ad verbum* nigrumque in *textu* l. 17. *adde* not. *u*\*) Subvirides globulos, BUTT l. c. p. 52.

pag. 78. not. e) *adde* Subvirides globulos reddere BUTT p. 52.

ibid. not. l) *adde* Globulos nigros reddere BUTT l. c.

pag. 79. not. b) *adde* BUTT p. 52.

ibid. not. d) *adde* BUTT p. 52.



pag. 81. l. 4. *lege* Putredinem a sale sodae augeri *xpx e\*)*, & porro a volatilibus cet.

p. 82. l. 3. *dele* neque grumum sponte sua factum & *adde* Ceterum sales ex lixivio enati, non quidem semper, ut scriptum est, aliquando tamen, & in febribus potissimum, urinosum spiritum affusi de sanguine coegerunt ascendere.

p. 83. l. 4. *post* reddit *adde* Venena ex plantis sumta, in venas vivi animalis injecta, fere sanguinem fluidiorem reddiderunt, gummi guttæ, cocculi, nuxvomica, aqua laurocerasi. De sale viperæ *i\*)* legi, cogere sanguinem, apud scriptorem non satis certum. Hydrargyrus utique, confirmato eventu, sanguinem dissolvit. Visus est sanguis, cui crusta inerat, serumque nullum adfuerat, post usum vesicatorii confestim serum habuisse absque crusta *i\*\*)*.

ibid. l. 23. Neque enim certo experimento *lege* Neque enim frequenter.

ibid. l. ult. *adde* In equo tamen asthmatico reperio utique sanguinem violarum syrupum colore viridi tinxisse apud Cl. BOURGELAT. In morbo mucoso (*morve*), equorum sanguis cum spiritu vitrioli fumat, & odorem edit urinosum. In febre maligna, urina alcalinam naturam induxit, cum non plures tribus horis stetisset. Plura alias.

p. 84. l. 7. *post* ferveat *adde* Vt præterea & sanguis *r\*)*. & universum corpus ad citam putredinem, promptam alcalinæ naturæ evolutionem, exponatur. In febre acuta aliquot sunt exempla, de manibus cineribus clavellatis elutis *†)* spiritum urinosum ascendisse. Qui vero sanguinem in morbo acuto negant putrescere, ii in verbo ludunt; & id solum negare volunt, esse perfectam, dum vivimus, qualis in cadavere est, putredinem. Bilem ROEDERERUS solam negat alcallescere.

ibid. l. 17. *dele* Hæc ideo paulo curiosius moneo ---- & alcalinum.

ibid. *Inferenda est*

#### §. XXVIII\*. Sanguis putrescendo alcalescit.

Verum hæc omnia sollicite debent exponi, cum nuper alii Cl. viri putredinem ab alcalina natura separaverint. In eo quidem consentiunt omnes, & in febre acuta statum putredini & naturæ alcalinæ similem nasci, & a morte. Neque alcali a putredine destrui, quod dictum est, constat: & omnino placentam sanguinis die 10, 20, 30 spiritum perinde alcalinum dedisse, &

*e\*) Verhandl. der Haarlem. Maatschapp. XV. 2.*

*i\*) SALMON chirurg. p. 858.*

*i\*\*) LYSON essays CLOSSIUS variol. p. 29.*

pag. 84. not. r) *adde* de bile ROEDERER.

*r\*) COLLIN de Arnica, exp. 3.*

*†)* Apud MODEL.

fortius die 16 & 24, quam primis diebus 2\*); & debile alcali nasci, quando sanguis in principiis est putredinis, multo vero fortius, quando putredo longius progressa est. Mature tamen in tabescentibus partibus animalibus putredo nascitur, etiam quando neque cum acore fervent, neque coeruleos succos viridi tingunt 2\*\*). Anget adeo naturam alcalinam putredo 2†), quam primis diebus fermentatio acida morabatur. Qui negarunt alcali nasci, aut certe nasci in libero aëre, ii nimis pauca experimenta contemplati sunt 2††).

pag. 84. l. 22. *lege olentem.*

p. 85. l. 8. *adde* Huc possis referre ob frequentiores pulsus, quod juniora animalia celerius putrescant d\*).

Sanguis & universum corpus animale sibi permissum, in aëre atmosphærico non frigido, putrescit eo celerius, quo major calor est, ad gradus fere 200, cujus certa experimenta habeo d\*\*); majori enim calore serum dissipatur, neque cruor nunc putredinem concipit. Sunt, qui sanguinem minus celeriter, quam carnes, aiant putrescere, ut & mihi in dissectionibus quandoque visum est; sunt, qui celerius, ut prius foeteat, tunc caro, inde serius bilis & urina d\*\*\*).

Cum foetore ergo serum sanguinis, sanguis, humores universi eam naturam induunt, ut cum acore compositi ferveant, ut syrupum violarum viridi tingant, ut igni subjecti ante ipsam aquam salelem volatilem edant, ut alcalini sint.

### §. XXIX\*. *Putredinis phenomena.*

Accuratius vero speculanti progressus putredinis, apparuit, foetidum vaporem exhalare, validissime si in vase angusti colli putredo sedem habuerit: post eum vaporem, putridum foetorem; naturamque alcalinam minui & evanescere; &, quod reliquum est de putrescente animali, in terram fatuam insipidamque abire. Una, resoluta omnium partium nexu, membranæ primæ & viscera in tabum solvuntur; & denique terreum pollinem sui reliquum faciunt.

Putes adeo putredinem cum alcalina natura conjungi.

2\*) COLLIN *de arnica.*

2\*\*) Idem.

2†) Id. *exp.* 16.

2††) PEARSON.

d\*) PEARSON *de putredine.*

d\*\*) MESNY apud TARGIONI *raccolta* T. I. p. 451.

d\*\*\*) RÖDERER *de bile.*

pag. 85. not. i) *adde* Sanguis foetidus MESNY apud TARGIONI T. III. BERUCCI *lettere*,



Negant alii, tunc maximam alcalinam vim in putrescentibus esse, quando putredo summa est. Non nasci, addunt, alcali in aqua marina putrescente, etiamsi foetor nascitur, & vapor inflammabilis. Videri ad alcali generandum pertinere, ut multum sit in putrescente corpore phlogisti, ut eo in statu minus olei piceo supersit. Ceterum ita intelligo putredinis progressum, ut incipiat natura alcalina gigni in sanguine, inque putrescente materia animali; ita expediri primo alcalinos vapores, una magis & magis adipem resolveri, & putridum eum vaporem prevalere; dissipato adeo & alcali volatili & phlogisto consumto, inertem materiam superesse; sic cum pauciori phlogisto mistum acidum salem alcalinum odorem spargere; phlogisto vero uberius resoluto foetorem putrem ascendere, qui proximæ alcalinæ materiæ destructionem præcedit.

In animalibus cursu nimio ad mortem cet.

pag. 85. l. 18. *post erumpit adde* In malignis febribus frequenter foetet *l*\*).

ibid. l. 21. *post laborant adde* Sudor cadaverosi foetoris in febribus exitialibus halat *n*\*).

p. 86. l. 2. *dedisse adde & Cl. FASANO teste* Neapoli in exitiali febre olfaciebant *p*\*). In febre inficiente miseri se contagium recepisse sentiebant, cum ingratum terræ odorem in ventriculum descendentem perciperent *p*\*\*).

ibid. l. 15. *post puris adde* igne subiecto halans.

ibid. l. 6. *post prostravit adde* Sanguis foetidus, niger & fluidus, per nares, gingivas, asperam arteriam, alvum, aliasque per vias erumpens in febre variolosa *s*\*).

ibid. l. 7. *post est adde* Undique gangrænæ, sanguis dissolutus, fæces foetidissimæ *t*\*).

ibid. l. 8. *adde* Hæc confirmantur ex acidis sudoribus, quos, morbo jam remittente, in petechiis observarunt Cl. STRAK, ROSEN, GRAINGER, aliique; signa fracti domini alcalini. Huc etiam referas, quando satis repetito ea experimenta confirmata erunt, Cl. TICHY memorabilem annotationem; in urina nempe febricitantis, sed ad crisin dispositi hominis, sales angulosos mediæ naturæ se offerre, qui nulli generantur, quando putredo dominatur, & effectus funestus est futurus. Inde enim, non certe improbabili-

*l*\*) KIRBY febr. mal.

*n*\*) Zeemusch. Gesellsch. I. p. 646.

*p*\*) p. 207. Sic BAGLIVI opera, p. 251.

*p*\*\*) LIND fevers and infect. p. 244.

*s*\*) WERLHOF variol. morbill. p. 240. STORCH IV. Jahrg. p. 636.

*t*\*) *adde & cito desflagrat ENS morb. osterod.* p. 87.

*t*\*) In febre maligna LEPECQUE, p. 415.

arguitur, alcalinæ naturæ in sanguine victoriam id omne acidum delere, quod urinofam naturam temperabat, falesque sanguinis ammoniacis similes reddebat. Apparere vero sales medios, quando victa putredine nativus acor rediit, & cum alcalino elemento in medium salem restituitur. Ob avolans putridum foeditissimi sudores in febribus salutares sunt, ut vulgo notum est x\*), & in peste x†).

pag. 86. l. 15. *dele* Putredo aliunde nata ---- putredinem generavit a).

ibid. l. antepenult. *post* corrumpantur *adde* uti vicissim glaciēs putredinem moratur; & cadavera occisorum, quos nives obruerant, totis sex mensibus incorrupta supersunt, quoad æstatis redivivus tepor putredinem accersat c\*).

ibid. l. penult. *dele* neque multo blandius aër--febres nascuntur e\*).

p. 87. l. 9. *adde* Nihil autem potentius humores nostros corrumpit, quam ipsa putrilago k†), utcunque in corpus recepta, cibus putridus, animalium lue peremptorum elus.

Vapores cadaverum foetidi & cœmeteriorum, & acervi putrescentis brassicæ, & muscorum margaritiferorum tabescentes cumuli pestiferas febres excitant.

Similia patrat aër prægnans exhalationibus hominum copiosioribus, qua sola ex causa aliquoties in Anglia, & non ita dudum, judicum, aliorumque adstantium frequentes mortes acciderunt. In ergastulo, in quod crudelitas principis Indici numerosos Anglos stipaverat, plerique intra paucas horas perierunt. Vapor carcerum ex tubo propius receptus ac haustus perniciosissimas febres civit; & par est veneni potestas, quod vapores spirant k††) aquæ in sentina corruptæ. Chirurghi, qui carbunculos, bubonesque pestilentes curant, medici, qui perspirationem morientium inspirant, frequentissimas patiuntur ex simili morbo mortes. Nili aqua, cadaveribus repleti, pestilentem morbum genuit, qui LUDOVICI IX exercitum destruxit. Injecta in anilis venas aqua putrida cito funesta fit. Putrida avis carne *Tungusi* & *Baratti* sagittas suas inficiunt; iis leviter læsa animalia pereunt, & celerrime & ipsa putrescunt.

x\*) RAZOUX *Nosol.* p. 220.

x†) HUDGES.

c\*) MESNY l. c.

pag. 87. *ad verbum* urinæ in *textu adde* not. f\*) Ammoniaco odore in calida Carolina CHALMERS l. p. 112.

ibid. *ad verbum* fundit in *textu* lin. 12. *adde* not. k\*\*) *Medical Transactions* II.

k†) HOFMANN *Pocken l. Einleitung.*

k††) RUTTY, p. 148. PRINGLE *of the jail fever.* Ab aëre nosocomiorum BELLOSTE *Chir. de l'hôpit.* p. 67. Ab aëre ventilatoris, qui carcerem repurgabat PRINGLE *Phil. Transf.* n. 48.



Effectus putredinis variis modis admissæ potissimum sunt summa virium & irritabilis naturæ destructio, cum simili suæ causæ in humoribus nostris putredine conjuncta.

Sola cadaverum nimia consuetudo multos incisores ante diem abstulit. Memini ALBINUM, gravissima febre erysipelacea infectum, a BOERHAVIO fato fuisse ereptum: memini proprii morbis miliaris, & innumerabilium fere febrium continuarum, quas Gottingæ passus sum, cum inter cadavera sex fere in annum mensibus viverem.

pag. 88. l. 11. adde est sudor cum aceto efferbuit at).

ibid. Tricesima paragraphus in nova editione inscripta est: Aër expeditur & incipit: Una cum foetore putredo se demonstrat. Nemo putredinem accuratius cet.

ibid. l. ult. factorem lege foetorem.

p. 89. l. 10. adde Hæc eo tempore vera erant, nam postea Cl. CIGNA, NAVIER, CRELLIUS, alique magis chemice de putredine scripserunt i\*).

ibid. l. 12. post aërem adde qui de animalibus inflammabilis prodit i\*\*), idemque iterum resorbetur i\*\*\*). Is aër, cum avolante phlogisto inebriatus sit, flammam concipit i†); & cum ardeat, aufert alcali volatile i††), quoad perfecto stadio ultimo putredinis nullum superfit. Ut enim a putredine generatur, ita ardendo minuitur, & denique, postquam ad acmen pervenit, consumtum inertem massam relinquit. Hæc causa est, cur in amplis vasis apertis alcali minus generetur, in vasis angusti colli magis; hic enim vapor foetidus lentius avolat.

ibid. l. 13. post aqua adde mersos.

ibid. l. 19. post refert adde & in morbis putridis eam evolutionem locum habere, etiam intra ipsa vasa, nuper ostensum est n\*). Quare & in cadavere prius secedit, quam signa aliqua putredinis se efferant.

p. 90. l. 2. adde & cerebrum intra cranium in putrilaginem abiisse.

§. XXX\*.

pag. 88. not. r) adde HOFMANN Pocken I.

ibid. not. u) adde Prax. Med. VI. p. 140.

ibid. not. a\*\*) adde Manuel antisphyl. p. 705. Similia habet Cl. HOFMANN Pocken, p. 269.

at) BARTHOL. Cent. IV. hist. 59.

pag. 59. not. g) adde PRIESTLEY sur différentes especes d'air, p. 106. 107. WIEGLEB Gahrung p. 130.

i\*) BOISIEUX egregia femina de T.

i\*\*) PRIESTLEY ibid.

i\*\*\*) Idem.

i†) PRIESTLEY, PEARSON.

i††) WIEGLEB l. c. p. 128.

n\*) Obs. and Enquir. T. III.

§. XXX\*. *Adjumenta putredinis.*

Porro sanguis, dum putrescit, & ipse foetet detestabili odore, potissimum si per angustum tubulum exspiraverit; & alcalescit, ut omnino cum acore ferveat *t*\*).

Plerumque tamen aëris atmosphærici cet.

pag. 90. l. 8. *post* admiserit *adde* Sed humor modicus putredinem adjuvat, multa & sæpe renovata aqua retardat.

ibid. l. 10. *lege* Cancrorum oculi *y*), & magnesia, & bolus *y*\*), & selenites, & demum ipsi sales medii, in quibus alcali minerale cum acore conjungitur, ut sal mirabile GLAUBERI *y*\*\*), & sal sodæ *z*), sanguinis & carnis putredinem promovent.

ibid. l. 13. *lege* Sal fixus putredinem adjuvat *b*\*) & tartari &c.

ibid. l. penult. Volatiles alcalini sales ---- relinquit & tenerrimam terram *lege* Hæc nostro ævo labefactantur, ut passim legas, & experimenta producantur, quæ fidem faciant, aquam calcis putredinem tardare, sed etiam sales lixiviosos fixos eadem esse potestate; quæ utique cum prioribus conciliare nescio. Volatiles alcalinos sales equidem lego putredinem potius morari *i*) & impedire: Sic sales vegetabiles *i*\*), mites etiam, ut saccharum; succus limonum; & magis adhuc acidi *k*) de fossilibus *k*\*) parati liquores; ipsum demum vitrioli oleum. Id enim in æternum omnem putredinem a carne & avertit, & si incepta fuerit, abigit; redditque carni suam integritatem. Aër factitius, qui fere acidum subtile est, de solutis corporibus exhalans, putredinem inhibet & emendat *l*). Hoc etiam potissimum argumento ductus, in noxia putredine febrium malignarum, summo cum fructu, acoris vitriolici vires expertus sum. Porro plantæ nonnullæ, aromaticæ potissimum, putredini obfistunt, ut chamæmelum, valerianæ radix *l*\*), potenter; & quam cortex peruvianus, fortius; & arnicæ pariter *l*\*\*)) potens radix, & camphora: sed etiam cortex peruvianus, qui adstringens sit, est inter meliora antiseptica;

*t*\*) ROEDERER *de bile.*

*y*) *adde* YPEY l. c.

*y*\*) YPEY. *y*\*\*\*) Idem.

*z*) Idem.

*b*\*) Huc spectat not. *z*) p. 90.

pag. 90 not. *d*) *adde* & in *edit. oper. gall.* II. p. 226.

*i*\*) MESNY cet.

*k*\*) MESNY cet.

*l*) Idem.

*l*\*) DRESKY *de valeriana.*

*l*\*\*\*) COLLIN *de arnica.*



tamen ut acori minerali cedat *l\*\*\*)*. Princeps etiam inflammabilium alcohol putredinem avertit, minus tamen quam vitrioli acor. Aqua mineralis *l\*\*\*\*)* Neuwholtensis putredinem penitus impedivit. Debiles sales medii *l\*\*\*\*\*)*, muria marina, sal ammoniacalis multa aqua dissolutus, corruptionem potius augment. Majori copia impedit, & melius nitrum.

pag. 91. l. 16. *post* percellit *adde* ad pyrethri modum

ibid. l. 17. *post* producit *adde* In sepia, gelatinoso animali, succus acris & igneus.

ibid. l. antepen. *adde* Scorpii venenum acre est. Muscæ ichneumones suo liquore sabulum in pastam resolvunt.

p. 92. l. 3. *post* gignit *adde* Liquor vesicularum bombycis cum acore vivide fervet *x\*)*.

ibid. l. 10. *post* tinctum esse *adde* & linguam inflammasse.

ibid. l. 12. *post* fit *adde* & denique hujus succi natura venenata multo subtilior est, cum in lingua insipidus videatur; ut omnino non acrimonia sua nocere videatur, sed vi stupefaciente, quæ irritabilem vim partium corporis humani destruit *a\*)*.

ibid. l. 17. *adde* Fæces columbinæ odore suo oculos humectant, & sale albo penetrabilis odoris *d\*)* teguntur.

p. 93. l. 15. *post* pertinet *adde* Aqua cum muscis vulgaribus digesta manifesto acida est.

ibid. l. 18. *adde* Nullum in progressu putredinis acorem generari *Georgius PEARSON n\*\*)*.

Utcunque ista sint, in humoribus nonnullis, juniorum cet.

ibid. l. penult. *post* solet *adde* Succus folliculi dentium, & succus viscidus ex nervis boum, chartam cæruleam rubro colore tingit *p\*)*. Caro vitulina, cum pane & saliva contrita, incipit vinosum spargere odorem; neque putrescit, nisi quarto die *p\*\*)*.

p. 94. l. 6. *post* indolis *adde* Denique non semper, sæpe tamen, inque omnibus Cl. COLLINI experimentis, in principiis putredinis aliqua, non duratura,

*l\*\*\*)* DARCONVILLE *sur la putrefaction*, COLLIN.

*l\*\*\*\*)* RUTTY

*l\*\*\*\*\*)* huc spectat not. l) pag. 91. Ceterum notæ i) & k) mutandæ non sunt, l\*) vero & l\*\*\*) delendæ.

*x\*)* Comm. Acad. Bon. T. V. P. I. p. 44.

*a\*)* FONTANA *de viper.*

pag. 92. not. u) *adde* & nuper a PIMPIOLO.

*d\*)* MASSAC *engrais* p. 14.

*n\*\*)* *de putredine*, Edimbourg. 1774

pag. 94 *ad verba* ex adipe fit lin. i. in textu *adde* not. r\*) *Hist de l'Acad.* 1759.

*p\*)* JOURDAIN p. 112.

*p\*\*)* MESNY apud TARGIONI p. 115.

signa acidæ degenerationis se offerunt; ut præcedat acor, aliquamdiu cum putredine partitas vices teneat, & ab ea denique superetur *y*\*). Memini Leidæ, cum paucis cadaveribus avare uteremur, musculos viscorem concepisse cum acido manifesto odore. Solet autem acor, qui putredinem præcedit, ingratus esse, & id habere a vero acore diversum, qui grato est odore & sapore; videtur enim in animali putrescente rancor corrupti olei se cum evoluto acido conjungere.

Denique fortissimi acoris exemplum Cl. CADET habet, cum liquor putrescentis in plumbeo sarcophago cadaveris plumbum eroserit, & cum eo in saturni saccharum abierit *y*\*\*). Ea observatio posset forte efficere, ut CEZANIO crederem *y*\*\*\*), qui venereum tabum acidum facit, ut violaceos succos rubefaciat.

pag. 94. l. ult. adde Acorem autem adulta putredo destruit, sanguis putridus ossa non solvit *f*\*\*\*).

p. 95. l. 2. Unico verbo liceat monuisse, odorem lege THEOPHRASTUS negaverat, ullum boni odoris animal dari, & certum est, odores

ibid. l. 9. post acquirunt adde & foetidum didelphidis unguentum. Vulgo etiam bubulum stercus, in agros lætaminis loco sparsum, sub brumam, mense decembri, sereno sub coelo, gratum moschi odorem spargit. Urina siccata, cum odore grato, vehemente igne, salem dat ammoniacum; & paulo post phosphorum *h*†). Huc etiam upupæ moschatum odorem refero, quæ ex stercore humano infecta quæritat, & cujus caro inedulis est ob moschi fortem odorem *h*††).

ibid. l. 12. Infecta paucula exstant, quorum odor placet lege Frigida animalia aliqua moschi sunt odore \*); sic crocodilus, qui suo moschi odore late aquas imprægnat \*\*). Infecta etiam aliqua grato sunt odore, ut capricornus *i*),

*y*\*) COLLIN de arnica.

*y*\*\*) In N. E. N. C. vol. IV.

*y*\*\*\*) Manuel antisypphil. p. 205.

*f*\*\*\*) PRINGLE Essays phys. and litterar. III. p. 253.

*h*†) de MACHY Inst. Chem. T. I. *h*††) SALERNE ad RAI ornitholog. 121.

Not. *h*\*) & *i*) deleantur, cum ipsi textui insertæ observationes, libri vero ad notas \*) & \*\*\*) relati in nova editione sint.

Ad verbum aves in textu lin. 10. adde not. *h*†\*) Gallinæ tamen species moschi odore OVIEDO Summar. c. 11. Insecto-theol. II. p. 110. CARDAN. variet. p. 169.

*h*\*\*) adde de leonis proprio succo, qui in aliis quadrupedibus fæteat TYSON ap. LEWTHERS abridg. II. p. 283. Simia moschum olens CARLI relat. d'un voyage. Fuerit simia Mandril. BUFFON vol. XIV.

\*) ROCHEFORT antill. p. 224. CHARLEVOIX S. Domingue I. p. 27.

\*\*) ROCHEFORT ib.

*i*) Car. de GEER V. p. 64. hujus odor digitis adhæret.



alia scarabæi species *i*\*) meloë violæ odore *i*\*\*), formicæ aliquæ *i*†), insectum in hyoscyamo habitans *i*††).

pag. 95. l. 13. *adde* Liceat interim de nonnullis peculiaribus & efficacibus odoribus aliqua prælibare, qui de animalibus spirant, deque homine. Bufones, serpentesque, quando irascuntur, alliaceum alii, alii ambrosiacum odorem spargunt; neque forte alia vis est, qua vipera caudifona bestiolas incantat, quæ propius ad eam accesserunt.

Deinde etiam in homine moschatus odor nonnunquam percipitur; non raro in me ipso, cum mediocri & grato fudore leviter maderem, eum percepi, tum in febribus ad crisin compositis.

p. 96. l. antepenult. *post* globulus *adde* suæ naturæ.

p. 98. l. 16. *post* exhalant *adde* In 24 semunciis aquæ semunces 21 HEUERMANN.

p. 99. l. 2. *lege* Infra

ibid. l. 16. *lege* cum ad 118 sanguinis drachmas, alii 117 drachmas aquæ, alii non supra 80 habeant \*).

p. 100. l. 9. *lege* supra 107 partes in 120 x).

p. 101. l. 9. *lege* ascendisse

ibid. l. 21. *lege* coëgeris

p. 103. l. 18. *lege* fere

p. 104. l. 17. *adde* Cl. SPIELMANNUS ab aqua non separatim reperit duplicem spiritum, debiliorem & fortiorem, effecisse in sanguine venæ portarum fere  $\frac{11}{11}$ , in sanguine venæ cavæ  $\frac{1}{34}$ .

Tantam subtilitatem huius spiritus fuisse, ut de clauso vase totus evanuerit, VIEUSSENIUS in opere posthumo. Quod Cl. ROBERTI experimento paulum fidei addit, qui eandem adipi humano ad evaporandum facilitatem fecit.

p. 105. l. antepen. *post* aberrat *adde* SPIELMANNUS falis volatilis ammoniacalis in sanguine venæ cavæ reperit fere  $\frac{1}{430}$ , in sanguine venæ portarum omnino  $\frac{2}{35}$ ; sed hæc ab alia portione falis fluidi fere compensantur.

p. 107. l. 11. *post* manifesta est *adde* ut mirer, potuisse negari *k*\*), cum serum

*i*\*) FABRICIUS in *entomolog.* p. 72. & KOELREUTER p. 9. CASTELL.

*i*\*\*) KOELREUTER *ins. coleopt.* p. 42.

*i*†) LISTER.

*i*††) Aromatico odore BIRCH II. 483.

pag. 95. not. *k*) *adde* in opere *des maladies internes*, T. I.

\*) Typographi error haud dubie hic subest; ego eos, qui in veteri editione prostant, numeros retinendos censeo. *Not. edit. huj. auct.*

*k*\*) Non magis, quam lympham, inflammabilem esse partem colorantem, BUTT, p. 51.

inter & globulos repulsio locum habeat *k\*\**). Si globuli ægre cum oleo miscentur *k\*\*\**), figura eorum constantior ab oleo destrui noluerit, neque globuli se in tenacem liquorem perinde facile diffuderint, ut in aquam.

pag. 107. l. 18. *adde* Ejusmodi etiam ruber pulvis in arteria vivi animalis ex arefacto sanguine nascitur.

p. 108. l. 10. *lege* septuplam

ibid. l. antepen. *dele* Partem  $\frac{1}{32}$  sanguinis effecit in VERDUCII experimento *d*).

p. 110. l. 4. *lege* cohobetur & *adde* five demum, ut nunc simplicius fit, bonum habeatur, cavendo unice, ut primum, quod ascendit, limpidum seorsim fervetur, id certe oleum, deposito cet.

p. 111. l. 17. *post* five  $\frac{1}{5}$  *adde* Ex sanguine venæ cavæ carbonis habuit  $\frac{1}{14}$  idem; & ex sanguine venæ portarum  $\frac{20}{135}$ , five plus  $\frac{1}{7}$

p. 112. l. antep. *post* eluunt *adde* Cl. ROUELLE natrum facit, five minerale alcali, quod cum acido vitriolico salem mirabilem GLAUBERI constituit *z*\*).

ibid. l. ult. *post* vestigia *adde* non in hominis verum solius sanguine, sed etiam in animalium succis, quæ nunquam marino utuntur sale.

p. 113. l. 12. *post* varietas sit *adde* STORMIUS  $\frac{1}{60}$  reperit.

p. 116. l. 5. *adde* Cl. NAVIER spiritum etiam putrescentium partium animalis acida naturā imbutum reperit.

ibid. l. 8. *lege* vitriolici aut proprii ingenii

p. 117. l. 9. *adde* Non dissimula ridebet, Ill. SPIELMANNUM nullam acoris mentionem facere, quem in sanguine viderit

ibid. l. 12. *post* effervescit *adde* & cum spiritu nutri fumante.

p. 118. l. antepenult. *post* lumbricis *adde* in bombycum acri liquore

p. 119. l. 5. *post* WIDMER *adde* In carbone calcinati sanguinis, ferri aliquantum SPIELMANNUS vidit.

p. 120. l. 3. *post* restituit *adde* De vitriolo cupreo dissoluto sanguis cuprum præcipitat, quod non potuit, nisi ab admisto ferro, fieri.

ibid. l. 11. *lege* parcius

ibid. l. 12. *post* piscibus *adde* in ovi vitello nulla (uti neque fixum alcali) *e*\*).

ibid. l. antepenult. *lege* terræ ferreæ

p. 121. l. 15. de aëre *lege* aër de sanguine

ibid. l. ult. *adde* In aliis etiam humoribus reperitur. Valde spumat in spatio

*k\*\**) Idem p. 50.

*k\*\*\**) Ibid.

*z*\*) *Journal de Medecine, Chirurgie, Pharmacie &c.* 1773. Juillet.

*e*\*) *De MACHY Instit.* T. I.



inani urina & succus amnii ; in albumine multus est ; ex sanguine difficulter prodit MUSSCHENBROEKIO teste s\*)

pag. 122. *Paragraphus quadragesima quinta in nova editione* Alia experimenta inscripta est, & sic orditur: Nuper, postquam chemia nostro ævo in Gallia propius ad perfectionem accessit, Cl. ROUELLE s\*\*) junior aliqua de vario sanguine docuit. Distinxit in carbone sanguinis, natrum sive alcali minerale, salem marinum, salem febrifugo SVLVII similem, terram animaleam, terram ferri, carbonem, alcali fixum, ea ratione, ut partes ejus alcali essent 28. 29. ad salis neutrius 16 & 17.

Ex lixivio obtinetur sal marinus, sal febrifugus, natrum, quod basis est salis marini. Post has lotiones in cineribus terra animalis est, carbo, & multum puri ferri, a reliquis elementis & a terra animali separatum, a magnete attrahitur, aut si renueret, attrahitur addito phlogisto.

Sanguis bubulus dat natrum, salem marinum, perpaucum febrifugum, terram animaleam, paulum carbonis, & ferrum. Portio alcali fixi æqualis portioni salis neutrius.

Sanguis equinus similia dat, verum salem febrifugum ; alcali vero fixum, quam neutri sales copiosius, æqua cum marino copia, ut & 19. 20. ad 11. 12. fixi salis ad neutrum.

Sanguis vitulinus idem, sed sal febrifugus paucior ; alcali fixi partes 14. 5, neutrius salis 11. 12.

Deinde peculiariter in ovillo sanguine sales reperit eosdem, paucissimum febrifugum, neutros sales æquales alcali fixo.

In sanguine porcino plus febrifugi salis quam marini, & neutri sales æquales alcali fixo. Sanguis porcinus & asininus plurimum salem dant.

Sanguis caprillus carbonem habet difficulter calcinabilem.

Apparet animalia nullo utentia marino sale, tamen eum in sanguine alere, cum nullum salem vegetabilem idem sanguis suppeditet. Necessè est ergo, ut vita animalis naturam vegetabilem totam mutet.

Apparet etiam, satis insigniter sanguinem diversorum animalium differre, quorum tamen idem fere alimentum est.

Ex lacte equino verum inflammabilem cet.

ibid. l. 6. *dele* Elementum electricum in sanguine ---- pluvia inde lucida exit,

s\*) *Introduçt.* p. 88.

s\*\*) *Journ. de medec. &c.* 1776. Juillet.

## S E C T I O III.

## S E R U M S A N G U I N I S.

- P** ag. 122. l. 12. flavum *lege* subflavum  
 p. 123. l. 10. *post* 551. *adde* In Hibernia, humida insula, id pondus per fe-  
 brem minus augeri auctor est Cl. RUTTY, ut serum in febre sit partium in  
 Hibernia 10369, in Anglia 10408.  
 p. 124. l. 2. *lege* In sanguine cruorem, lympham coagulabilem, & aquam non  
 coagulabilem distinguimus o\*)  
 In fero aquam perpetuo &c.  
 ibid. l. 22. *post* 150. *adde* 160 y\*)  
 p. 125. l. 7. *adde* Accuratus Cl. BUTT cogi filis exortis, & una plurimum  
 exhalare.

Angli nuperi duas in fero partes distinguunt, quæ alio & alio calore co-  
 gantur; lympham, quæ 114mo, 120, & 140 c\*) gradu Fahr. coëat; & se-  
 rum, quod 150, aut demum 160 c\*\*).

Cum vero nullum aliud signum discriminis addant, videtur alia pars feri  
 sanguinis plenior fuisse aqua & difficilior coagulabilis c\*\*\*); alia vero gela-  
 tina magis abundasse, ut minori calore coiverit c\*\*\*\*).

Jam Cl. BUTT in eo fero partem aquosam, salinam, & acrem distinxerat,  
 a coagulo diversam, quod insipidum sit c\*\*\*\*\*), serum in fila concrefcere,  
 non ita lympham c†), laxiori esse compage c††), & plurimum exhalare, a  
 drachmis 25 ad duas cum semisse c†††).

Quæ omnia videntur eo redire, ut serum pro lymphâ habeat, aut potius  
 feri partem c††††), a qua fibræ sunt, cum parte lymphæ coagulabilis mi-  
 stæ. Ita Cl. HEWSON. Serum suum idem cum lymphâ facit Cl. BUTT c†††††).

not. t) & u) p. 124. deleantur.

o\*) BUTT p. 22.

pag. 124. *ad* BOHNII nomen in textu lin. 9. *adde* not. p\*) Materies albumini analoga BUTT  
 p. 96.

y\*) Ita HOULSTON, qui negat prius cogi aut gradu 150 inflamm. p. 12. In fervida LASSUS  
 lymph. p. 8.

c\*) HOULSTON inflamm. p. 12.

c\*\*) Idem ibid.

c\*\*\*) l. c. p. 53.

c\*\*\*\*) Ib. p. 87.

c\*\*\*\*\*) p. 26.

c†) Ibid. c††) p. 30. c†††) Ib.

c††††) Ibid. c†††††) p. 33.



- pag. 125. l. 20. *lege* ut per solida vasa ruber cruor sibi vias aperiat *k*).
- ibid. l. 21. *lege* operculi,
- ibid. l. penult. *post* claudit *adde* In ligato ductu thoracico lymphæ vivo in animali in gelu constitit.
- p. 126. l. 10. in variolis *lege* in hæmoptoe *u*<sup>\*\*\*</sup>), in spasmo maxillæ,
- ibid. l. 11. in maligna febre *a*) *lege* in malignæ febris *a*), & variolosæ primis diebus, in ipsa etiam flava febre, in phthisi, non alias pertinacior, ut etiam in quinquagesima venæ sectione crusta sanguini innataverit, demum in hydrophobia *b*), in hominibus ab hydrargyri usu salivationem patientibus *b*<sup>\*</sup>), in ipso scorbuto *b*<sup>\*\*</sup>) passim reperitur cet.
- ibid. l. ult. *post* abest *adde* & demum in sano homine *c*<sup>\*</sup>) non raro apparet.
- p. 127. l. 5. *post* crustam *adde* Sanguinem subito in locum valde frigidum missum crustam negat habere idem Cl. de HAEN. Sic etiam Cl. HAGUENOT in eadem venæ sectione sanguinem primum fluidum, alterum, tertiumque corio tectum vidit, inde denuo fluidum; & longe trajectum per aërem fluidum fieri. WEBERUS nullam nasci crustam, si parvum venæ vulnus fuerit *f*<sup>\*</sup>), aut sanguis lente moveatur *f*<sup>\*\*</sup>), aut sanguis bacillo agitur *f*<sup>\*\*\*</sup>).
- ibid. l. 11. *lege* manifestis
- ibid. l. 12. *lege* partem
- ibid. l. 15. *adde* recte cum reticulata lymphatica placenta, in qua globuli stagnant, Cl. HEWSON.
- ibid. l. 16. *lege* Deinde valde probabile est, a vehemente cet.
- ibid. l. ult. *post* pulsus est *adde* tantumne febris de genere sit putrido maligno, a qua *u*<sup>\*</sup>) crusta abfit, & sanguis dissolvatur *u*<sup>\*\*</sup>).
- p. 128. l. 11. *adde* Manifesto demum mihi videtur, crustam pleuriticam serum esse, cujus vis attractilis ita aucta sit, ut serum ad serum vehementius adhæreat, a cruore minus trahatur *d*<sup>\*\*</sup>), quoad solum serum secedendo grumum deferat, & ex natura sua coagulabili in crustam consistat.

pag.

pag. 126 *ad verbum* idem in *textu* lin. 6. *adde* not. *t*<sup>\*</sup>) LIND *fever infect.* p. 283.

*u*<sup>\*\*\*</sup>) *adde* WEBER *Auszüge aus Disputat.* I.

*b*<sup>\*</sup>) LETTSOM *Dispens.* p. 215. WEBER *Auszüge aus Disputationen* I.

*b*<sup>\*\*</sup>) *Medical Transactions*, Vol. II.

*c*<sup>\*</sup>) BUTT p. 35.

*f*<sup>\*</sup>) *Auszüge aus Disp.* I. CARRERE *inflamm.* p. 61.

*f*<sup>\*\*</sup>) CARRERE *ib.*

*f*<sup>\*\*\*</sup>) p. 62.

pag. 127. not. *n*) a nova editione abest.

*u*<sup>\*</sup>) KIRBY *febre. malign.* 1774. 4.

*u*<sup>\*\*</sup>) *ibid.* p. 82. 83.

*d*<sup>\*\*</sup>) LIND *fever infect.* p. 283.

pag. 128. l. 17. *adde* Verum paucis ab antiis alia omnino sententia Anglorum Cl. DAVIES, HEWSONI, & aliorum, e diametro priori contraria. Crustam nempe pleuriticam fieri a dissolutione sanguinis, quæ ipsa sit inflammationis effectus. Attenuatam lympham globulos nunc male sustinere, ut secedant, fundamque petant. In homine debili cum ipsa debilitate corium pleuriticum augeri. Eo mollius esse sanguinis coagulum, quo plus corii secessit, quod eo referas, duriora lymphæ, quam sanguinis, coagula esse *h*\*).

Ita cruor, qui sponte sua molliter cogitur *h*\*\*); nunc etiam mollior apparet, dum corium lymphaticum purum in tenacius coagulum abit.

ibid. l. penult. *post* cruore *adde* sed ex albuminoso liquore exhalante, & membranæ aquarum hydropicarum, & ligamenta vitiosa formantur, & MERRETI membrana oritur. Primus enim Vir Cl. partem sanguinis cet.

p. 129. l. 4. *adde* Liquor de cute exhalans, atque sub epidermide per vim emplastrorum vesicas cientium eductus, in crustam sæpe etiam coit, pleuriticæ similem *k*\*).

ibid. l. 8. *adde* & ipse PETITUS.

ibid. l. 11. *post* crusta *adde* siccata in elasticam tenacem membranam *n*\*), &

ibid. l. 14. *adde* Eadem crusta, ne res conjunctas separemus, in aqua, & in aqua nitrata vix dissolvitur, utique vero in spiritu alcalino volatili, & in sale lixivioso fixo. Sponte etiam sua deliquescit in foetidum oleosum liquamen, quod tamen naturam ab igne & ab acore meraco coagulabilem retinet *q*\*).

Puris a sero originem ita nuper deduxerunt Cl. viri, ut ex eo per putredinem generaretur, & sedimentum a sero puris simile subsideret. Contra ea Cl. HENDY a pure lympham suis notis distinxit; & mihi natura inflammabilis in pure nimis manifesta est, quæ a sero & a pleuritica crusta absit.

p. 130. l. 1. *post* cogi *adde* in ligato ductu thoracico collectam sponte in gelu coivisse; susceptam de vasculo lymphatico

ibid. l. 5. *post* peritonæi *adde* etiam ventriculorum cerebri *b*\*).

ibid. l. 9. *post* sapor *adde* falsus, & natura ab acore densabilis & cum vini spiritu *b*\*\*)

ibid. l. ead. *post* sunt *adde* Albumen ovi plurima etiam similia habet, minus tamen

*h*\*) p. 71.

*h*\*\*) p. 77.

*k*\*) HEWSON *inquir.* T. II.

*n*\*) LIND *fever infect.* p. 283.

*q*\*) GABER *misc. Taur.* II. p. 92.

*b*\*) LASSUS p. 21.

*b*\*\*) Idem ibid.



falsum est, minus, dum cogitur, de suo pondere amittit; cum acidis eadem patitur *b\*\*\*)*, neque a lymphâ coagulabili differt, nisi membranâ admistis & mitiori natura. Siccatum in friabilem succini speciem mutatur *b\*\*\*\*)*, & crustâ pleuriticâ simillimum est *b\*\*\*\*\*)*.

pag. 130. l. 11. *post* est *adde* & sponte in membranas præter naturam coalescentes abit,

ibid. l. 13. *post* corrumpitur *adde* ut vel totum renuat cogi, vel certe ejus pars aliqua ad ignem exhalet.

ibid. l. ead. *post* natura est *adde* Quin & ipse mucus cogitur, & asservatus per putredinem naturam coagulabilem totam exsistit, aut minorem retinet. Plasticam tamen *d\*)* indolem non continuo deponit, tunc etiam, quando foetet.

Video Cl. virum, quem plurimi facio, & merito, contraria omnino docere, ut pericardii humor in cane, & pectoralis vapor, & abdominis, ut recentissimus fuerit, totus exhalet *d\*\*)*, jam denique cum tempore coagulabilis fiat, & per quandam degenerationem *d\*\*\*)* Verum nimis certum, & ab omnibus receptum, lympham, serum, sanguinem, adipem, humores omnes animales, nullo excepto, per putredinem naturam coagulabilem exsistere, inque fluidam aquæ indolem transire; nimis manifesta est analogia liquorum exhalantium cum lymphâ; nimis certo ipse acore & vini spiritu ejusmodi liquores, & ipsum ovi colliquamentum, in quo fetus natat, in caseum coivisse vidi.

p. 131. l. 4. Sed eadem est porro lymphâ *lege* Non omnino eadem est porro lymphâ,

ibid. l. 7. contra a frigore *lege* superveniente frigore,

ibid. l. 9. *adde* Hanc gelatinam ex carnibus & ossibus extractam Cl. LASSUS experimentis subjecit. In frigore flexilis fit, & tremula, inodora, insipida, elastica, quæ, exhalante aqua, in durum corium abit. In fervida soluta, a solo spiritu vini cogitur; ab acido minerali solvitur, non ita ab oleo tartari. Multis adeo dotibus a lymphâ differt, admisto, ut puto, in ossibus oleo *m\*)*. Et a sanguine gelatinam abesse, & a solidis, mireris Cl. BUTT *m\*\*)* excidisse;

*b\*\*\*)* BUTT p. 37.

*b\*\*\*\*)* Bresl. Sammlung 1724. p. 27.

*b\*\*\*\*\*)* BUTT l. c. p. 29.

pag. 130. l. 11. *ad verbum* liquoribus *adde* not. *c\*\*)* LASSUS p. 21.

*d\*)* De HAEN.

*d\*\*)* COTUNN. *ischias nervos*. p. 23. 24. 25.

*d\*\*\*)* p. 23.

pag. 131. l. 5. *ad verbum* impertit *adde* not. *k\*)* Conf. BUTT p. 54.

*m\*)* p. 17. *m\*\*)* p. 51.

cum ex solidis quidem partibus manifesto educatur, manifesto pariter lymphæ & sanguinis & magnorum cavorum, in gelatinam sola ignis vi consistat. pag. 132. l. 8. *post* accedat *adde* cum acore ferveat, cœruleos plantarum succos in virides mutet,

ibid. l. 9. *dele* Dum putrescit ---- simile depōnit e).

ibid. l. 11. totam exsistit *lege* non continuo, etiam quando foetet e\*), sed tamen tandem totam exsistit,

ibid. l. 12. *post* cogatur *adde* Per febres alcalinæ naturæ propius accedit, deinde foetet, & cum acore fervet, demum in corium abit insolubile. Cum syrups cœruleis eo in statu virorem facit, & cum spiritu vitrioli fervet, equidem inter acidos liquores solo e\*\*).

p. 133. l. 2 *post* falsum fit *adde* inque febre flava profunde flavum p\*).

ibid. l. 7. *post* recente *adde* cruore serum jam

ibid. l. antepen. Aliquanto minor b) in sero copia est diluti muci, qui *lege* Magna pars sanguinis in universum mucus est, qui & cum lymphæ misceatur, & grumi portionem majorem efficiat b), in sero dilutius mucus,

p. 134. l. 1. *post* dixerunt *adde* Sanguine bacillis agitato, absque aqua & frigore, fibræ vasis parietibus adhæserunt c\*\*). Quare, si lymphæ coagulabili fibræ tribuantur c\*\*\*), de mucō, ejus lymphæ parte, intelligi debet. In ipsâ etiam lymphæ, aliqua ad fibrarum formationem adjuvandam, sed minor est aptitudo, si agitaveris; & vicissim ex sero virgulis agitato materies lymphæ similis separatur c†).

Hanc feri sanguinei partem suspicor ab Anglis a magis coagulabili lymphæ separari.

ibid. l. 6. *post* funditur *adde* Rete fibrosum, ramosum, cum multis particulis quadratis muriaticis sola exhalatione nasci vidit LEDERMÜLLERUS i†). Tardius putrescit, quam serum integrum i\*); ex cupro colorem cœruleum extra-

pag. 132. not. b) *adde* BUTT p. 33. COLLIN de arnic. exp. 4. MESNY apud TARGIONI III. Citius putrescere, quod rubore tinctum sit HENDY.

ibid. not. m) *adde* HENDY.

ibid. l. 7. *ad verbum* foeteat *adde* not. b\*) Intra 2. 3. diem BUTT p. 26.

e\*) Nondum die 2. 3. BUTT p. 26.

e\*\*) LASSUS p. 12.

p\*) LIND fever infest. p. 198.

b\*) MOSCATI nuove esper.

c\*\*) MOSCATI, BUTT p. 4.

c\*\*\*) BUTT p. 30.

c†) BUTT p. 23.

i†) Mikroskop. Ergöz. II. p. 78.

i\*) BUTT p. 57.



hit; ab alcali fixo contrahit odorem falis volatilis *i\*\**), & ab acore vitriolico admisto muriaticum odorem spargit secundum Cl. BUTT de suo sero *i\*\*\**) dicentem, quæ, puto, ad mucum pertinent. Verum de mucō alias fusius dicetur.

pag. 135. l. 1. nitri oleo *lege* nitri spiritu  
ibid. l. 5. *post* resolvitur *adde* & cum calcis aqua *x†*), & cum alcali volatili *x††*), & ab alcali caustico *x†††*).

ibid. l. 11. *post* meraco *adde* & minerali *b†*)

p. 136. l. 10. *post* dissolvit *adde* & corium pleuriticum.

Albumen, caseum, ab oleo tartari resolvi LEVRETUS; hinc impedire, ne albumen coctum durescat; chalazas vero indurare, quod improbabile. Albumen cum acore vitriolico fervere & cogi; etiam cum succo citri nasci filamenta; in alcali volatili difficulter solvi LASSUS *r†*).

p. 137. l. 6. *adde* Lympha de vasis suis secreta ab acore meraco parum cogitur,

Aquæ abdominalis similes omnino sunt dotes, plus tamen creditur habere partium gelatinosarum & in corium transeuntium.

p. 138. l. 18. *adde* Liquorem flavum, in quo oleum nigrum empyreumaticum, & acor; tunc alcali volatile ascendere; carbonem porosum superesse; eum ex lixivio dare salem subfoetidum; caput mortuum cum acido non fervere LASSUS.

ibid. l. 22. *adde* Cl. ROUELLE, abacta aqua, de sero sanguinis siccam fragilem massam vidit superesse; in ea natrum reperit, & cum acido vitriolico Glauberianum salem composuit.

ibid. l. 24. *post* repertæ *adde* vel concrementa salina feri sanguinis.

ibid. l. ult. *adde* Salem marinum exhalando natum diximus *i\*\*\*\**).

*i\*\**) BUTT p. 57.

*i\*\*\**) p. 55.

*x†*) LASSUS p. 9.

*x††*) Id. ibid.

*x†††*) BUTT p. 27.

pag. 135. not. *t*) lin. 1. *adde* LASSUS p. 89.

ibid. not. *b*) *adde* Leviter cogi cum acido vegetabili LASSUS.

*b†*) LASSUS p. 8.

*c*) *adde* BUTT p. 26 & at vitriolo

*g*) *adde* Solvi partem majorem ab acore vitriolico BUTT p. 26; ab acore falis non cogi Id. p. 27.

pag. 136. not. *n*) *adde* TARIN.

*r†*) p. 14.

*2*) *adde* Fortius, quam alia BUTT p. 28. & durescit.

*a*) *adde* LASSUS p. 9.

*i\*\*\*\**) LEDERMÜLLER II. T. 78. *Mikrosk. Ergöz.*

pag. 139. l. 21. *adde* Serum putrescens absque intestino motu naturam generat alcalinam, ut die trigesimo spiritum fetidum alcalinum fundat  $\approx$ †), totum ipsum alcalinum  $\approx$ ††).

ibid. l. ult. *lege* aut potius majorem, & *adde* Serum minus putrescere  $d^*$ ), minus dare alcalini liquoris  $d^{**}$ ).

## S E C T I O IV.

## ELEMENTORUM SANGUINIS PROPORTIO ET UTILITAS.

**P**ag. 140. l. 8. *post* præterea *adde* phlogiston &  
p. 142. l. 2. *post* sublata sunt *adde* Alterum certum plethoræ exemplum est in hominibus, quibus magni artus amputati fuerunt. His enim, cum ventriculus & viscera ciborum coctioni destinata nihil passa sint, plus sanguinis generatur, quam in receptaculo sanguinis sive in vasorum universitate possit contineri. His frequens est necessitas venæsectionis & dissiliientium vasorum periculum.

ibid. l. ult. *dele* cor magnum

p. 143. l. 11. *post* indoles *adde* & meticulositas, & teneritudo

ibid. l. 12. *post* supervenit *adde* & frequentia exempla febricitantium, scabiosorum, scorbuticorum, etiam hecticorum, victu vegetabili reparatorum  $n^*$ )

ibid. l. 19. *adde* & stupiditatem inoculatum venenum febrile superavit.

Acrimoniam variam, etiam muriaticam, in nostris humoribus BOERHAAVIUS agnovit. Et videtur certe victus falsus in scorbuticis acrem sanguinem generare, putredine equidem admista corruptum. Acris sudor fuit, & retenta urina, cum falsus humor in sanguine nimium abundaret, qui solebat per renes deponi. Acrimoniam salis nimii, equidem medicati, me in me ipso percepisse, alias retuli.

ibid. l. antepen. *dele* sudor & aqua, & *lege* uberior urina

$\approx$ †) COLLIN *de arnic.* p. 9.

$\approx$ ††) LASSUS p. 12.

$d^*$ ) COLLIN *exp.* 15.

$d^{**}$ ) Id. *exp.* 16.

pag. 140. lin. ult. *ad verbum* fluat *adde* not.  $p^*$ ) *Journal de Medecine* 1771. Juin.

$n^*$ ) Phthisis antiqu. BAEK *chron. sjukdom* p. 16. pane triticeo & lacte folis scorbutus *Med.*

*Transf.* T. II. *le ROI de scorbuto.*

pag. 144. not.  $s$ ) *adde Journal de Medec.* 1770. Juin.

pag. 145. not.  $c$ ) *speçtat ad verbum expurgent in textu* lin. 18.

pag. 146. l. 17. *ad verba* auctum est *in textu* *adde* not.  $h^*$ ) Vide Lib. XXX.



- pag. 143. l. ult. *adde* Lympha tenuior in cane sola aqua & pane pasto, experimento a RIVINO facto.
- p. 148. l. 12. Sed etiam ægre aliqua--- cum timidissima ove conveniat *lege* Eodem cum pabulo diversa animalia, herbivora omnia, sanguinem aliuni & alium generant *p*), etsi discrimen vix oculos attingit.
- ibid. l. 22. & aut ab opio *lege* aut ab opio enecta *s\*\**) nullum in mamma cancroso, inque carne bubula subiecto igne torta
- p. 149. l. 16. *lege* cum plano eam secante
- p. 150. l. 1. *post* conjungitur *adde* Etsi enim ante rubri sanguinis ortum commoveri non negaverim *c\*)*, certum tamen est, multo alacrius idem salire, postquam sanguinis is color est *c\*\**); certum etiam, cum ea sanguinis dissolutione, quæ a febribus sequitur, magnam virium diminutionem conjungi.
- ibid. l. 9. *post* nascitur *adde* Indis carnis victus expertibus, debilibusque in summo coeli æstu manus perpetuo frigent *d\*)*.
- p. 151. l. 13. *adde* Non oportet hic dissimulasse, dari rubri sanguinis cum robusta febre conjunctionem, quæ temperamentum pariat athleticum; dari vero & alium rubrum sanguinem, quem putes a solo oleo attenuato floridum reddi, & cum debili fibrarum vitio conjungi. Hystericis feminis sanguis floridus, & tamen parum est virium, ut sanguinis missio noceat *n\*)*
- p. 152. l. 16. *post* eam *adde* aquam
- ibid. l. 22. *adde* Denique satis nunc consentitur, ruborem sanguinis a ferro esse. Plurimum utique ad colorem confert oleum, sive cet.
- p. 155. l. 11. *post* constituunt *adde* & per pulmones, & per cutem,
- p. 156. l. 14. *adde* quam naturam alcalinæ vicinam, sponteque in putredinem vergentem, nuperorum Cl. viro-um, & principis BECCARI, olim nostri præsidis, industria in farinâ cereali detexit.
- ibid. l. 19. ut tamen in hoc exemplo ---- huic gelatinæ accedit *o)* *lege* mucoso-gelatinosam materiem ex rapa & brassica plurimam haberi Cl. THOUVENEL *o)*, & alioquin a muco ad lympham gelatinosam non maxima est diversitas *o\*)*.
- ibid. l. penult. *adde* in adipe omnium potentissima *p\*)*. Oleum tamen émpy-

*p)* ROUELLE p. 212. 213.

*c\*)* R. COCCHI *lezion. ffs. anatomiche*.

*c\*\*)* CHIRAC *advers. anat.* p. 320. Negat prius moveri.

*d\*)* IVES *Reisf.* I. p. 86.

*n\*)* FASAN. *febr. epid.* p. 213.

*o)* Idem ibid.

*o\*)* BUTT p. 61.

*p\*)* HEWSON *inquiries*, p. 127.

reumaticum animale cum vegetantium empyreumatico oleo non undique convenire NEUMANNUS monuit, ut istud quidem ad cœruleum Berolinense parandum ineptum sit *p\*\**). Nam oleum animale utique paulo minus acidum esse suspiceris, & cum uberiori sale alcalino volatili subactum.

pag. 157. l. 12. *post* suppleditur *adde* Sic succi animales longo vitæ ulu per vasa circumacti, alcalinis eo propiores fiunt, quo in duriores partes coeunt. In succis animalium acoris est vestigium; nullum in ossibus, aliisve firmis partibus. Sic mira metamorphosi e vegetabili victu animalia tamen minerale alcali pro basi salis neutrius in sanguine dominantis parant *t\*\**).

Phlogisti in naturam electricam transmutationem tetigimus *t\*\**).

ibid. l. antepen. *lege* Ea terra ex vegetabilibus recepta,

*p\*\**) T. I. P. 2. p. 350.

*t\*\**) vid. Sect. II. §. XL.

*t\*\**) vid. *Austar.* ad Lib. V. Sect. II. §. IV\*. p. 20.



# ELEMENTORUM PHYSIOLOGIÆ

## LIBER SEXTUS.

### ARTERIARUM ET VENARUM OFFICIA.

#### P R Æ F A T I O.

**I**N libro, quem hic offero, plurima ratiocinia sunt, experimentorum aliquantum. Prioribus detrahare maluissim, quam addere quicquam; minus enim illæ *BELLINIANÆ* theoriæ valent, quibus in Anglia mascula & hypothefibus pene libera confilia ad medendum successerunt, felici certe rerum conversione facta. Alibi confusa theoria dominatur, in qua exclusis certissimis experimentis occulta potestas substituta est, & evidenti sensuum testimonio semiveræ observationes præferuntur; eodem tempore, quo iidem medici clamant, debere bonam artem omni hypothefi liberam tradi.

Quæ in hoc libro, & inprimis in hac editione, aucta extant, ea hic breviter recenseo, ut, quid lector sperare possit, facilius perspiciat. Retardationem sanguinis in vasis minoribus minorem esse per experimenta reperi, quam ex calculis positis sequatur; aliquam tamen esse non repugnat. Cur autem experimenta a calculis diffideant, partim in minori efficacia causarum retardantium quæri debet, partim in nova subnata velocitate. Eo vis contractilis arteriæ hactenus pertinet, ut certe compenset motus progressivi jacturam, qui in lateralem abierat; de progressivi enim motus velocitate quæritur. Vim derivationis pene novam, præter *HEYDII* experimenta, hic exposui. Deinde atriola mortis, ad phænomena manantis sub microscopio sanguinis, descripsi. Ea vir alioquin *Ill.*, qui pleraque mea pericula suis confirmavit, negat se annotasse. Reperio autem, & ipsum vidisse, & me toties repetiisse, ut dubium omnino nullum mihi de his mortis nuntiis superesse possit. Motus in sanguine, post mortem animalis cordisque quietem superstitis, causas & phænomena addidi.

Inde pressionem lateralem, per experimenta evictam, a *WEITBRECHTI* aliorumque dubiis vindicavi. Hic idem pulsus est, cujus phænomena & mensuras, numerosque inprimis, pro varietate humanæ conditionis varios, ad mea adversaria recensui. Nimias illas pulsus frequentias non potui cum meis experimentis conciliare, deque *Theophili de BORDEU* nuperis pulsibus malui ampliare. Inter effectus motus sanguinis potissimum calorem recensui, quen.

cum multi nuperorum ad chemica phænomena referant, ego quidem potissimum ab eo motu oriri, libratis utriusque causæ argumentis, persuadeor. Ad ruborem etiam facere non dubito, etsi in ipsis etiam sanguinis elementis ejus coloris causa ponitur; neque hactenus video, aëri posse acceptum referri.

Demum venosi sanguinis motum, undique neglectum, etiam ab Jatromathematicis, ad experimenta descripsi, & lateralem pressionem a venis non abesse ostendi. In eum motum magnam esse potestatem derivationis reperi. De ea vero ejusdem perturbatione, quæ a respiratione pendeat, iterum experimenta mea retuli, justoque dolori aliquot paginas dedi, quem non pati non potui, cum viderem, me post tot mea experimenta plagii postulari, aut certe ad repetitores alienorum laborum relegari. Res ipsa considerari meretur; etsi in vivo homine vix unquam locum habet, cum *Schlichtingiana* illa cerebri turgescencia, & alterna inflatio, duram matrem a cranio solutam, aliasque conditiones poscat, quæ a vivo homine absunt. Celeritatem sanguinis venosi, ad arteriosi sanguinis velocitatem comparatam, me facillima mensurâ metiri posse speravi, cum sit non dubie in ratione inversa luminum venarum cavarum ad aortæ lumen. Denique cur venæ alterno motu non agitentur, conatus sum exponere.

Bernæ, d. III. Mens. Sept. clocclccLXXVII.

## S E C T. I.

### SANGUINIS MOTUS QUI AXIN SEQUITUR ARTERIÆ.

- P** Ag. 158. l. 2. *lege* perfici  
 ibid. l. 16. *adde* Ita vero velim, dum ista tracto, legi, ut potius studium mihi fuerit non omittere, quæ alii clari viri proposuissent, quam quidem ea docere, de quibus aliquid certi ipse statuam.  
 p. 159. l. 14. *post* BOISSIER *adde* quarta parte reliqua aorta latiore esse alii clari viri.  
 ibid. l. 17. *lege* quem tumorem  
 ibid. l. 20. *post* vidi *adde* In pullo, qui ovo continetur, hæc amplitudo adeo memorabilis est, ut eam ipsam MALPIGHIIUS pro sinistro ventriculo habuerit.  
 p. 160. l. 21. *lege* Ea

pag. 159. not e) lin. 3. *adde* in spinosus VICQ d'AZYR, *Mémoir. prés.* VII. p. 30.



pag. 160. l. 23. *adde* Ita & adulto homine; nam in fetu arcus aortæ magis transversus est.

p. 161. l. 1. *post* nata sit *adde* Imum crus ad originem aortæ inclinatur, ut ea fede arcus minor sit latitudo.

ibid. l. 14. *adde* In equo unus ramus, isque major & capiti prospicit, & brachiis, alter arcum facit, idem minor x\*\*\*)

p. 162. l. 4. *post* nascitur *adde* aut subclavia sinistra, pariter ut dextra, communem cum carotide truncum habet; aut unus duarum carotidum, & unus pariter duarum subclaviarum truncus est. Alias hoc ordine prodeunt: carotis dextra, sinistra, subclavia sinistra, arcus aortæ d\*). Sed & arteria thyreoidea, aut thymica d†), ex aortæ trunco d††) prodiit; alias aorta, insula facta e), duplicatum cet.

p. 163. l. 13. *adde* Sed lego etiam in plusculis animalibus dextram subclaviam majorem esse.

ibid. l. penult. *lege* majorum propaginum ultima t).

p. 164. l. 9. *lege* compositus motus

p. 167. l. 19. *dele* Verum idem propriam ---- per experimentum constitit t)

ibid. l. 25. *lege* Globulus tamen ruber axin tenebit, & longius &c.

p. 168. l. 12. *dele* Nunc, in exemplo, globulus ---- globosæ figuræ partes.

p. 169. l. 2. *lege* virorum

p. 171. l. 2. *lege* tympani membrana

p. 172. l. 25. *post* enim *adde* calor humidus.

p. 173. l. 15. *post* mutatur *adde* Hæc enim omnia & in vivis animalibus vidi; & injectio, quam vocant, arterias manifestas reddit, inque serpentinos flexus contrahit.

p. 176. l. ult. *lege* effluit

p. 177. l. 13. *post* diminui *adde* Vidit eadem Cl. SPALANZANUS.

p. 178. l. 18. *adde* Non debet autem certa mensura recipi portionis celeritatis, quam a frictione liquor quicunque amittit. Hæc enim omnia ex levore

x\*\*\*) La FOSSE Hippiatrique.

pag. 161. not. 2) lin. 5. *adde* HUBER sæpe; l. ult. *adde* Ita & HUBER tantum ut confluant p. 73.

pag. 162. not. a) *adde* Bis vidit Ill. HUBER *Act. Helvetic.* VIII.

ibid. not. f) *dele* Arteria thyreoidea ---- n. 7. p. 28. — lin. ult. *adde* Duæ carotides ex eodem trunco ERDMANN l. c. p. 5. 16. Nullus arcus aortæ POHL *obs. angiolog. de art.*

d\*) POHL *de arteriis.*

d†) MECKEL ibid.

d††) ERDMANN *arter. thyreoid.* T. II. f. 2. NICOLAI *diff.* n. 7. MECKEL ad me III. n. 141.

pag. 164. not. p) *adde* SCHREBER & MAK *de comparativa sanguinis in diversis vasis velocitate.*

vel asperitate vasis, & figura & longitudine, ex rectitudine & flexione ejusdem, ex visciditate aut limpiditate fluidi, ex celeritate impressa, & ex ponderibus incumben- tibus, mille modis alia fuit aliaque.

pag. 179. l. 13. *lege* admireris

ibid. l. 16. *adde* Hinc, ceteris paribus, quo remotior quæque pars corporis est a corde, eo lentior est motus, eo promptius restinguitur; & ex ipsa ratione distantiarum a corde ostendemus, sanguinem in moribundis in pede primum, inde in femore, porro in abdomine, demum prope cor, motum amittere.

p. 181. l. 2. *lege* paulo post dilatationem,

ibid. l. 15. *adde* Additur, minores arterias magis serpentino ductu ferri *m*\*)

ibid. l. 18. *post* tubis *adde* qui sint minimi,

p. 185. l. 8. *post* esset *adde* Gigantissæ *Magrath* pulsus non fuisse supra sexaginta lego.

p. 189. l. 23. *lege* innumerabilibus

p. 190. l. 6. *adde* Fuit, qui eum effectum rejecit, quod globuli sanguinei elastici sint. Verum is elater cum magna duritate conjunctus nondum demonstratus est, neque ab indole pingui globulorum expectari potest.

ibid. l. 13. *post* sanguinis *adde* progressivus

p. 192. l. 4. *lege* adhæreant.

p. 195. l. 12. quæ in calidis --- nequeunt *lege* quæ in pullis ovo contentis utique institui possunt,

ibid. l. 19. alio *lege* alterne

p. 196. l. 5. *lege* nullique

ibid. l. 17. *adde* Parvum etiam discrimen esse, quo velocitas sanguinis truncos percurrentis sanguinem per ramos fluentem superat, SPALANZANUS repetito experimento docuit; inque ipsis venis alias æqualem celeritatem vidit arteriæ suæ, alias parum minorem, ut per sistolen cordis arteriæ superare viderentur, per diastolen venæ. Neque dissimulari debet, ut certo plicæ videantur sanguinis motum tardare, in venis tamen teneri pulmonis animalium sanguinem expedite fluxisse *n*\*)

ibid. l. penul. *post* sanguinem *adde* in catellis

p. 197. l. 3. *adde* Carotidis arteriæ saltum ad septem pedes Cl. FRAIRIOT æstimat.

ibid. l. 23. unice *lege* tamen

ibid. l. ult. cujus *lege* qui

*m*\*) Ill. SCHREBER de compar. sanguinis in div. vas. veloc.

*n*\*) SPALANZAN. p. 59.



- pag. 198. l. 4. trunculorum *lege* trunculum  
 ibid. l. ult. *adde* in arteria, quæ in venam transit.  
 p. 199. l. 3. ostendimus *lege* probabile est  
 ibid. l. ead. *post* superesse *adde* In vivis tamen animalibus microscopium eam  
 potentiam non confirmat; ut neque coaguli efficaciam  
 ibid. l. 12. *lege* Neque tamen interim dissimulo,  
 p. 201. l. 10. *adde* Periculose sanguinem in venam cavam inferiorem subito  
 irruere, quando aquarum hydropicarum comprimens pondus per paracen-  
 tesin ablatum est, dudum est ostensum.  
 ibid. l. 24. *post* retardari *adde* Simillima horum Cl. SPALANZANUS vidit, fa-  
 vente pondere velocitatem in pullo auctam fuisse, qui ovo continetur, &  
 vicissim alias celeritatem a ponderis resistentia diminutam. In minimis etiam  
 vasis discrimen vix percipi posse *Idem*.  
 p. 204. l. 3. quatuordecim *lege* triginta tres  
 p. 205. l. 23. *lege* subsultantium  
 ibid. l. 27. *post* velocior *adde* Et si aliquando convulsio a læsa aut resecta spi-  
 nali medulla paulum sanguinis motum turbavit, quæ etiam Cl. SPALAN-  
 ZANI est annotatio, brevis tamen hæc fuit confusio, & continuo in ordi-  
 nem rediit *p\*\**).  
 p. 206. l. 12. *post* mutantur *adde* debiliter utique, cum pauci nervi plurima  
 cellulosa tela tegantur.  
 ibid. l. 24. hic tamen multa ---- carere non potest *lege* nempe contractilem vim  
 in arteria certam inesse, in ea vi aliquas esse partes meri elateris, qui a vita  
 non pendeat; aliquas videri fibrarum esse muscularium, neque nulla proferri  
 experimenta, quæ etiam irritabilem naturam arteriis inesse suadeant, quam  
 efficax stimulus scintillæ electricæ excitat. Inesse denique vis nervosæ tan-  
 tum, quantum a tenuibus fibris & tenerimis nervi expectari potest quos  
 plurima cellulosa tela velat.  
 Deinde arteriæ quæcunque sit vis contractilis, primas tamen cordis esse,  
 & ad ejus contractionem sanguinis motum pertinere. Nunc, quis sit in pro-  
 movendo sanguine contractæ arteriæ effectus, oportet disquirere.  
 p. 207. l. 2. mere *lege* mire & *post* intumuit *adde* inque varicem abiit, in qua  
 arteriæ pulsatio percipiebatur  
 ibid. l. antepenult. fit *lege* cogitari debet  
 p. 208. l. 9. *lege* Sed ea celeritas in sanguine posterius insequente majori ra-  
 tione decrescit perpetuo, donec cet.

*p\*\**) Sed confer. Lib. IV. p. 465.

pag. 209. l. 11. *ad verbum* edit *adde* not. *i\*\**) FONTANA *ricerche*, p. 103.

pag. 209. l. 3. quem *lege* quam

p. 210. l. 1. *post* arterias *adde* læsas.

ibid. l. 22. *adde* Sed neque Cl. SPALANZANUS in minoribus animalium vasis ullam contractionem vidit, aut dilatationem.

p. 214. l. 9. *post* dominari *adde* dictum est & *dele* vel ex iis exemplis---& inde natæ maculæ e).

p. 215. l. 14. *post* demferis *adde* Hæc phænomena omnia, perinde ut ego, ita Cl. vir Laz. SPALANZANUS vidit, causam perinde mecum ignorat.

p. 216. l. 20. *post* excitatur *adde* In frigidis nostris animalibus concussio ab irritata medulla spinali nata, solebat sanguini languenti aliquam velocitatem reddere.

Vasa rupta a vehementi nixu passim reperias apud SMETIUM. Sudor inde sanguineus. CAROLUS XI, cum amico ab urso periclitanti subvenire properaret, venam sibi rupit s\*).

p. 318. l. 7. aliquis *lege* aliqua pressio

ibid. l. 8. quoties *lege* quibus

ibid. l. 19. *post* increscunt *adde* dum frequentius & validius a sanguine venoso irritatur.

#### §. XLI\*. *Tonus*

Hanc causam motus possis addere ex STAHLII potissimum theoria. Humores nempe Cl. vir putabat non a solo corde regi; sed a constrictione spastica liberum com meatum impediende fieri, ut humores in partem ab anima destinatam colligantur. Eum enim motum non posse viribus arterioso sanguini communicatis tribui d\*\*).

Comparari posset effectus balnei frigidi, in quo ejusmodi convulsio universæ cutis, forte & muscutorum, locum habet. Ab eo enim balneo sanguinem in caput & cerebrum congeri, & apoplexiam non rarissime fieri, notissimum est. Hæmoptoë inde & universalis sugillatio d\*\*\*).

In hypothesei STAHLII veri quid superesse non recuso: si nempe pars cellulosa telæ aliqua durior, & ad elaterem & contractionem aptior, alia laxior, ad distentionem pronior fuerit; nihil repugnat, quin lente quidem, sed tamen perpetuo, pars illa prior se sanguine venoso depleat, arterioso a corde advenienti

pag. 210. not. n) *adde* LISTER *Journ. to Paris.*

ibid. lin. 19. *ad verbum* possunt *adde* not. t\*) Lib. II.

s\*) ROBINSON ibid.

pag. 218. l. 18. *ad verbum* ostendimus *adde* not. d\*) Lib. XI.

d\*\*) *Morb. spasmod.* 17. &c.

d\*\*\*) LIMBOURG *bains d'eau simple.*



resistat, ut demum ex lege derivationis, humorum pondus in eam corporis partem ingruat, in qua major partium solidarum laxitas est.

§. XLI\*. *Nova dubia.*

Hæc cum scripisssem, morbusque meus aliquas fecisset inducias, ut limpidiori mentis usu fruere, denuo visum est, rebus rite expensis, ne in his quidem causis scaturiginem esse novæ celeritatis. Non in derivatione rara & quæ tamen latens videatur esse tonica contractio. Non in contractili vi, mortua, insita aut nervosa. Hæ enim vires omnes in subsidencia quidem arteriæ sanguinem comprimunt, ejus motui progressivo addunt. Verum omnes ex causæ in tempusculo paulo priori eandem celeritatem perinde, & eadem portione diminuerunt, ut nunc augment. Contra vim nempe cordis sanguinem agentis, arteriæ vis contractilis quæcunque se habet, ut contraria potestas. Eam cordis vis superat; sed ut superet, impendit vim æqualem præsentī vi contractili arteriarum. Erit adeo celeritas superstes sanguinis  $c - a$  (cordis celeritas diminuta contractione arteriosa). In proximo tempusculo autem contrahitur aorta ad eandem diametrum, ex qua per vim cordis dilatata fuit. Celeritas ergo sanguinis est  $c - a + a$ , nempe ipsa celeritas cordis nihil mutata, nisi portiuncula aliqua exigua vix definienda, quam frictio absumsit.

Quod ad musculos pertinet, eorum actio non penitus nihil poterit in celeritate sanguinis augenda. Venosum nempe non dubie sanguinem incitant, & pressionem suam unice contra cor dirigunt. Ducentibus valvulis sanguis ad cor celerius redux irritat id organum intra idem tempus, & pro ratione molis potentius & frequentius. Nova ergo hic vis subnata est, quæ prius nulla adfuit. Aliquam quidem partem hujus compressionis valvulæ absumunt, non tamen totam, tum experimento teste, & evidente caloris atque pulsus augmento per motum musculorum subnascante; præterea columnæ succedentis sanguinis valvulas sustinent; ipsaque figura cujusque venæ facit, ut pressio sanguinem facilius versus canalem majorem agat, minus vero contra angustam sedem venæ repellat *d\*\*\*\**).

pag. 218. l. 29. *adde* Cum plurima mecum verissime *Lazarus SPALANZANUS* viderit, valde miror, virum clarissimum hæc mortis atria rejicere, quæ ego adeo manifesto, adeo frequenter vidissem *d†*).

Mirabar merito: ipsum enim Cl. virum omnia, quam ego, pariter vidisse manifesta sunt testimonia *d††*).

*d\*\*\*\**) Lib. III. *d†*) Negat autem *fenomen*. p. 309. 312.

*d††*) Lentius moveri vidit *fenom*. p. 104. *Motus sanguinis* p. 37. Oscillare p. 27. 53. 76. 225. 302. *Mot. sangu.* 25. 33. quiescere & in motum redire *fenom* p. 27. 163. 221. *Mot. sangu.* p. 22.

Quare nihil in situ vitii fuerit, in quo animal speculatus sum; cur enim aliis in phænomenis, quæ L. SPALANZANUS suo assensu confirmat, similia eorum vidissem, quæ vir Ill. vidit?

pag. 219. l. 11. *post* ostensum est *adde* Vidit in canibus Cl. BOISSIER *b*\*).

ibid. l. 15. *adde* A retrocessione fit, ut in moribundis exteriora frigeant, & absque pulsu sint, dum prope cor calor superest, & pulsatio aliqua.

p. 220. l. 6. motu *lege* sanguine

ibid. l. 10. *post* redditur *adde* Utiliter Cl. FOUQUET in moribundo vidit, primum pulsum defecisse in poplitis arteria, deinde etiam in radio, dum fornicatio in corde supererat; & ea ipsa denique pulsatio morientem deferuit *p*\*).

ibid. l. antepenult. In GUILIELMO Ill. --- sanguis fuit *lege* Vasa ex febribus hecticis, ex ciborum defectu, ex diabete, aliisque causis inanita passim legas, & arteriam cuniculi exsanguem, cum ossea facta esset.

ibid. l. ult. *adde* Sed ea dicta sunt *x*\*).

p. 222. l. 15. *adde* Vidit & SPALANZANUS.

p. 223. l. 6. *post* dissolutus *adde* Die a morte tertio de vena incisa sanguis fluxit *d*\*).

In febre remittente hæmorrhagiæ spontaneæ, non criticæ, ut etiam a morte sanguis efflueret *d*\*\*).

Sudoris a morte erumpentis, lymphæ de vulnere vesicatorii manantis exempla legas.

ibid. l. 14. *adde* Neque alia causa fuerit celebris illius cruentationis cadaveris, quam avi nostri ad contactum homicidæ supervenire, & reum hominem accusare persuasi fuerunt.

Idem aër potest etiam in cellulosis telis *g*†), quæ vasis circumponuntur, expandi, inque magnis caveis, & viscera atque vasa urgere. Hinc tumor cadaverum a morte, & natura natatilis. Inde forte ab aëre abdomen distendente, laxatis nunc fibris uteri, infans post mortem de matre expulsus fuerit *g*††).

*h*\*) Nosolog. IV.

*p*\*) Du pouls, p. 242. 243.

pag. 220. lin. 12. *ad verbum* vidi *adde* not. *p*\*\*)) Fufius dicetur in Sect. II.

*x*\*) p. 225.

*d*\*) Eph. Nat. Cur. Decur. I. ann. I. obs. 50.

*d*\*\*\*) MILLAR diseases, p. 72.

*g*†) Conf. Journ. de medec. 1765. Juin.

*g*††) Lib. IV. p. 467.



## S E C T I O II.

## PRESSIO LATERALIS. PULSUS.

- P**ag. 225. l. antepenult. *adde* Omitto, aliam quæ interpretationem patitur, inanitatem vasorum in cadaveribus non raram, potissimum post longos morbos.
- p. 226. l. 7. *post* plenum sit *adde* quæ etiam *Lazari* SPALANZANI est sententia.
- p. 228. l. 9. *post* progrediantur *adde* Quæ omnia in suis salamandris *Lazarus* SPALANZANUS, perinde ut ego in ranis, vidit.
- p. 230. l. 3. *adde* Hæc arteriæ in longitudinem productio etiam in injectione, quam vocant, anatomica evidens est. In vivis animalibus adeo conspicua est, ut nuper Cl. viri eam dilatatione manifestiorem fecerint, Cl. JADELOT, ARTHAUD & LAMURE, tamen ut eorum primus mecum fateatur, evidentior rem esse in arteriis curvis, in rectis obscuriorem, ut destructa curvatura elevationem carotidis destruxerit.
- p. 230. l. ult. *adde* Alibi equidem de hac quæstione egimus. Repetere tamen oportet, utique arteriam ligatam non tumescere, & ab ea sanguinem fugere, quoties in vicinia rami sunt, per quos sanguis effugium inveniat. Quoties vero arteria absque ramis est sub vinculo editis, toties utique & vehementissime arteria ligata tumet, ut apparet, si in quocunque animali aortam supra cor ligaveris. Nunc in nostro exemplo, cum in omnes, eodem tempore, arterias nova sanguinis unda incumbat, nusquam locus erit inanis, quo se impulsæ ea unda recipiat; & necesse erit, eam spatium sibi parare in aucta arteriæ cavea, quam & in longitudinem producit & in latitudinem. Sed etiam arteria tibialis vivi hominis ligata in aneurysma intumuit c\*).
- p. 233. l. 14. *post* nempe *adde* quoad
- ibid. l. 15. *post* aperit *adde* Pressio enim lateralis est æqualis quadrato orificii arteriæ liberæ, diminuto quadrato orificii arteriæ obstructæ; atque adeo tota pressio in lateralem abit, quando arteriæ liberæ area nulla est.

pag.

pag. 226. dele not. e).

c\*) *Med. Mus.* I. n. 4.pag. 231. not. e) *lin.* 10. *adde* MOLINETTI, RIVA *Eph. Nat. Cur.* Dec. I. ann. I. obs.18. TARGIONI *Raccolta* II. p. 122.ibid. not. f) *adde* PLEVIER *officinat. praternatural.* p. 11.ibid. not. h) *lin.* 2. *adde* MORGAGNI *de sedib. & caus. morbor.* III. 83. — *lin.* ult. *adde*In abdominali aorta MORGAGNI l. c. GENGA *anat. chir.* p. 92.pag. 232. not. k) *lin.* 1. *adde* MORGAGNI *de sed. & caus. morb.* I. p. 276.

pag. 233. l. 16. *post. facta est adde* In spina ventosa arteriæ dilatantur *q\*\**), & vulgo in tumoribus cysticis.

p. 234. l. 4. *dele* Mensuram pressionis lateralis --- pressionis mensura sit.

p. 235. l. 17. *post impederis adde* per priora.

p. 238. l. penult. Potest autem pulsus --- aut a coagulatione *lege* Olim ita Cl. viris visum est, & nuper in multis experimentis Cl. JADELOT, ARTHAUD, LAMURE, in nonnullis etiam Cl. PORTAL.

Verum & ego vidi, in ovium potissimum mesentericis vasis, & vidit Cl. SPALANZANUS, utique arterias verissime dilatari, evidentius in animali robusto, in vase magno, & in aorta, obscurius in debili, & in parvo vase. Merito monuit Cl. COLOMB, in *Antonii* PORTAL experimentis tunc evidentius arteriam loco moveri, quando dilatatio obscurior est. Facile enim apparet, novæ undæ sanguinis spatium esse parandum; id si in longitudine aucta paratum fuerit, eo minus latitudinem iri mutatum.

p. 239. l. 16. *adde* Nuper Cl. SPALANZANUS, annulo circumjecto, arterias in flexionibus ad tertiam usque partem dilatari vidit, arteriam pulmonalem salamandræ etiam ad dimidiam, plus equidem in principio, in progressu minus.

ibid. l. 25. *lege* diameter

p. 240. l. 5. *lege* crescat

p. 241. l. 8. *post aliquis adde* fuit. In abdomine nullus *d\*\*\**).

ibid. l. 12. *lege* percutitur

ibid. l. 24. *post producta adde* Ipse Cl. SPALANZANUS vidit arteriam in principio ad dimidias dilatari, in progressu minus.

p. 243. l. 3. *post* VIEUSSENS *adde* & nuper Cl. JADELOT,

ibid. l. 7. *post manifestum est adde* sanguinis de corde exitu impedito, a polypis inter valvulas intricatis *y\**), aut a valvulis aorticis ossibus *y\*\**), pulsum pene destrui,

ibid. l. 12. *adde* Sed etiam inter duo vincula arteria plerumque pulsu destituitur *c\**); si aliquando salisse visa est, id omnino tribuas arteriæ communicanti, quæ

*b\*\**) FALK *vener.* p. 250.

pag. 234. not. 2) *lin. 5. adde* Costæ fractura BOERHAAVE *Prax. med.* I. p. 394. — *lin. ult. adde* MORGAGNI *de sed. & caus. morb.* II. p. 148.

ibid. not. a) *adde* Aneurysma ruptum. *Medical obs. and inquiries*, III.

ibid. *ad verba* æqualis est in *textu lin. antepen. adde* not. a\*) *Lib.* II. p. 427.

pag. 239. not. t) *adde* Similia fere Cl. WINTERL *de inflammat. arteriam* magis nempe dilatari, quam exigit copia sanguinis in nova unda in arteriam magis impulsæ, p. 98. 11 7.

*d\*\*\**) VALISNER III. p. 198. LIEUTAUD *sepulchret.* II. p. 49.

*y\**) VALISNER III. p. 198. *y\*\**) LIEUTAUD *sepulchret.* II. p. 75.

*c\*)* LAMURE *Mém. de l'Acad.* 1765. p. 655.



inter duo vincula in truncum revinctum inserta fuerit, cujusmodi arteriæ necessitatem faciunt duplicis, post aneurysmatis curationem, injiciendi vinculi. Simplex enim si vinculum foret, arteria communicans a superiori & aperta parte trunci arteriæ, sanguinem in arteriæ partem, a qua sanguinem avertere oportet, ducere pergeret.

pag. 243. l. 14. *adde* aut a tono; neque video, cur dubitem, omnem omnino pulsum, ut omnem sanguinis motum, cordi acceptum referre. Video objectionem, esse ubi cor aliquoties pulset, neque ideo arteriæ dilatentur *d*\*). Id in moribundis fit animalibus, in quibus cor contrahitur quidem, sed vix quicquam sanguinis ejicit, ut arteriæ dilatatio conspicua non sequatur.

Video denique esse, qui velint, ante a propria vi arteriam periri, quam sanguinis unda advenit *d*\*\*). Verum hic Cl. viris experimenta obstant *d*\*\*\*).

p. 244. l. 15. *post* auctor *adde* & ejus sequaces.

p. 245. l. antepen. *post* reperio *adde* Huc forte referas pulsum in una manu maximum, qui in altera non percipitur.

p. 246. l. 9. *post* expertus est *adde* In sede inflammata pulsus multo vehementior percipitur, ut etiam exiguarum arteriarum pulsationem percipias, quæ in sano nullæ tangantur. Credas etiam arteriam coarctatam, & arteriam squamis ossis variam, aliter salire quam sanam.

ibid. l. 14. *adde* Denique exempla reperias, in quibus causa phænomeni difficulter reperiatur; ejusmodi homo est dictus Cl. de HAEN, cui in altero carpo 95, in altero 115 pulsus fuerunt. In manu dextra pulsus intermittens, in sinistra bonus apud BADER; sic *n*†) in febre maligna, pulsus in carotide vehementens, in carpo tardus & naturali similis fuisse legitur. Carotidis quidem vehementiorem, quam in aliis arteriis, pulsum sæpe expertus sum *n*††).

p. 249. l. 2. *post* celerior *adde* ipsius fetus equi immaturi, &

ibid. l. 7. *lege* Bovi 36 & 38 *q*) & 40 *q*\*). Equo 34 *r*) ad 48.

ibid. l. 11. *post* feminis *adde* etiam inter animalia *x*\*).

ibid. l. 14. *adde* De eo eventu alias quæretur,

*d*\*) COLOMBE apud PORTAL p. 38.

*d*\*\*) WINTERL *inflamm.* p. 165. *d*\*\*\*) Lib. IV.

pag. 246. not. *d*) *adde* Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 10. obs. 74.

*n*†) KIRBY de febr. malign. p. 174.

*n*††) Swensk. Acad. Handling. 1773. p. 3. Plura vide *Auct.* Fasc. II. p. 60. 67. seqq.

*q*†) Du FOT *malad. epizootiqu.* p. 34.

*x*) Bovi 40, vaccæ 45 du FOT l. c.

pag. 249. not. 2) *adde* Sibi a tribus granis laudani intra minutum primum sex pulsus defecisse YPEY, p. 489.

p. 250. not. *c*) *adde* Quater, quam homini, pauciores CALDAN.

ibid. not. *d*) *e*) & *f*) deleantur.

pag. 250. l. 4. *lege* In rana c) ad 26, anguillæ ad 24 & 30, cochleæ unicus in octo secundis minutis b\*), in vipera in minut. ad 28 g), in testudine &c.

p. 250. l. 16. *post* musculorum est adde & nixus, & vomitus, & potentissimus partus.

ibid. l. 17. *post* suppeditat adde Hoc experimentum nuper in Anglia auctum est, & constitit, augeri pulsum minori vero pro caloris externi portione. Ita reperio, fuisse pulsus 126 cum calore 130 graduum, & pulsus 139 cum calore aëris 130 graduum m\*). Iterum in calore multo majori 240 & 260 graduum, pulsus non supra 144 fuerunt m\*\*). In alio experimento cum calore 202 graduum calor humanus fuit 99½, pulsus 129. In aëre 210 grad. calor humanus 111½, pulsus 114. In alio cum aëre 227 grad. calente pulsus ab 80 ad 145 ascenderunt, calor substitit ad 102 m\*\*\*).

ibid. l. 18. *post* accelerat adde cujus in calore incrementa, inque pulsu, ne opus sit repetere, paucis dicemus. Aquam calentem paulatim pulsum duobus, 6. 12. 15. & 25 & 40 pulsibus, & uno intra minutum primum augere, & vicissim frigus deprimere. In nuperis legas experimentis, in calore 124 grad. pulsus fuerunt centum o\*); & in calore 114, pulsus a 73 ad 114 aucti o\*\*), & a 65 ad 110 o\*\*\*); & in calore 110 grad. pulsus 98 ad 120 o†). Thermæ aliquando magis stimulant, & pulsum auxerunt ad 120 o††).

In hypocaustis illis rufficis 167 gradib. Fahr. calentibus, pulsus in sene ad 120, in viro ad 130, in puero ad 150 acceleratur. In languentibus animalibus calor externus pulsum facit frequentiorem p), quod quidem cet.

p. 251. l. ult. corde *lege* corpore

p. 252. l. 12. adde Ad debilitatem etiam pulsus illos celerrimos refero, quōs a læsa medulla spinali Cl. CAVERHILL c\*) annotavit, ut ad 122. 118. 140. 160. 162. 183. pulsus ascenderent, quæ quidem frequentia fidem meam superat.

ibid. l. 22. *post* ascenderunt adde cum incideretur.

p. 253. l. 2. *post* sedecim adde & triginta

b\*) HANOW. m\*) *Phil. Trans.* LXV. P. I. m\*\*) Vol. LXV. P. II. p. 487.

m\*\*\* DOBSON ib. Plura vide p. 253. & Auct. Fasc. II. p. 60. 67. seqq.

o\*) HAYGARTH apud FALCONER *Bathwaters*, II. p. 182.

o\*\*) Id. loc. eod. o\*\*\*) Id.

o†) Id. p. 182. o††) Id. eod. loc.

c\*) *On heat.*

pag. 253 ad verbum febres in textu lin. 15. adde not. n\*) Nimius fuerit Cl. WHYTT, qui pulsus in febre facit 180. *Nerv. disorders* aut Id. 200.

ibid. not. o) adde Semel 140 MARTIN die tertio. Nam alias tantum 107. 103. 91. fuerunt. ibid. not. q\*) adde (SENAC).



pag. 253. l. 18. *post* nascuntur *adde* Denique morsus animalium iratorum, in quo venenum est, fere pulsuum numerum auget, exiguæ etiam bestiolæ, araneæ. In eximiis *Antonii Martini* q\*\*\*) *ROLANDI* f. experimentis, in variolis confluentibus, ante eruptionem, pulsus temporum 97, manus 118, cum calor foret 37 grad. & die tertio pulsus temporum 92, carpi 109, cum calore 34, ut tamen pulsus carpi ad 132 ascenderent. In alia febre pulsus 140 *Donald MONROUS* reperit, qui vix numerari possint, easque ad 160 & 183 augeri posse persuadetur r\*).

p. 254. l. 10. *adde* Rarior in melancholico homine c\*)

ibid. l. 17. *lege* ad decem & quindecim

ibid. l. 21. *lege* aliaque

ibid. l. 22. *dele* aut ad hypothefin & *post* crediderim *adde* aut debilitatem summam o\*)

p. 256. l. 12. *adde* Suspendis pulsus nullus est, & redit a venæsectione, quæ facit, ut spatio nato cor se deplere queat; a vapore etiam carbonis, cum vires una deficerent, pulsus rarus fuit.

ibid. l. 23. *adde* Mihi aliquot per annos obscura de causa pulsus vehementer intermisit, ut integris diebus tertius quisque deficeret. Eum statum ægre ferebam, ut frigori & animi deliquio proximus essem, potissimum cum alter quisque pulsus me destitueret. Id tamen tantum malum sponte evanuit, neque nunc aliquot per annos quicquam sensi in pulsu alienum. Cum intermittente pulsu, collecti sanguinis sensum cum aliquo dolore percipiebam.

ibid. l. ult. *post* frangentibus *adde* pulsus sæpe, & idoneos apud auctores, tardus fuit, teste olim *PALFINO*, nuper *SARCONIO* & *le ROI*, ut ad 45, ad 40, demum, in exemplo *Cl. Josephi LIEUTAUD*, ad 20, pulsuum numerus decreverit.

Ex eadem causa alias pulsus ita penitus cet.

p. 257. l. 9. *post* percipiatur *adde* A diabete pulsus rarissimus, tunc asphyxia d\*\*)

ibid. l. 14. *lege* pro legitimo stimulo & efficaci sufficit.

ibid. l. 21. *post* frigus *adde* Sæpe in animali vidi quamque arteriam, ut a corde

q\*\*\*) *Sw. Acad. Handling.* 1773. Trimestre 3.

r\*) *Pralect.* p. 103.

c\*) *WHYTT disordr.* p. 303.

pag. 255. not. l) *adde* ad 70 & 90 *D. MONRO* l. c.

ibid. lin. 20. *ad verbum* febrium *adde* not. n\*) *WERLHOFF de variol. & anthracib.*

o\*) vid. p. sequ. & *Auct.* ad hunc loc.

pag. 256. lin. 1. *ad verbum* polypo. *adde* not. p\*) *Tantum* 15 apud *TARGIONI* *raccolta* II. p. 122.

d\*) *Medic. obs. and inquiries*, T. III. p. 26.

remotior erat, ita priorem ab officio cessasse; demum solas arterias magnas & cordi propiores micasse. Vidit Cl. ROUQUET pulsum in moribundo primum in poplitea arteria defecisse, deinde in radiali, ut in sede cordis formicatio quædam superesset. Aderat (a contracta procul dubio auricula dextra) pulsatio venæ jugularis, sed & ea ante mortem evanuit.

pag. 257. l. 22. *post* debilibusque *adde* a vapore venenato carbonum percussis *i\*)*, aut fermentantis musti *i\*\*)*, demum a vehementi terrore *i\*\*\*)* istis

p. 258. l. 17. *adde* Verum id quidem apprime memorabile videtur, quod & MORGAGNUS vidit, vir summus, & ego vidi, ad stuporem vidi, & alii certi testes viderunt, pulsum in sano homine alioquin, sed a dysenteria labefactato, nullum apparuisse ne in corde quidem, qui tamen orthostatus surgeret, ederet, loqueretur, officiis vitæ humanæ fungeretur, nullius sibi periculi concius.

p. 259. l. 19. *adde* In fetu sexto mense edito pulsus 120 *e\*)*.

ibid. l. 23. *adde* Centum triginta ad centum quadraginta HEBERDEN *g\*)*.

ibid. l. ult. *post* 120 *adde* & perinde apud Cl. HEBERDEN

p. 260. l. 17. *post* 45 *adde* WHYTT qui 38. 40. *r\*)*

p. 261. l. 13. ad quinquagesimum *lege* ad sexagesimum nonum & *post* numeravi *adde* frequenter supra 80, nunquam infra 70.

ibid. l. 17. *post* potest *adde* Pulsus 44. 47. Thaddæus BISCHOFF, triginta & 40 Cl. BOISSIER habet *q\*)*.

p. 262. l. 1. *adde* Mihi nunc, dum hæc scribo, septuagenario, pulsus ut pridem sunt fere 80, neque infra 70 descendunt.

ibid. l. 14. *adde* FLOYERUS nimis paucos facit. Foeminæ pulsus 120, numerosorum utique pulsum patronus Cl. WHYTT *e\*)*.

p. 263. l. 16. ne *lege* nullis

ibid. l. 18. *lege* si vero ad eum numerum decem aut quatuordecim alii accesserint,

p. 264. l. 18. *lege* grandis.

ibid. l. 21. *lege* ut accuratius paulo numeros augmenti definiamus.

p. 265. l. 19. *dele* Aër frigidus pulsus decem---motus diminuitur.

p. 266. l. 10. termino *lege* initio

*i\*)* SAGAR *System.* II. p. 541.

*i\*\*)* p. 358.

*i\*\*\*)* ZIMMERMANN *von der Erfahrung*, p. 371. qui tamen convaleuit.

*e\*)* WRISBERG *Nov. Comment. Götting. T. III.*

*g\*)* *Med. Transact.* II.

*r\*)* *Nerv. disordres*, p. 119.

*q\*)* *Nosolog.* I. p. 382.

*e\*)* *Nerv. disord.* p. 119.



- pag. 266. l. 17. *post* pulsus *adde* 160, 180, 183 s\*), 200, aut demum  
 ibid. l. ead. *post* assignari *adde* Summus numerus in æstuosissimo aëre apud Britannos philosophos fuit 140. Vir utilissimus, & meliori sorte dignissimus, Antonius MARTIN, pulsus in variolis ad 132 ascendisse vidit u\*).  
 ibid. l. ult. *post* numerat *adde* Sic Cl. ALEXANDER pulsus supra 137 negat numerari posse.  
 p. 267. l. 7. febris *lege* pulsus  
 ibid. l. ead. excrevit *lege* increverunt & loco rediit *lege* redierunt  
 ibid. l. 10. *lege* a 36 ad 50 d), & ad 66, &c.  
 ibid. l. 17. *adde* Ita Antonius MARTIN in variolis frequenter alium pulsum numerum in temporibus reperit & in carpo, ut etiam insignius discrimen esset, 91 & 109; 64 & 95; porro 97 & 118; 91 & 109, ut fere in carpo frequentissimus videretur i\*). Longius progressi Galli pulsum in utroque latere feminæ gravidæ dissimilem esse sui, & debiliorem; qua parte puellam utero gerebat i\*\*).  
 ibid. l. 19. *post* comparant *adde* fere ut §. 4. ad 1,  
 ibid. l. ult. *adde* Et in universum in febribus, quoties pectus non laborat, pulsus multo frequentior est, cum respirationes a numero sani hominis parum recedant.  
 pag. 270. l. 9. *adde* Mollem & debilem fibra laxa facit, qualem pulsum æstus in Carolina meridionali ex pleno & forti deprimit l\*).  
 ibid. l. penult. *post* deserit *adde* quorum veritatem Ill. FONTANA testis confirmat.  
 p. 271. l. 2. a diverso *lege* a dicoto  
 p. 272. l. 5. *post* inæqualis est *adde* Demum nuper Idem pulsus duos novos prioribus addidit, *pulsum nephriticum* & *pulsum stomachicum* n\*).  
 ibid. l. ead. Verum plura repetere omitto, cum---animum poscunt *lege* Verum plura repetere omitto; id autem structuræ genus experimentorum iteratione oportet aut stare aut everti, quorum utrumque otium & opportu-

s\*) MONRO l. c.

pag. 266. *ad verbum* 300 *intextu* lin. 17. *adde* not. t\*) WHITT l. c.

u\*) 1773. Trimestre III.

pag. 267. not. e) *adde* Vicq d'AZYR *exposé*.

ibid. not. g) *adde* p. 327.

i\*) *Swensk Wetensk. Acad. Handling.* 1773. Trimestr. 3.

i\*\*) BORDEU *recherches* T. III. ann. 1772. & alii bene multi.

l\*) CHALMERS *diseases*, p. 14.

pag. 270. not. q) *adde* de eo Cl. STRACK *Journ. de medec.* T. XXVI.

pag. 271. not. b) *adde* MENURET, FOUQUET &c.

n\*) *Recherches sur le pouls*, T. III. edit. 1772.

nitates, & liberum imprimis a præjudicata opinione animum poscit. Sed etiam in præsentibus ægris experimentum facere mea ætas negat.

Qui nuper Cl. BORDEUII vestigiis institit FOUQUETUS, hos pulsus & alios etiam subtilius figuris expressit. In gutturali pulsu longam & grandem eminentiam in anteriori arteriæ fede reperit, in intestinali pulsum antrorsum conice diminutum cum sensu grani duri, duorumve etiam granorum. In nasali eminentiam reperit, deinde grana aliquot antrorsum fugientia. In uterino similia grana, rectius vero progredientia & absque tumore. In hæmorrhoidali tumorem; deinde grana antè exiguam, quæ in dysenteria se diffundant. Sic Cl. STRACK pulsum irritatum descripsit, & intestinale, & menstruale *n\*\**), porroque convulsorium. Idem pectoralem addit manifestissime esse distinctum, difficillimum hepaticum *n\*\*\**).

Contra eos pulsus video Cl. viros insurgere. Nihil serii in iis reperiēbat Ill. WERLHOFIUS, cujus auctoritas merito est maxima; nihil Ill. HAENIUS, ut etiam fidem in nonnullis novorum pulsum patronis desideret. Ego quidem dicrotum respondere reperi, tum intermittentem aliquando, ut tamen sæpissime omnia alia idem portendat.

## SECTIO III.

## MOTUS SANGUINIS PER ARTERIAS EFFECTUS.

**P** Ag. 272. l. 15. *adde* Primo utique ea omitti non possunt, quæ vel a Cl. viris sunt proposita, vel ex facili speculatione sequi videntur, etsi non nituntur experimento.

ibid. l. 20. *lege* illidere

ibid. l. ult. *post fit adde* neque aut globulorum lineæ in parietes aliqua cum vi illidere videntur, neque se circa plicas convolvere; & eadem mecum Cl. SPALANZANUS vidit. In calidis animalibus & in arteriis majoribus, hæc illisio non est absque omni violentia, cum in cet.

p. 273. *urgenter lege* urgeri

ibid. l. 14. *post discedant adde* Minor est firmitas concreti glutinis, major terrei elementi; quare fibra his duobus elementis composita *q\*)* minus suæ disso-

*n\*\**) Journal de Médecine, T. XXVI.

*n\*\*\**) Ib. T. XXXVII.

*q\*)* L. I. S. I.



- lutioni resistit: cum molliores particulæ minus, quam duræ, fluentum sanguinis continent.
- pag. 273. l. penult. *post nititur adde* Ita certe ex theoria probabiliter docetur, & solidas quidem animalis partes destrui per experimenta docebitur x\*).
- p. 274. *lege* abeat
- p. 277. l. 1. etsi plerumque --- insuperata *lege* etsi plerumque alias ob causas arteria parum dilatatur.
- p. 279. l. 4. *post partem adde* adque manum
- ibid. l. 5. brachialem *lege* radialem
- p. 280. l. 11. *adde* Hypothesin omitto nuper natam, quæ pulsum contrario anastomosium torrenti tribuit. In flexu enim arteriarum, non adeo in anastomosi, pulsus evidentior est.
- ibid. l. ult. *adde* In canalibus se decussantibus tamen liquores paulum misceri MUSSCHENBROECKIUS auctor est.
- p. 281. l. 7. *lege* virorum
- ibid. l. antepen. *adde* Hæc ex theoria, cum nullo experimento fulciantur.
- p. 282. l. 3. *lege* celeritas progressivi motus
- ibid. l. 16. *adde* in vasis nempe minimis
- p. 283. l. ult. *post fuisse adde* etiam quando eæ aves in hibernaculis stupent
- p. 284. l. ult. *adde* Certum est, febres intermittentes, potissimum tertianas, sanguinem dissolvere, qui in me ipso meminesim, post tertianam vernam, anno 1720, plurimum mihi de naribus sanguinem stillasse, & cum sanguinem pulli sanguine non fuisse densiorem. Post tertianam febrem hæmorrhagia narium g\*). Electricitas, quæ sanguinis motum incitat, eadem sanguinis fluiditatem auget g\*\*) & conservat.
- p. 285. l. 2. *lege* diminui
- ibid. l. 4. *post habeat adde* quam summa est superficierum in singulis.
- ibid. l. 14. *lege* perspicimus
- ibid. l. antepenult. *lege* aut in frigidis animalibus, aut in calidis admittunt det.
- ibid. l. ult. *post ducunt adde* & omnino globos ligneos imitentur, qui longo ordine in aqua natant;

pag.

x\*) L. XXX.

pag. 276. *ad verbum rumpuntur in-textu lin. 18. adde not o\*)* Conf. Lib. II. Sect. I. §. 14.pag. 283. not. x) lin. 2. *adde* In aneurysmate membrana subdura nata *Ess. phys. and litter.*p. 222. 223. — lin ult. *adde* RIVA Eph. N. C. Dec. I. ann. I. obs. 18.p. 284. not. b\*) *adde* & in vespertilionem sæpe a BOERHAAVIO citato, LEEUWENHOENIUS.

g\*) E. N. C. Dec. II. ann. X. obs. 147.

g\*\*) GERHARD Mémoires de l'Acad. de Berlin, 1772.

p. 285. not m\*) *spestat ad verbum actu in-textu lin. 16.*

pag. 286. l. 16. *lege* 58.

ibid. l. pen. *post* percipiatur *adde* Cum eo pulsu calor ipse redit. Vinculo arteriæ injecto, artus friget, idemque legitimum calorem remoto vinculo recuperat, MORGAGNI experimento. Ita pariter in aneurysmate, arteria intercepta, subjecta manus friget; at restituto sanguinis commeatu per arterias communicantes, calor redit.

pag. 287. l. 2. *post* nullo *adde* Nihil vulgatius, quam feminarum hystericarum frigus, quas pulsus cum deseruerit, ipse una calor restinguitur. Cum asphyxia frigus 2\*\*\*) conjungi vulgo notum est, & ipsi Cl. adversario HAENIO non ignotum.

ibid. l. 4. *post* initium *adde* calidæ

ibid. l. 11. *post* pondere *adde* in moriente

ibid. l. 15. *post* continent *adde* Fervorem in corde statuit ARISTOTELES tantum, ut sanguis de corde ebulliendo prodeat.

p. 280. l. 3. *post* experiuntur *adde* humoresque animales in confinio putredinis perpetuo poni, plerique nuper Angli urserunt r\*\*).

ibid. l. 11. *post* fœno *adde* ex ipsis demum congestis pannis, pilisque animalium apud THEVENOTIUM, inque linteis chartæ conficiendæ destinatis

ibid. l. 13. *post* reliquerunt *adde* Pulvis etiam coriariorum sponte calorem concipit, qui 45 gr. Reaumurianum æquat, omni humano calore majorem

ibid. l. 18. *adde* Nuperi Angli passim calorem a progressu sanguinis ad putredinem derivant, uti modo retuli.

p. 291. l. 12. *dele* si

ibid. l. 20. *post* nascuntur *adde* aut certo ita evolvuntur, ut pro sua urinosa natura nunc efficaces esse possint.

p. 292. l. 14. *lege* His frigidis animalibus potius, quam cet.

ibid. l. 23. ut aquæ *lege* utique

p. 293. l. 1. *lege* in vivi animalis sanguine

p. 294. l. 5. *post* incalescunt *adde* cremoris exemplo, qui in butyrum agitando coit, non coiturus ob calorem, nisi eum æstivis temporibus ipsa alioquin aqua nivata pastores coërcerent l\*). Alii ponderosi liquores cet.

pag. 286. not. 1) *lege* Posito calore summo 112 gr. comparato aëris = 54 cum calore medio. 2\*\*\*) ZIMMERMANN von der Erfahrung, p. 370.

p. 290. not. r) *adde* Eff. of a Society at Edimburgh, L. V. n. 77.

r\*) Jos. Ant. de PLENCIZ de calore animali, Vindobon. 1773. 8.

p. 291. not. n) *lege* Uti vitrioli oleum.

l\*) YOUNG de lacte.

Fascic. II.

I



pag. 294. l. pen. *post* producunt *adde* confertæ equidem, rari enim crabrones & vespæ in hibernaculis nullum calorem generant.

Sic pisces, ut continuo dicemus, præ frigore glaciali rigentes, qui multos adeo gradus caloris amiserunt, & eos gradus omnes, qui sunt infra 0 Fahrenheit. reviviscunt tamen, & calorem regenerant *q*\*), qui ipsis a natura datus est *q*\*\*).

p. 295. l. 6. *post* pergunt *adde* Primum plurimorum animalium ova, & plantarum semina glaciali frigus incorrupta tolerant *q*\*\*\*)). Et si objicias, nullum in his ovis & seminibus vitalis humoris motum esse, addam, multa omnino nostratia insecta frigus glaciali tolerare *q*†), etiam aquæ *q*††). Demum in universum frigida animalia in frigore vitalia supersunt, & pisces adeo rigidi ut rigeant & frangantur flexi, tamen reviviscunt *q*†††).

ibid. l. 9. sed ad 113 --- descendit *lege* sed Kirengæ ad 124, Torneæ ad 113 *t*), Jenisæ ad 130 *u*) gradus sub Fahr. congelabili frigore descendit, demumque teste idoneo P. S. PALLAS frigus hydrargyrum in oppido Sarapul coagulavit, cum hydrargyrus ad 213. 226 & 235 gradus *Guilielmi DE LISLE* descendisset *u*\*). In eo frigore hydrargyrus consistit & flecti potest. Et tamen in eo ipso frigore integræ civitates vitales supersunt, & animalia vita fruuntur, inque majori denique;

ibid. l. 19. *lege* nempe animalia 184. ejusmodi gradus caloris in suo sanguine solo motu generant *z*).

ibid. l. 20. *post* qualibus *adde* 212

ibid. 23. *post* sustentarunt *adde* nonoque mense vegeti in patriam reversi sunt; quæ eadem felicitas Anglis nautis contigit *a*\*). Ipsi demum bis septem Belgæ, qui desides, neque sustinentes per brumalem aërem venari, scorbuto extincti sunt, plusculos prius menses vixerant, passimque per nives & perpetuam noctem prandium quæsierant. Sex integris annis nuperi nautæ Russici duce HIMKOFIO in insula Spizbergæ vicina vixerunt, & in patriam redierunt.

*q*\*) SULZER *Insekt.* p. 139.

*q*\*\*) L. V.

*q*\*\*\*) SPALANZAN. in nuperis *opusc.* Aphidum ova in glacie vitalia supersunt, *Verhandl. der Maatschapp. te Haarlem*, T. VIII. p. 72.

*q*†) Ibid. p. 23.

*q*††) p. 29.

*q*†††) SULZER *Insekt.* p. 139.

*u*\*) *Reisen durch Rußland*, III. p. 418.

pag. 295. not. a) *post* hiemarunt *adde* & in collectione BORROUGH.

*a*\*) In CHURHILL collect.

- pag. 297. l. 1. *post tritu adde ferro*  
 ibid. l. 11. *dele & animalia ferocia carnivora m).*  
 ibid. l. 13. *lege impulsi*  
 ibid. l. 15. *dele forte*  
 p. 298. tres *lege tribus*  
 ibid. l. 9. *post dictum est adde Asphyxia frigus, illa sublata calor rediit x\*)*  
 p. 299. l. 3. *adde frigent erinacei.*  
 ibid. l. 6. *post plurimus adde teste F. MARTENS*  
 ibid. l. 15. *post portionem adde ad totum corpus*  
 p. 300. l. antepen. *adde & cutis*  
 p. 301. l. 12. *post coalescere adde aut liquores homogeneos d\*).*  
 ibid. l. 15. *lege Violentius*  
 p. 302. l. 1. *lege 900.*  
 ibid. l. 4. *lege vasa*  
 ibid. l. 6. *dele non omnibus animalibus---febrem facit.*  
 ibid. l. 13. *quindecim lege septem*  
 ibid. l. 14. *missionarios Danicos lege OVERTONUM*  
 ibid. l. ead. *sexaginta-- absolveret lege supra viginti gradus secundo vento re-*  
*legeret.*  
 p. 303. l. 8. *post gradus adde (aut certe 112)*  
 ibid. l. 9. *post differunt adde Exempla producunt caloris aucti, cum pulsus*  
*minueretur u\*\*). In Francisci HOME tabulis non eodem ordine calorem*  
*augeri, & pulsum numerum.*  
 p. 304. l. 3. *adde Neque cum pulsu calorem humanum perpetuo aut augeri, aut*  
*minui. In experimentis ea videas, quæ recensuimus, inque aliis Cl. HOME*  
*& HAENII. Demum in aliis nuperis celebribus experimentis Cl. BANK-*  
*SI, FORDYCE, & Antonii MARTIN, in calore enormi atmosphærico factis,*  
*ad 136, 139, & 145 pulsus ascendisse, graduum calorum numerum non*  
*superasse a\*).* Cum in balneo calor esset 48 ad 102, pulsus mansisse 68 ad  
 100 a\*\*). In Cl. CAVERHILL experimentis cum in cuniculo perforas-  
 set medullam spinalem, & calor, qui naturali in statu foret 103, descendit

x\*) E. N. C. Dec. III. ann. IV. obs. 73.

pag. 301. not. a) *post 234. adde ignem sibi confecto ligno procurare.*

ibid. not. c) *adde Globulos Cl. LEDERMÜLLER depictos dedit Mikroskopische Ergöts. II.*

pag. 62.

d\*) BIKER de calore.

u\*\*) LIEUTAUD p. 218.

a\*) Phil. Transact. LXV. p. 1.

a\*\*) HAYGARTH apud FALCONER bathwaters II. p. 182.



fet ad  $83\frac{1}{2}$ , pulsus tamen fuerunt 140. In calore 79 cum pulsibus 118, & 78 cum pulsibus 122 a\*\*\*). In *Antonii* MARTINI ROLANDI fil. experimentis calorem fuisse a 37 ad 44, cum pulsu in variis corporis paribus a 119 ad 57 numerato, & paulo post tertio variolarum die calorem a 34 ad 28 multo minorem cum pulsibus 109 ad 91, quæ ratio minor est; & paulo post cum pulsibus 132, nempe minorem calorem cum majori pulsum numero at). In sævo illo æstu, quem ad 220, 224, 260 gradus Fahr. Academici Angli tulerunt, pulsus non fuerunt supra 136. 144, qui numerus magnus quidem est, non tamen cum eo comparabilis, quem aër creat, quem respirabant at†)

pag. 304. l. 5. *post* majori *adde* In peste cum pulsu vix celeriori æstum insensissimum fuisse RUSSEL.

ibid. l. 14. *adde* In cadavere denique potissimum post morbos malignos, febremquæ flavam, calorém vitali similem, aut paulo minorem diutiuscule superfuisse, cujus adeo causa non possit in sanguinis motu quæri.

ibid. l. 20. *post* pure *adde* Demum non raro, a morte calorem superesse, non in solis apoplecticis et), sed post febres malignas, aliasque ignotas causas.

ibid. l. 21. *adde* Non a circuitu calorem esse, cum animalia frigori resistent, quibus nullus circulus sit; effectum esse boni status sanguinis J. HUNTER et†), non circuitus nempe dicitur calorem facere, sed motum humoris vitalis.

p. 305. l. 16. *adde* Ad susurrum, seu inconspicuam oscillationem fibrarum, calorem animale CL. ROGER retulit.

Nuper CL. CAVERHILL calorem ad nervorum actionem reduxit, eo potissimum experimento, quod læsa medulla spinali calor insigniter depressus fuerit. In ejus viri quidem experimentis utique, læsa medulla spinali, & pulsus reddebatur debilior & calor minuebatur. In cuniculo, cujus calor erat 103 grad. a stylo in medullam spinalem detruso utique calor a 103 ad 93, a 100 ad  $87\frac{1}{2}$  & 89, a 99 ad 70, a 86 ad 75, 71, descendit.

p. 306. l. 9. *adde* CL. CAVERHILL unice videtur demonstrasse, vires vitales, læsa medulla spinali, debilitari, cumque his viribus calorem. Nam etsi, quæ citavi, videntur dissensum inter pulsum numerum & calorem animalis ostendere, non tamen ostendunt. Nam pulsus 140. 122. & 118, qui nobis multi videntur, & cum parvo calore conjungi, vere non sunt multi; noster

a\*\*\*) On heat.

at) Sw. Acad. Handl. 1773. Trim. 3.

at†) Philosophic. Transact. LXV. P. II. BLAGDEL

et) PORTAL apud ROZIER 1774, Mois d'Octobre.

et†) Phil. Transf. LXV. P. II.

enim pulsus huic animali tribuit 183. 166, 162 & 160, ut omnino pulsus 140 & 122 multo naturali numero pulsuum cedant; debilem & rarum cum frigore pulsus factum ipse auctor est, & demum exiguo gradu paralyticos artus fieri frigidiores.

pag. 306. l. 19. *lege* Calorem animale non supra 112 gradum a motu cet.

ibid. l. 26. *post* intolerabilis *adde* Calor febrium putridarum digitum quasi punit *p\*\**).

ibid. l. penult. *post* afficere *adde* Neque recuso sudorem fieri, quando causa motrix sanguinis remittit. Cl. ALEXANDER per sudorem pulsus vere minui vidit, & a 104 ad 80 redire.

Sic fieri potest, ut cum summa debilitate aucta pulsus velocitas conjungatur *p\*\*\**), neque id phaenomenon rarum est. Eo in statu rerum sanguis trepidat potius, quam acceleratur, & sub mortis atriâ demum ad exiguam a corde distantiam per principes arterias promovetur, ut frigus in artibus conjungi æquum sit, ad quos calida sanguinis unda nulla nunc pertingat.

p. 307. l. 1. *post* adipe *adde* divitem

ibid. l. 4. *post* video *adde* inque *Francisci* HOME numeris cum frigore febrili calorem 104 & 101 fuisse lego.

ibid. l. 7. *post* exteriores *adde* exiguos

ibid. l. 13. *adde* Etsi nonnunquam calor in febre auctus fuerit non aucto pulsu, in universum tamen & in solita lege naturæ, pari proportionem & calor intenditur & pulsus. In meis quidem experimentis intermissio febris, finis adeo caloris, erat, cum pulsus redirent ad 94. Febrem percipiebam & calorem, cum pulsus 100 attigissent & superassent; molestum calorem, ut is numerus augeretur; intolerabilem, quando 130 superabat.

p. 309. l. 4. *post* initia *adde* se efferre.

p. 310. l. 1. *post* exposuimus *adde* probabilem nempe hypothesein secuti, non ut demonstrata esse asseveremus, quæ docuimus.

ibid. l. 10. *lege* 27.

ibid. l. 21. *post* abit *adde* Putredo ruborem destruit eo potentius, quo longius ipsa progressa est.

p. 312. l. 11. *post* rubor *adde* fatis certo

ibid. l. 14. *adde* & plantarum coccinei liquores.

*p\*\**) FASANO *febr. epid.* p. 201.

*p\*\*\**) Libr. V. Et de oculo inflammato in diffans æstus emicavit VIRIDET vapours, p. 87. pag. 312. ad verbum fuerit in textu lin. 12. *adde* not. *p\**) pag. 310.



pag. 312. l. antepen. *post* inclinatur *adde* eademque paulo post inversa placenta aëri opposita, ruborem recuperat.

p. 313. l. 1. Multis modis utraque hypothesis evertitur *lege* Porro addunt, sanguinem, qui de vena emissus est, ipso trajectu longiori per aërem floridum colorem concipere. Cruoris aëri obversi tot laminas rubore florere vivido, quot deinceps aëri obversæ fuerint. In spatio inani sanguinem atrum reddi. Oleo olivarum superfuso, aëre adeo averso, sanguini superficiem nigram nunc esse, quæ florido colore fuisset, si aëris effectum sentire ei permisisses. Hæc. Cl. CIGNA z\*).

Addere posset, purpuram marinam viridem apparere, inde in cæruleum, demum in purpureum transire z\*\*), aëre reddito z\*\*\*).

Nuper vir clar. *Josephus* PRIESTLEY novis experimentis pene persuasit, omnino tamen sanguinem ab aëre suum ruborem habere, ex quo nitrosi aliquid sanguinem subeat, uti vicissim phlogisti pars ex pulmone in aërem exhalat z†). Nam utique sanguinis in vena pulmonali lætorem, quam in arteria, ruborem esse z††). Eo meliorem autem ruborem ab aëre cum sanguine communicari, quo prior est admisto elemento phlogisto z†††). A phlogisti abundantia nigrum fieri, ab aëre læte rubere a\*); vesicam interpositam non impedire, quin aër vulgaris sanguinem rubore tingat a\*\*). Qui in spatio inani niger factus est sanguis, is in libero aëre ruborem recuperat a\*\*\*).

ibid. l. 12. calorem *lege* colorem

ibid. l. 18. *adde* Nuper Cl. ROUME nigrum, qui dicitur, æthiopum sanguinem solam ob crassitiem laminæ sanguineæ nigrum esse f\*).

p. 314. l. 9. *adde* In pulli incubati vasis sanguis, cui nihil ab aëre hætenus beneficii accessit, iisque minoribus rubor est floridus, in majoribus potius subviolaceus.

ibid. l. 14. *post* inani *adde* per alia experimenta,

\*) CIGNA *Miscell. Taur. T. I.*

z\*\*) BOYLE *color. p. 295.*

z\*\*\*) REAUMUR *Mém. de l'Acad.*

z†) *Phil. Trans. LXVI. P. I p. 237. & in T. III. sur différentes sortes d'air.*

z††) Ibid. p. 238.

z†††) Ibid. p. 234.

a\*) Ibid. p. 241.

a\*\*) Ibid. p. 244.

a\*\*\*) Ibid. p. 245.

f\*) Apud ROZIER *Journal de Physique* 1773. Juillet.

pag. 313. not. g) *adde* RÖDERER de morb. mucoso, p. 162.

pag. 314. l. 16. *post* recuperat *adde* Hæc confirmavi facili experimento, ex quo constat, tenues laminas sanguinis, & marginem non crassi grumi, etiam consentiente D. PRIESTLEY, lætius rubere, quam crassam placentam q\*).

ibid. l. 18. *adde* Verum omnino mihi videtur simplici experimento ostendi, non vere coccineum colorem sanguini ab aëre impertiri. Id verum est, sanguinem, qui de naribus stillat, uti guttula se dispergit, ita læte rubere. Verum indulge huic eidem guttulæ aëris contactum: videbis continuo, hunc coloris florem diminui, & in obscurum ingratumque fuscum colorem sanguinis mortui transire. Ex eo argumento certo credas, ruborem illum floridum potius ab ignoto aliquo elemento esse, quod de aëre decedens in sanguinem, hunc subito quidem floridum reddat, sed idem sanguinis naturam ita non mutet, ut continuo diffusum, deterius tinctum relinquat; vel in globulis ab aëris contactu mutationem aliquam produci, quæ continuo iterum evanescat, ut omnino, quoties de perpetuo & vero sanguinis robore ejusque causa sermo sit, non possit idem ab aëre repeti, cujus effectus adeo fugax sit.

Contra ista potest denuo urgeri experimentum III. CIGNA, qui de lamellis sanguinis taleolas refecuit; ita vidit eam, quæ sequebatur, aëri oblatam floridiori fieri colore; oleum demum, quod aërem arcet, sanguinis colorem reddere obscuriorem, non mutato laminarum numero r). Ita videtur confici, non ruborem quidem, sed floridum ruborem & cinnabarinum aëris contactui deberi; eundem contactum autem vim minime perpetuam exercere, laminamque, quæ coccinea fuit, post moram aliquam obscuritati reddi. Putes exhalans phlogiston hunc eximium fulgorem parare. Certe ut sub oleo, exhalationem impediante, nullus nascitur in Cl. CIGNA experimento; ita nullus sub aëre inflammabili, qui porro nullum de sanguine phlogiston admittit r\*\*).

p. 315. l. 4. serum *lege* suum.

p. 317. l. 4. *adde* Hanc conjecturam nuper clar. viris placuisse vidi, etiam qui ex professo de rubore sanguinis scripserunt, Cl. STORMIO x\*), du RADE, & Illustrissimo Comiti de MOUROUX x\*\*). Addit idem yir III. etiam calcem sanguinis rubram esse, & yitris dare ruborem.

q\*) *Phil. Trans. LXV. P. I. obs. 246.*

r\*) *Miscell. Taurin. p. 68. 72.*

r\*\*) *MOSCATI nuove esperienze.*

x\*) *De rubore sanguinis.*

x\*\*) *Miscell. Taurin.*



Neque mireris, a metallo animalia hunc colorem habere. Nuper ostensum est x\*\*\*), cantharides, quorum elythræ auri colore refulgent, omnino aurum arte chemica conspicuum reddere.

pag. 318. l. ult. *lege* dissolvere,

p. 320. l. 2. est *lege* sunt,

## SECTIO IV.

### MOTUS SANGUINIS PER VENAS REDUCIS.

**P**ag. 323. l. 3. *post* celerior *adde* neque alia magis probabilia, in quibus in trunco, quam in ramis, major fuit celeritas. Sed casui illam contrariam naturæ prærogativam tribuerim; uti cet.

ibid. l. 15. *post* facile sit *adde* Non memini me vidisse, vidit tamen Cl. SPALANZANUS venam unicum globulum vehementem se in magnum truncum, ipsamque venam cavam exonerasse d\*).

ibid. l. penult. *post* major est *adde* quam ad parietes sit.

p. 324. l. 2. *lege* Ita ad truncos venarum majores, & maximas tendunt.

ibid. l. 6. *post* acceleratur *adde* Ita æqualitas in motu circulatorio obtinetur.

Ut enim arteriæ de motu suo amittunt, quod pauciores continuo globuli plures propellere coacti, debiliorem iis motum imprimant, ob latitudinem in minimis ramis auctam, ita venæ celeritatem recuperant, cum plures continuo globuli ramorum in pauciores globulos trunci nitantur.

ibid. l. 8. Prima, quam removemus ---- causas numerari debent, *lege* Num cor sanguinem venosum acceleret, primum dispicere oportet.

Ego quidem x), tot in experimentis, nihil unquam vel in minoribus venis, vel in majoribus simile vidi; vidit autem non LEEUWENHOEKIUS solus & STEPHANUS HALES, sed nuper clar. vir, cui merito plurimum tribuo, *Lazarus SPALANZANUS*; in minimis nempe venis sanguinem acceleratum fuisse, ut in systole cordis arteriosi celeritatem superaret, qui in diastole ei cederet. In mediis venis, & in cava vena, nunquam eam accelerationem idem viderat.

p. 325. l. 1. *lege* suæ distentioni.

pag.

x\*\*\*) FORSTEN *diff. de cantharidibus*, Lugd. Batav. 1775.

d\*) *Mot. sangu. Leg. I. §3. Phenomen. p. III. cet.*

pag. 324. notæ n. o. p. q. & sit. deleantur.

pag. 325. l. 10. *post* rapiatur *adde* quod ipsum nuper Cl. WILSON pro magno invento tradidit.

p. 326. l. 8. *post* latiori *adde* Nuper adhuc SPALANZANUS sanguinis motum accelerari docuit, ut venæ cordi propiores essent, inque vena cava potissimum.

p. 327. l. antepenult. *dele* Cum venis majoribus ---- ut alias exposui.

p. 328. l. 3. *lege* a copia.

p. 329. l. 6. *post* convertitur *adde* Hæc omnia, pariter ut ego, nuper Cl. SPALANZANUS vidit.

ibid. l. 11. *adde* ope.

ibid. l. 17. *post* fuerit *adde* A Cl. demum SENACO omnino negatum est, a venæ incisione sanguinem in ea ipsa vena accelerari.

p. 330. l. 16. qui a stimuli præsentia ---- sanguinis effectus est *lege* cuius actio a stimuli præsentia sustentetur *i*). Porro manifesto vidi, sanguinem stantem & coactum a venæ incisione in vivo animali solvi, ut globuli dissipati secederent. Sed sanguis in corde ejusque auriculis coactus contractioni resistit *k*). Hoc ergo impedimentum potest a venæ sectione tolli.

ibid. l. 21. neque adeo inter ---- motum retardant *lege* in universum tamen aliquantum sanguinis circuitum incitant.

p. 331. l. 10. *adde* Nunc quidem motus in cerebro aliquis dudum innotuerat. Cum tenero infanti cerebrum solis membranis tegatur, ea in sede alternum encephali motum levissima attentio animi distinguit; & omnino jam PLINIUS *a*) annotavit, soli inter animalia infanti cerebrum salire; quæ eadem causa fuit nominis *fontis pulsantis*, quo sedem cranii osse non coopertam antiqui designarunt; animalibus autem aliis minores sunt eæ nudæ sedes, & celeriter ab ossea natura occupantur. Motum cerebri in infante manifestum esse ORIBASIVS *b*), qui addit, dum id viscus elevatur, accedere idem ad duram membranam, & recedere vicissim *c*), quando subsedit. ZOROASTRO, perantiquo mago, cerebrum ita palpitasse legitur, ut manum repelleret *d*). Eundem motum cerebri, quo alterne tumet & subsidet, plerique vetusti medici in sua scripta receperunt *e*). Innumeris exemplis idem motus in ægro-

pag. 330. not. *k*) *lege* CALDANI *risession*. 254.

*a*) L. XI. c. 37.

*b*) Edit. DUNDASS. p. 50.

*c*) pag. 9.

*d*) Apud. PLINIUM L. VII. c. 16.

*e*) COLUMBUS, p. 189. BAUHINUS *Theatr. anat.* SANCTORIUS in I. *Fen.* AVICENNA. BARTHOLIN. *anat.* p. 259. VIEUSSSENS, p. 41.



tis hominibus, inque vivis animalibus, confirmatus fuit *f*). Non potuerunt chirurgi ignorare, fungos in cerebri vulneribus per foramen cranii urgeri, sanguinem post terebram admotam exsilire cum impetu *g*), cerebrum ipsum *h*) per vulneratum cranium exprimi; cranii suturas, post cephalaeas aliosve morbos, hiare *i*); eo in casu motum cerebri percipi; vasa demum peregrina, per morbos, a corpore, ex foramine cranii alterne & exiisse & in cranium fuisse resorpta *k*). Olim CAULIACUS cum cranium deesset, cerebri motum vidit *l*). Necessse est autem, aut molle esse cranium *m*), aut foramine perterebratum nudam ostendere duram matrem. Demum in meis certe experimentis non prius cerebri motum vidi, quam digito de calvaria cerebrum duramque meningem repulisssem.

Sequitur, ut modus ostendatur, quo cum respiratione hic cerebri motus conjungitur.

pag. 331. l. 16. *lege* anno vero 1751, mense Aprili, in conventu Societatis Regiæ prælegi *n*); & circa anni 1751 finem, & 1752 initia, cum amicis gallis REAUMURIO etiam & SAUVAGESIO, Decembri & Januario mense, in literis meis *o*) communicavi.

p. 332. l. 5. *post* epistola *adde* etiam post meas responsiones repetito excusa.

ibid. l. 11. *lege* accusat

ibid. l. 18. Præcipuis tamen in rerum ---- edidi prior *lege* qui cerebri sinus pulsare, & animal sopiri, cui venæ jugulares intercipiuntur, & spatium inter duas meninges esse scripserit. Hæc plagii accusatio me movit, ut calamum arriperem, nunquam ne verbo contendere certus, si de sola gloriola inventi ageretur.

*f*) V. COITER, p. 132. PARE, p. 300. RIOLAN. p. 414. C. BAUHIN. *theatr.* p. 247. HILDAN. *Cent. I. obs.* 13. *Cent. II. obs.* 18. *Cent. V. obs.* 23. LINDEN *physiolog.* p. 148. 427. BELLIN. *miss. sangu.* p. 48. GOCKEL *gallic. obs.* 54. BAGLIV. *oper.* p. 274. 275. RIDLEY p. 5. *Philos. Transf.* n. 281. BECKER *obs.* 26. FANTON. *esp.* p. 212.

*g*) TULP. *L. I. obs.* 5.

*h*) Funesto eventu JAMIESON *Essay of a Societ. at Edimb. T. II. p.* 245.

*i*) BARTHOLIN. *Cent. V. hist.* 92. *cet.*

*k*) HAGEDORN *Cent. I. hist.* 92. *cet.*

*l*) pag. 176.

*m*) Hinc in ave & pisce cerebrum non movetur, SCHLICHTING *Commerc. nor.* 174. *hebd.* 52.

pag. 331. not. *m*\*) *adde* Conf. *Préface* ad *Journ. étrang.*

pag. 332. *ad nomen.* LAMURE in *textu* lin. 1. *adde* not. *t*\*) Ita enim M. Martio 1752 Cl. de SAUVAGES fatetur, quæ epistola excusa prostackit.

ibid. not. *c*) *adde* Conf. ceterum *Supplément à l'Encyclopédie.*

ibid. *ad verbum* aperueris in *textu* lin. pen. *adde* not. *c*\*) SCHLICHTING *Mem. des Sav. étrang.* l. p. 117. WALSDORF, p. 2. 9.

pag. 333. l. 3. Vicissim in expiratione ---- digitum impositum repellere *lege* In proxima vero expiratione cerebrum mole augeri *i*), & assurgere *k*), & de cranio effracto prominere *k*\*), digitumque impositum repellere *k*\*\*), & sanguinem super cerebrum effusum exprimere.

Cum his experimentis alia consentiunt. Dum clamatur, cerebrum exferitur *k*\*\*\*). Inter expirandum per futuram coronalem foetida materies *k*\*\*\*\*) expulsa fuit. A tussi multus sanguis de cranii cavo expressus *k*†) est, sinisque cerebri intumescunt *k*††). De fracto cranio gutta sanguinis exsudavit, cum, clauso ore clausisque naribus, conatus *k*†††) ad respirationem ederetur, & de cranii foraminibus sanguis per expirationem effluxit *k*††††). A systole & diastole duræ membranæ, in vulnere cerebri, pus ejectum *l*\*). Vehemens pulsatio, ut dura mater elevaretur & magnum cranii hiatus repletet *l*\*\*).

p. 334. l. 7. *adde & Gualthero van DOEVEREN.*

ibid. l. 8. Neque enim hominem synchronum fecerunt *lege* Qui vero aut venas *c*), aut ipsum cerebrum, in inspirante animali turgere scribunt *d*), ii in experimento tempora confuderunt.

ibid. l. ult. *adde* Experimento hæc confirmavit vir clar. *Anna Carol. LORRY.* Asperam arteriam adstrinxit, ut respiratio cessaret; ita cerebrum pro retenti sanguinis portione tumuit: laxavit eam arteriam, pulmoni libertatem reddidit; continuo cerebrum detumuit *h*\*).

pag. 333. lin. I. *ad verbum* inspirationes in *textu* *adde* not. *d*\*) LAMURE p. 565. *Mém. &c.*

T. IV. Exp. 5.

ibid. not. *e*) *adde* SCHLICHTING l. c. LAMURE, p. 543. LORRY, p. 300. 353.

ibid. not. *i*) *lege* Exp. 73. *sur les parties irritables.* T. IV. exp. 8.

ibid. not. *k*) *lege* SCHLICHTING l. c. *Mém. l. c. T. I: exp. 73. 74. 75. 80. 82. 86. 88. 89.*

90. 91. 12. CALDAN. ib. T. III. exp. 49. 50. SPROEGEL *de venen.* p. 41 — 54 ZINN *obs.*

4. Urb. TOSETTI *lett. 2. off. 2.* p. 198. WALSDORF *exp. 11. 5. 6. 10. 17.* HOUSSET *exp. 20.* & ipsi demum Cl. viri A. C. LORRY *Mem. des Sav. étrang. T. III. p. 301. 307. 35.* LAMURE *Mém. de 1749. seu potius 1753. p. 142. 517.*

*k*\*) LORRY, l. c. p. 300.

*k*\*\*) *Mém. &c. T. I. exp. 73. 75.*

*k*\*\*\*) ORIBAS. ed. DUNDASS. p. 50.

*k*\*\*\*\*) BINNINGER *Cent. V. obs. 96.*

*k*†) *Ess. of a soc. at Edimb. II. n. 12.*

*k*††) MAGAT *rar. med. II. p. 13.*

*k*†††) SLEVOGT *dura mat. n. 50.*

*k*††††) ACREL. *Haendels. n. 9.*

*l*\* TURNER *cases p. 30.*

*l*\*\* Ibid.

pag. 334. not. *d*) *lege* FANTON. *anat. p. 441.* PETRIOL. in *FABRI Raccolta*, p. 336.

*h*\*) p. 310.



pag. 335. l. 10. in venas cerebri *lege* in venas jugulares *k\*)*, & cerebrum, ex ergo &c.

ibid. l. 12. *adde* Quare etiam resectis ligatisve arteriis venisque capitis, intercepto in vasa cerebri refluxu, etiam is cerebri motus supprimitur *m\*)*.

ibib. l. 13. *dele* si placeret malignum esse,

ibid. l. antepenult. *lege* debet

ibid. l. penult. *post* homine *addi* calvaria inviolata

p. 336. l. 4. *adde* Id de totare in vivo animali verum superest. Cum in exspirando venæ cerebri magis repleantur *s\*)*, mollis cerebri interposita medulla comprimitur *s\*\**. Inde a sanguine cerebrum infarciens ea cerebri induratio *s\*\*\*)*, quam SCHLICHTINGIUS convulsionem dixit.

ibid. l. 15. Alia causa est refluxus --- observata sunt *lege* Alio etiam modo respiratio motum sanguinis venosi mutat & moderatur. Diaphragma nempe, ut suo loco dicetur, inferiorem venam cavam constringit agendo, dum inspiramus; sanguinem ejus venæ cogit descendere, & a corde avertit. Paulo post remittit se diaphragma, & sanguis per expirationem in venam cavam & dextram auriculam appropinquat.

Utroque modo respiratio motum sanguinis venosi potius dirigit, quam adjuvat, cum ejus reditui modo resistat, faveat modo. Sed ea alibi redibunt.

p. 337. l. 10. *dele* & rariores, &

p. 340. l. 19. *post* oportebat *adde* Venam cavam circa divisionem in venas iliacas ALBINUS coaluisse vidit. Venam jugularem indurato quasi glutine fartam SPONIUS. Venæ portarum ramum excæcatum SEVERINUS in phoca vidit. Vena cava, ad arteriæ morem, & squamis ossibus varia, & dilatata, & polyposa materie farta apud MORGAGNUM.

ibib. l. antepenult. *post* hydropicorum *adde* in hypochondriacorum hominum

*k\*)* T. I. *Mem. exp.* 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. LAMURE p. 542. 548. 551. 554. 555. 556. 542. WALSDORE p. 51. SPROEGEL *de venen.* p. 37. 76. 81. LORRY 308. 313.

pag. 335. not. l) *adde* *Mém. nostr. exp.* 78.

*m\*)* LAMURE p. 548. 555.

*s\*)* Quod in vomitu sit SWIETEN *Comment.* III. p. 266. Sed vide L. VIII. in Cap. *de vomitu.*

*s\*\*)* Aut LORRY *Mémoire des Savants étrangers*, III. p. 312. 63.

*s\*\*\*)* Id. ib. p. 377.

pag. 336. not. t) & u) deleantur.

pag. 340. l. antep. *ad verbum viscerum adde* not. d\*) RIDLEY *obs.* p. 108.

pag. 340. l. antepen. hæc *lege* hic

p. 342. l. 11. *post* falit *adde* In nuperis Cl. FRAIRIOT mensuris, sanguis ex vena febrientis hominis missus ad 48, 55, & 61 lineas exsiluit, & intra tria minuta sanguinis libra effluxit, apud VANUCCIUM.

ibid. l. 14. *post* tempus *adde* ex corde in cor

p. 343. l. 4. *lege* intra

p. 344. l. 21. *lege* subtrippla

ibid. l. penult. quod *lege* quo

p. 350. l. 10. *adde* Uti post mortem venosi sanguinis motus superesse potest, ita multo evidentius lymphæ motus superest. Ea enim, quando primum aperto in abdomine vasa sua pulcherrime distendit, sub oculis inspicientis incisoris solet quasi evanescere, constrictis, ut videtur, per frigus vasculis, & suam aquam propulsantibus. Vulnerato vase, magna vis lymphæ de læso vasculo manasse visa est, quæ adeo eminus advenisset. Idem vasorum lacteorum est privilegium.

## S E C T I O V.

## PRESSIO LATERALIS SANGUINIS VENOSI.

**P** Ag. 361. l. 15. *post* raræ sunt *adde* Sinus venosi duræ matris profundas foveas calvariæ imprimunt, quæ in fetu & infante nullæ fuerant. Varices pressiois lateralis effectus sunt, a qua denique non sine periculo rumpuntur.

p. 253. l. 14. *post* primo *adde* ne arterias quidem minores micare; majores vero venas non falire, quod ad eas cordis vis cet.

ibid. l. 17. ea a venis undique abest *lege* ea a venis majoribus abest i), minores vero ne arteriæ quidem micant.

p. 355. l. 12. *lege* continuari

ibid. l. 25. *lege* in minimis porro & reticulatis vasculis natura tantum cet.

pag. 343. not. u) *adde* & in L. IV. Sect. IV.

pag. 351. not. l) *lin.* 2. *post* ejusmodi *adde* cylindros.

pag. 353. not. l) *adde* Eadem habet Cl. FOURNIER.

pag. 354. not. o) *adde* FOURNIER *Journal de Médecine* 1774. Juillet.



pag. 356. l. 12. *post* solent *adde* ut sub costis spuris abdominis venæ pulsarent *a\*)*.

ibid. l. 21. *post* infarciretur *adde* A struma comprimente venam jugularem *g\*)*.

ibid. l. penult. *adde* Frequentior jugularium pulsatio GALENO non ignota fuit.

Alia rarior causa visa tamen est, quando, HUNTERO potissimum auctore, arteria in venam inserta apertam varicem excitavit, quæ ad aneurysmatis modum pulsabat *i\*)*.

Frequentius fit, ut arteria subjecta veniam succutiat, sic pulsum mentiat. Exemplum in frontis vena Cl. CARRERE habet.

*a\*) Méd. observ. and enquir. III. 13.*

pag. 356. not. *f)* *adde* SAGAR *System. p. 143.*

*g\*) ARTHAUD, p. 10.*

*i\*) Apud GESNERUM in not. ad PURCELLII librum von der Kolik, p. 39.*

# ELEMENTORUM PHYSIOLOGIÆ

## *LIBER SEPTIMUS.*

SECRETIO.

P R Æ F A T I O.

**E**ST ut veniam petam, Lector Benevole, quod & perbreuem libellum hic reddam, & vix quicquam habentem mei. Quando hæc scripta sunt, anno fere clobcccliii, theoria BELLINI, PITCARNII, BOERHAAVII, per libros dominabatur, & per professorum pulpita. Etsi nunc, quæ potissimum ad librum sextum & hunc septimum pertinent, viderem veram demonstrationem non admittere; totumque meum laborem non utilissime ponerem in librandis contrariis hypothefibus, quarum plerumque neutra recipi posset: numquam tamen ausus fuissẽ omittere, quæ ubique aut docebantur, aut a FRANCISCO BOISSIER, aliisque nuperioribus aut Jatromathematicis, aut phrenicis viribus & occultis qualitatibus addictis doctoribus, refutabantur. Nunc multæ harum litium conquieverunt: novæ etiam hypothefes, aut severa ab hypothefibus abstinentia, dominantur. In hoc ergo libro septimo de natura causisque secreti in certo, neque in alio, organo certi liquoris, non sustinui porro quicquam rimari, tuerive, aut refellere. Quæ scripseram brevia, ea reliqui; novis hypothefibus bonam artem nolui obruere. Quæ de fabrica colorum dixi, ea ut vera, etsi forte non plena, immutata reliqui, cum nihil novi de iis organis nuper didicerim. Quæ de muco experimenta Ultrajecti edita fuerunt, lubentissime legissẽ; nunquam autem ad ea legenda pervenire potui, quæ infaustra sæpe libellorum academico- rum fors est. Ita vale, parceque sua peccata ultro fatenti.

*Bernæ, d. XXX. Mens. Octobr. clobccclxxvii.*



## S E C T I O I

## H U M O R E S.

- P**ag. 360. l. 17. *post* perficitur *adde* ex quo vegetabilia omnia prodeunt,  
in quem omnia resolvuntur.
- ibid. l. pen. *lege* terræ
- p. 361. l. 2. *post* olei *adde* aliquid.
- ibid. l. 27. *post* adhærescat *adde* A frigore non congelatur, ut mucus animalis  
potentissime hiemis inclementiæ resistat. In aëre libero potius densatur, a  
phlogisto & ab aëre inflammabili fluidior fit g\*). Ceterum cum aqua non  
facile miscetur g), in Cl. FORDYCE experimentis nuperis, etiam si caloris  
vim addideris. Odore caret & sapore cet.
- ibid. l. penult. *lege* Pariter ab igne & a fervida non cogitur, neque in albu-  
men abit.
- p. 362. l. 2. *post* manserit *adde* nisi aqua dilueris.
- ibid. l. 3. *post* minus *adde* quando aëre purus est.
- ibid. l. 5. *post* abeat *adde* grumi similes, neque cum aqua miscendas
- ibid. l. 8. *lege* Cum oleo non bene miscetur, cum mucilagine & plantis me-  
lius, quæ utriusque naturæ particeps sit.
- ibid. l. 10. *post* ipsis *adde* mucus
- ibid. l. 15. *lege* etiam aut non cogit r), aut leviter, sive purus cet.
- ibid. l. 17. *post* imposuerit *adde* cum tamen gummi in aqua solutum cogatur.
- ibid. l. antep. *post* visi sint *adde* in Cl. FORDYCE tamen experimentis lentescit,  
a debili vero acore non tangitur.
- ibid. l. pen. *adde* nisi caustici fuerint.
- p. 363. l. 11. *adde* Gummi arabicum ad ignem acidum liquorem dat.
- p. 365. l. 3. *lege* in caveas amnii, pectoris m) cet.
- ibid. l. 5. *post* destillat *adde* humor etiam, ut puto, cerebri, quem cet.
- ibid. l. 6. *post* exponemus *adde* quando de liquore ventriculorum cerebri quæ-  
retur.

pag.

g\*) MOSCATI nuove esperienze, p. 30.

pag. 362. not. h) *adde* BUTT p. 14.ibid. not. r) *adde* Cogere tamen Cl. LASSUS de lymph. p. 30.ibid. not. s) *adde* LASSUS cet.ibid. not. t) *adde* solvunt LASSUS.ibid. lin. ult. ad verbum odore *adde* not. t\*) LASSUS l. c.

pag. 365. deleatur not. l).

- pag. 365. l. 19. *post* DUVERNEY *adde* ut etiam ad lympham relatum sit.  
 ibid. l. antepen. & cum minerali-- candidumque *lege* ab acore minerali & vegetabili cogitur, & ab adstringentibus herbis *b*\*), a minerali vero acore in spissati albuminis naturam abit, porro insolubilem *b*).
- p. 367. l. 6. *post* castoreum *adde* & glandularum ad anum quadrupedum unguen,  
 ibid. l. 10. *post* nati *adde* Vitellus enim ovi fere totus quantus in oleum resolvitur, cujus in unico ovi vitello duas drachmas Cl. SPIELMANN invenerit.
- p. 368. l. 10. *adde* Ita & pus, humor quidem nunquam non sponte natus, videtur ad miscellaneos liquores pertinere. Vidi quidem, sed in variolis, inflammationem concepisse, cum capillos ob insectorum copiam minister ambussisset. Inest tamen in eo lymphæ species, & in aqua etiam frigida continuo solvitur, etsi utique iterum absque mora fundum petit *u*\*\*). Effusum per moram perinde solvitur, tunc vero resorptum in sanguinem redit.
- ibid. l. 13. *adde* sericum, telam aranæ, succum acidum formicæ, erucarum.  
 ibid. l. ult. *adde* Sed etiam, quod minus sperares, urina sua per signa conspicua non raro vomitu *e*\*\* ) reddita est, cum arteria emulgens vinculo intercepta fuisset; salivam etiam urinosam *e*\*\*\*), & sudores urinosos dicemus, qui de hominibus exhalant, in quibus legitimæ lotii viæ obstructæ erant *e*\*\*\*).
- p. 369. l. 8. *post* abundaverit *adde* qui aberrat.  
 ibid. l. 11. *post* compensari *adde* Salivatione, ut vocant, invalescente, alvus siccat, urina parce fluit  
 ibid. l. antepen. *post* obducitur *adde* aut oleo confricatur.
- p. 370. l. 4. *post* supprimit *adde* in meo dudum mecum consenscente morbo, quoties urinæ nimia copia mihi molesta est, opii vis eam moderatur, & subito ad quartam partem, etiam ad decimam reducit, dum perspirationem potenter movet.
- p. 371. l. 5. *post* regurgitavit *adde* inque puero, cui penis conferbuerat.  
 ibid. l. 18. *adde* Vir nobilis, ex militibus CAROLI XII, quem in perniciosis expeditionibus Norwegicis sequutus fuerat, idem elegantissime doctus, magnus

*b*\*) LASSUS p. 23.

*c*) *adde* LASSUS.

pag. 366. lin. 11. *ad verbum* lymphatica *adde* not. *k*\*). Eo refert Cl. LASSUS.

*u*\*\*) BORDEU *malud. chron.* p. 579. ROEDERER *progr.* 1758.

*e*\*\*) SAGAR *System.* p. 317.

*e*\*\*\*) Id. ib.

*e*\*\*\*\*) Dicentur L. XXVI.

pag. 369. not. *h*) *adde* BRASSAVOLUS in principe.

pag. 370. *ad verbum* supplet in *textu* lin. 10. *adde* not. *s*\*) SYDENHAM.

ibid. not. *æ*) *adde* Plura dicemus Libro XXVII.



HOMERI admirator, meus inprimis amicus, cum ad beatum senium pervenisset, subito diro morbo suffocatus est, cum urina suppressa in cellulosa linguæ telam se effudisset, ut ea monstrofe tumens spiritum interciperet.

pag. 371. l. 19. *post* exiit *adde* multis in exemplis.

p. 372. l. 3. *adde* Urina retenta per cutem ab axillis ad inguina sudavit, cum viæ naturales clausæ essent *t*\*).

ibid. l. 19. *adde* Fluor albus sponte subnata salivatione solutus *u*\*).

p. 373. l. 1. *post* genere *adde* cum lymphâ mistum,

ibid. l. 2. *post* exiit *adde* & per alvum. Sic frequenter & salubriter pus vario-  
losum vomitu rejectum fuisse lego, & ne quis vias novas & vitiosas huic me-  
tastasi apertas fuisse objiciat, in empyemate verum pus de vena incisa flu-  
xisse BELLOSTIUS testis est. Frequens malum est, in conjunctivæ tunicæ  
palpebrarum glandulis pus deponi, ejus simillimum, quod ab impura vene-  
re per urethram educitur.

ibid. l. 7. *post* exit *adde* etiam per plusculos menses.

ibid. l. ead. *post* diarrhoeam *adde* per vomitum alias, ut etiam acescentem natu-  
ram retinuiſſet

ibid. l. 10. *post* oblinivit *adde* Idem in cellulosa telam effusum speciem absces-  
sus fecit, in mesenterio, in inguine, in musculorum artuum intervallis: idem  
in pulmones depositum fuit, & demum per sudorem excretum. Per faciei  
pustulas effluxit idem, neque rarissime *l*\*).

p. 374. l. 8. *post* humoris *adde* in oculo

ibid. l. 11. *post* porro *adde* ut adoleſcunt,

*t*\*) Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 10. obs. 73.

*u*\*) LANZON E. N. C. Dec. III. ann. 9. 10. obs. 140.

*l*\*) Journal des Savans, 1690.

## S E C T I O II.

## ORGANORUM SECRETIONIS, SIVE COLORUM, FABRICA.

- P** ag. 375. l. 5. *post* humorem *adde* oculi  
 p. 376. l. 20. *post* evidentissime *adde* hæ fibrillæ  
 ibid. l. 24. *post* parotis *adde* & lacrymalis,  
 p. 377. l. 8. *post* magnas *adde* non ea undique glandularum conglomeratarum  
 similis.  
 p. 380. l. 6. *post* cochleis *adde* in istis ipse etiam SWAMMERDAMIUS :  
 p. 382. l. 5. *lege* Si in ejusmodi glandulosum agmen nunc oculos dimiseris,  
 videbis acinorum viciniam sensim laxari, ut demum cet.  
 ibid. l. ult. *adde* ut in rene nimis pene felix LITTRIUS, qui & renis solitarias  
 glandulas vidit, & cujusque nervum, & arteriam, & venulam, & excretor-  
 ium ductum.  
 p. 388. l. 16. *lege* glomere  
 p. 390. l. 8. *post* comprehendit *adde* & quas non bene clari viri pro dilatatis  
 glandulis habuerunt a\*).  
 ibid. l. 11. *post* ovaria *adde* in omnium viscerum extima planitie, & peri-  
 tonæi.  
 ibid. l. 13. *lege* in exteriori ambiente membranæ costas succingentis g) cellulo-  
 sitate, in pulmone h), hepate.  
 ibid. l. ult. *post* manavit *adde* inque aliis exemplis de lumbis, de abscessu supra  
 umbilicum.  
 p. 391. l. 13. *post* pertineret *adde* In utraque maxilla Cl. HEUERMANN u)  
 ibid. l. 14. *post* materies *adde* Ab hepate hydatides fuerint, quas ægri vomitu  
 & per alvum rejecerunt.  
 p. 392. l. 20. Hypothefin Cl. viri--- pro vermium opere habuit *lege* Hy-  
 datides, quas pro vermium opere Cl. TYSON habuit k), pertinent ad miri-  
 ficum animal, nuper etiam a Cl. PALLAS descriptum, cujus pars cylindrus  
 est, pars bulla.  
 p. 393. l. 19. *post* uti *adde*  $\frac{1}{8}$   
 ibid. l. 22. *lege* uti

pag. 375. not. 2) *speçtat ad verbum* depluit in *textu* lin. 8.pag. 377. not. n) *lege* WINTRINGHAM p. 213.a\*) Refert etiam Cl. HEUERMANN *Untersuchung*, p. 302.

u) l. c.



pag. 393. l. 28. *lege* pedes 390 p), describet in minimo vasculo pedes  $19\frac{1}{2}$ , five lineas 2508: in folliculo vero  $\frac{2508}{235225}$ , five paulum supra centesimam lineæ partem; atque adeo tribus cet.

p. 395. l. 6. *lege* valens

p. 398. l. 14. *post* vesiculis *adde* stagnat,

p. 399. l. antep. *post* reperiuntur *adde* & in lepore marino a Cl. BOHADSCH visæ sunt.

p. 401. l. 14. *post* folliculis *adde* aliud in glandulis ventriculi struthiocameli p\*).

p. 402. l. 2. *post* coalescunt *adde* Ejusmodi sunt sinus mucosi piscium apud LORENZINUM.

p. 405. l. 20. *lege* metatarfi

p. 409. l. ult. *lege* continuis fere quinquaginta diebus

p. 411. l. 4. *adde* alteriusque affinis animalis, quod BUFFONIUS *Zibet* vocat.

ibid. l. 7. *adde* Ad hanc classẽ pertinent cryptæ odoriferæ, quæ in proprios faccos castoreum, unguentum Zibethi & gliris moschati, componunt. Hæ enim glandulæ sæpe simplices, alias tamen, & in animali Zibetho affini ad genus compositarum referendæ, per proprios ductus unguen suum in magnam caveam deponunt, in qua asservatum vi musculari, etiam adjuvante mechanica demum frictione educitur.

ibid. l. 20. *post* viscera *adde* & membranas

ibid. l. antepenult. *post* generant *adde* membranæ aquam, lympham.

p\*) VALISNERI *anatomia d'un struzzo.*

pag. 411. not. c) *speciat ad verba reperta sunt in textu lin. 3.*

## S E C T I O III.

CAUSÆ QUÆ FACIUNT, UT IN DEFINITÆ FABRICÆ ORGANO SUUS CONTANTER HUMOR DE SANGUINE SEPARETUR.

- P** Ag. 412. l. 7. *post* accedendum *adde* Iterum monitum hic volo lectorem, non vera & evicta me proponere, sed ea, quæ a viris doctis in his tenebris probabiliora dicta sunt.
- ibid. l. 11. *adde* nisi raris cum conditionibus.
- p. 414. l. 2. afferri *lege* demonstrari
- ibid. l. 21. *post* potentius *adde* humor
- p. 415. l. 5. *adde* Nempe in caput nonnullæ particulæ viscidæ veniunt, in abdomen nonnullæ volatiles descendunt, sed in caput plures volatiles, imbecillæ plures & aquosæ in abdomen. Sed vide alias aut dicta t\*\*), aut dicenda t\*\*\*).
- p. 416. l. 21. *lege* inter uveæ vero membranæ floccos,
- ibid. l. antep. serum *lege* semen
- p. 418. l. 8. *lege* proxime
- p. 420. l. 17. *post* excludet *adde* hætenus
- ibid. l. 18. *post* præcludantur *adde* crassiores dico, non viscidas particulas.
- p. 421. l. 15. *lege* longitudinem
- p. 422. l. 7. *post* colligantur *adde* ut alaudas Lipfienfes intra unicum diem STALLIUS pinguescere scripserit.
- p. 424. l. 22. *post* sunt *adde* penicillorum arteriolæ
- ibid. l. 23. *post* innotuerunt *adde* ab Ill. viro J. F. LOBSTEIN nuper confirmatæ.
- p. 425. l. 10. *lege* & inter se, & cum trunculo parallela, progrediuntur.
- p. 426. l. 8. *post* cingunt *adde* alium denique, qui pulcherrimus in vitreo corpore piscium ex duabus divaricatis arteriis nascitur. Porro circuli vasculosi, ex quibus circulus vitelli, cet.
- ibid. l. 12. ut arteriolæ a truncis ---- se immittant *lege* aut sub quibus a truncis suis rectis natæ, suas pariter in venas se immittere dicuntur, eas quidem cet.
- p. 428. l. 15. etiam, *lege* molecularum

t\*\*) Libr. V.

t\*\*\*) Libr. X. c. I.

pag. 427. not. c) *lege* Oper. min. II. p. 345.



pag. 428. l. 22. *lege* Ita per porum secundæ classis molecularum capacem,  
excluso cet.

ibid. l. pen. inconspicua *lege* moleculæ inconspicuæ

p. 430. l. 9. *post* angustum *adde* flexilemque

p. 436. l. 14. *post* fetus *adde* Hæc uti per mea experimenta didici, ita gaudeo  
hactenus a summo viro Johanne SWAMMERDAM occupata esse, ut ranularum  
juniorum bilem inspidam esse annotaverit.

pag. 438. l. 20. *lege* sensilissimorum nervorum duorum colliculorum in parte  
inferiori nascentis glandis positorum, tunc semen non absque violentia exsilit.

ibid. l. 24. *lege* comperies.

p. 440. l. 11. *lege* humor

ibid. l. pen. famosa *lege* lacrumosa

p. 442. l. 10. *post* separari *adde* inspidos passim & inodoros flores esse, semina  
aromatica; alias in foliis aroma habitare, semina fatua esse.

p. 443. l. 4. *lege* excernantur,

p. 444. l. 16. *post* totusque *adde* in receptaculo

p. 445. l. 12. *post* quæ *adde* in alvi fæcibus

p. 446. l. 2. *dele* causa

ibid. l. 12. *adde* In animali zibethico duo sunt sacci unguentiferi majores, in  
eos minores alii aperiuntur, in eos cryptæ simplices a\*).

p. 447. l. 18. muro *lege* contractili villo

ibid. l. 20. *post* idem *adde* ductus

p. 448. l. 12. *post* vi *adde* incitata,

ibid. l. 15. *lege* copia

p. 449. l. 2. *lege* idem mucus aquula mera est.

ibid. l. 12. *lege* sed dilute flavum

p. 450. l. 8. *lege* folliculo

ibid. l. 18. *post* replet *adde* aprorum & cervorum.

p. 452. l. 3. *post* latex *adde* in venulas

ibid. l. 12. *post* quam *adde* in

ibid. l. 26. *post* demum *adde* halitus

p. 453. l. 7. *post* massæ *adde* cibariæ

p. 454. l. 19. *lege* colligi

ibid. l. 23. humanitatis *lege* novi animalis

p. 456. l. 16. *lege* ex America r)

p. 459. l. 8. *lege* interceptarum

a\*) Apud BUFFON.

pag. 453. not. g) *adde* BUFFON *histoire naturelle* T. V. p. 21.

- pag. 459. l. 13. *post aliquibus adde* harum conditionum  
ibid. l. 17. *post infinitum adde* variari, &  
p. 462. l. 13. *lege* halitu.  
ibid. l. ult. *lege* biliarem  
p. 463. l. 18. *post intortos adde* vehitur  
p. 464. l. 20. *post celeremque adde* Aucta sanguinis penu per transfusionem,  
aucta lotii ubertas.  
p. 465. l. 12. *adde* Et omnino solus calor aquam in mucum, hunc in oleum  
aut resinam excoquit.  
p. 466. l. 14. *lege* cordi, ventriculo, testis, lieni, hepatis assignat,  
ibid. l. pen. *lege* subituras  
p. 470. l. 28. *post particulis adde* acceptum  
p. 473. l. 9. *lege* qui  
ibid. l. 10. *lege* plena  
p. 474. l. 11. *post continuo adde* ea vascula  
p. 479. l. 14. *lege* vitrioli  
p. 484. l. 7. *lege* yir Cl. caute ad nervos cet.

pag. 461. not. 2) *lege* Serum in hypothesi LEALIS & BOERHAAVII.

pag. 480. not. u) lin. ult. Idem *lege* BUFFON.

pag. 484. not. f) *adde* L. XXIII.

---



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS

THE HISTORY OF ARTS

THE HISTORY OF ARTS

THE HISTORY OF ARTS

THE HISTORY OF ARTS

THE HISTORY OF ARTS

THE HISTORY OF ARTS

THE HISTORY OF ARTS

THE HISTORY OF ARTS

THE HISTORY OF ARTS

THE HISTORY OF ARTS

THE HISTORY OF ARTS

THE HISTORY OF ARTS

THE HISTORY OF ARTS

THE HISTORY OF ARTS

THE HISTORY OF ARTS

THE HISTORY OF ARTS

THE HISTORY OF ARTS

THE HISTORY OF ARTS

THE HISTORY OF ARTS

THE HISTORY OF ARTS

AUCTARIUM  
AD  
ALBERTI HALLERI  
ELEMENTA  
PHYSIOLOGIÆ  
CORPORIS HUMANI.

*FASCICULUS TERTIUS.*

RESPIRATIO. VOX ET LOQUELA.



LAUSANNÆ HELVETIORUM,

Sumptibus JULII HENRICI POTT ET SOCIOR.

---

M. D. CC. LXXXII.



A TREATISE

ON

ALBERTUS MAGNUS

ELEMENTA

PHYSIOLOGIA

CONCORDIA HUMANI

ORGANISMI

ET



PER

FRANCISCUM

---

MDCCCXXXIII

# ELEMENTORUM PHYSIOLOGIÆ

CORPORIS HUMANI.

TOMUS TERTIUS.

## PRÆFATIO EDITORIS.

CUM jam id ageretur, ut sextum, septimumque novæ *Elementorum Physiologiae* editionis volumen de prelo prodirent, obiit morbo fractus atque laboribus Illustris Auctor, cujus summum ingenium, indefessum in inquirendo vero ardorem, vastissimam eruditionem, innumera de re medica merita tota Europa admirata est, grati nepotes recordabuntur. Eo casus iste acerbior accidit, quod nondum essent absoluta duo ejus præclarissima opera *Bibliotheca medica*, atque nova *Physiologiae* editio.

Illam absolvat, qui tanto labori parem se sentiet. Hanc ad finem perducere eo libentius in me suscepi, quod extet in adversariis Ill. Defuncti immensa annotationum physiologicarum copia, quibus novam editionem ditare sibi proposuerat, ut nihil aliud mearum partium futurum sit, quam earum quamque suo loco inferere. Cum enim per decem fere annos summa ejus familiaritate usus fuerim, ægrotantem ad diem usque supremum curaverim; ita mihi manuscripta ejus, paucis præterea legibilia, nota reddidi, ut, quod alteri foret difficillimum, id mihi gratum futurum sit atque jucundum. Neque laudis aliquid ex ea re mihi vindico. Ratus sum, id me manibus viri debere, quem dilexi ut patrem, ut aliquod saltem summi mei amoris erga illum monumentum extaret.

De hoc volumine pauca sunt, quæ dicam. Multa in eo mutavit, multa addidit HALLERUS, præsertim in iis, quæ æris spectant naturam, atque ejus in humanum corpus efficaciam. Ill. Auctori mens erat, nuperorum præclara inventa de vario aëre fusa ac dilucide pertractare, utpote cujus doctrina magni sit, in explicandis respirationis phænomenis atque utilitate, ponderis. Dolendum vero, hanc tractationem in novissima ejus tempora incidisse, in quibus propter soporem fere perpetuum, atque languorem, quo premebatur, adeo non valuit typographorum errores, eo graviore, quod optimi senis tremula manus litteras aut nullas aut pessimas pingeret, corrigere, ut in pluribus locis textus penitus corruptus esse videatur. Totas enim sententias aut nullo nexu coherentes, aut quæ intelligi minime queant, reperies. Cui malo non amplius licuit medicinam adhibere. Ignosce hæc, Benevole Lector, neque summæ operis



aliquid inde aut dignitatis, aut pretii detractum esse existimato. Potius Ill. viri memoriam reverere, qui tuis commodis inserviendi desiderium, atque laboris amorem non nisi cum vita deposuit.

Berna, d. XVI. Mens. Ian. c10l0ccLXXVIII.

## LIBER OCTAVUS.

### RESPIRATIO.

#### SECTIO. I.

##### THORAX.

**P**ag. 4. l. 14. *adde* In medio corpore vertebrarum cavea reperitur *b\*)* tenaci humore plena.

p. 5. l. 6. *lege* tredecim in dorso sunt.

ibid. l. 10. *adde* rarius undecim.

ibid. l. 11. *adde* Avibus pauciores, quam homini, costæ sunt, in earum maxima utrinque septem, nempe in struthiocamelis.

Quadrupedibus ad 11, quas in vespertillione BUFFONUS numerat, ad 20 utrinque in elephanto ascendunt, plerumque tamen plures, quam duodenæ sunt, etiam in pygmæo tredecim. Quadrupedibus frigidis 18 ad 24. Piscibus numerosæ ad usque octogenas.

ibid. l. 12. *legæ* Commune

p. 6. l. 5. *lege* & caveam aliquam pro pulmonibus fundant.

ibid. l. 15. *post* vocant *adde* quam neque ego vidi, neque TREWIUS, articulatione aliqua mobili cum parte ossea committi

ibid. l. 18. *post* offescere *adde* & fero id malum accidit.

ibid. l. 19. *post* fuisse *adde* Et plerumque ab ea degeneratione respiratio læditur. Visæ sunt etiam in junioribus, & in septemdecenni puella osseam naturam induxisse.

pag. 4. not. b) *adde* Journ. des savans, 1699. n. 21. HUNAULD diff. de ancylas. 1742. RUYSCH Thes. V. T. III. f. 1. 2.

*b\*)* RUYSCH Thes. V. T. III. f. 1. 2. Thes. IV. n. 63.

pag. 5. not. n) *adde* EDW. TYSON The anatomy of a pigmy.

pag. 6. not. a) lin. 7. *adde* Durissimas subinde in mente captis reperit GREDING in Adversar. LUDWIGII, III. p. 4. Duræ in femina, cui vena cava ossea facta, CRUWEL cord. & vas. ossificat.

- pag. 7. l. pen. *lege Quinta*  
 p. 8. l. 7. *lege Septimæ*  
 ibid. l. 16. *post inculpatur adde ut antèrius nullus sit.*  
 p. 11. l. 17. *lege nutasse*  
 ibid. l. ult. *lege pene omnibus , quantum cet.*  
 p. 12. l. 6. id *lege in*  
 ibid. l. 15. una *lege ima*  
 ibid. l. 17. definit *lege protegit*  
 p. 13. l. 12. *adde Quarta ab hac prima sterni parte alteram totam in adultò ho-*  
*mine distinctam fuisse Cl. VELSE vidit.*  
 ibid. l. antepenult. *lege Basileæ.*  
 ibid. l. ult. *adde & nuper Cl. vir G. van DOEVEREN*  
 p. 15. l. 2. *post fine adde appendicem*  
 ibid. l. 9. *post longitudo adde SANCTORIUS &*  
 ibid. l. 8. *post negat adde nimia*  
 p. 19. l. penult. tum super eam & infra *lege atque super eam costam decrescat ;*  
*& infra*  
 p. 22. l. 2. *lege sexcentarum*  
 ibid. l. 3. *post tolerari adde & ictus malleorum eo minus incommodos esse , quo*  
*incus ponderosior fuerit.*  
 ibid. l. 11. *adde Lego tamen , cum reus in Anglia respondere recusaret , impo-*  
*fitas ex lege quadringentas libras eum ægre supportasse ; periisse demum ,*  
*eum male pertinaci nova pondera imponerentur.*  
 p. 25. l. 2. *lege minora*  
 p. 26. l. penult. *lege augeri*  
 p. 27. l. 24. *lege Margines*  
 p. 28. l. 24. *post cocti adde musculi.*  
 ibid. l. antepen. *post animalibus adde etiam cetis*  
 p. 29. l. 5. *lege cujus fibris idem ,*  
 p. 30. l. 12. *lege continuata.*  
 p. 31. l. 3. *dele nudum*  
 ibid. l. 5. *lege in quo spatio soli cet.*  
 ibid. l. 10. *post contrario adde cum externis*  
 p. 35. l. antepen. *adde Tanta vi musculi intercostales in equò egerunt , ut ba-*  
*culum costis interpositum fregerint u\*).*

pag. 13. not. u) *lege p. 7.*

pag. 14. not. t) *adde Longa & trifida GREBING ap. LUDWIG advers. III. p. 4.*

u\*) *DUVERNEY posth.*



pag. 37. l. 11. *lege* sibi

ibid. l. 12. *adde* Hugo GOURAIGNE g\*)

p. 38. l. 16. *adde* inter jatromathematicos etiam Cl. PEMBERTON, inter experimentorum auctores Cl. ARNSTEIN. Nam in Cl. TRABUCCHI experimentis multa sunt, quæ intercedunt, ne ea aut probare ubique possim, aut velim refutanda sumere.

p. 39. l. 3. *lege* sit

ibid. l. 15. *dele* debilitabitur ejus actio ex ea ratione, & *lege* non invertetur ejus actio, debilitabitur autem cet

p. 40. l. pen. *post* dum *adde* costa prima

p. 41. l. 2. *lege* uti 1 ad 8

ibid. l. 5. *post* & *adde* ductam in eam firmitatis prærogativam

ibid. l. 5. *post* intercostalis *adde* inter

ibid. l. 26. *lege* Plena

p. 42. l. 12. semper *lege* eadem.

p. 43. l. 9. quod hic observari oportet, *lege* quod inde sequitur.

p. 44. l. 9. *post* eas *adde* inferiores

ibid. l. 12. *post* cur *adde* Natura

ibid. l. 16. motus *lege* ortus

p. 49. l. 19. *adde* Duos etiam vidit Cl. P. A. BOEHMER

p. 49. l. ult. *lege* & utramque vocem

p. 50. l. 19. *adde* & Ill. CALDANUS

ibid. l. ult. *adde* Caput a dextro obliquo suo minore ad latus ductum sinister mastoideus restituit p\*)

p. 51. l. 16. Omittunt hanc ---- me legisse omnes *lege* Hactenus adeo mastoideus poterat pro extensore numerari capitis, uti reperio COWPERUM numerasse, & Cl. le CHAT de la SQRDIERE, & QUELMALZIUM & Antonium PETIT.

Ab ejus tendine fibræ ad cartilaginem ensiformem euntes proprium fere musculum faciunt q\*).

g\*) De respiratione.

pag. 37. not. o) *adde* GOURAIGNE, SAUVAGES cet.

ibid. not. y) *adde* de natura homin. p. 32.

pag. 38. not. a) *adde* Nuper etiam Montpelienfes contra Francisci de SAUVAGES placita, ut video ex DARJES disp. de respiration.

Ibid. not. c) *adde* tum in Oper. min. T. I.

pag. 43. not. c) *adde* Confer, si videretur I. de respiratione in operum minor. T. I. Lausann. 1762. 4.

p\*) GOVEY, p. 183. 184.

q\*) P. C. FABRICIUS method. secund. II. ad p. 20.

- pag. 53. l. 19. *lege* inseparabili  
 ibid. 53. 21. *lege* curvatura  
 p. 54. l. 16. *lege* quam cum binis prioribus supremis  
 p. 57. l. 10. *adde* Dixi plures esse recti musculi partes. Vidit olim RHODIUS, vidit Cl. BOEHMER, teretem muscolum ab eo ad brachialem internum accessisse. Vidit Cl. olim noster HUBERUS fasciculum alium medium inter ejus duas partes, clavicularem & sternalem, alias a prima costa & a secunda, alias a costa ultima & a prima, aque sterno, usque ad cartilaginem quintæ costæ ortum, tegentem muscolum pectoralem, eundem decussantem, eique insertum.  
 ibid. l. 20. *post* stabile *adde* aliquod  
 p. 58. l. 15. *post* potius *adde* laboribus  
 pag. 59. l. 17. is *lege* inde.  
 p. 61. l. 19. *lege* iens  
 ibid. l. 21. *adde* Quater ad occiput ascendisse MORGAGNUS vidit o\*).  
 p. 62. l. 16. *lege* remotus  
 p. 63. l. 18. *lege* Superior quidem & minor *columna* ad eam conjunctionem cet.  
 d. 64. l. 1. *post* indigeat *adde* uti neque ALBINUS existimavit indigere, neque MORGAGNUS.  
 p. 65. l. 13. *adde* Corporis universi super pelvim rotationem, quæ fit consentiente obliquo externo unius lateris, & externo alterius lateris, olim FALLOPIO dictam & CAJO 2\*), & GLISSONIO 2\*\*), demum & RIOLANO 2\*\*\*).  
 p. 67. l. 2. *adde* Paulo aliter nuper Cl. LIEUTAUD. Aponeurosis posterior dat primam laminam anteriorem, deinde ad oram anteriorem musculi recti finditur in duo folia: prius abiturum in aponeurosin majoris obliqui: alterum in aponeurosin transversi. Illud legit duas tertias musculi recti, & terminatur in ultima intersectione. Lamina posterior non descendit infra umbilicum. Pars anterior, inferior, obliqui minoris tertiam inferiorem aponeuroseos recti partem tegit.  
 p. 68. l. 7. *post* processibus *adde* lumborum  
 p. 70. l. 4. annulum habet *lege* funiculum transmittit.  
 p. 71. l. 6. *post* constituendum *adde* rectus

o\*) *Advers.* II. p. 38.

2\*) Apud RIOLANUM p. 337.

2\*\*) Nuper Cl. SABBATIER *Anat.* I. p. 254.

2\*\*\*) In venere, in iis, qui natibus incedunt, p. 325. 326.

pag. 66. not. x) *adde* SABBATIER I. p. 258. quæBERTINO inventam tribuit annotationem, sed ALBINI jura antiquiora sunt.



- pag. 72. l. 11. *post* Idem *adde* Similia etiam passim, sed singula fere exempla videg citari apud CABROLIUM, & amicos nostros P. C. FABRICIUM & WILLICHIUM *h\*)*. In sternum aponeurosi continuatum vidit Cl. SABBATIER *h\*\*)*.
- p. 73. l. 21. *adde* tunc imprimis apud Cl. CHARDENON *s\*\*\*)*, quando obliqui corpus circumagunt *s\*\*\*)*, ut concorditer obliqui & recti, tanquam musculus triceps, agant *s\*\*\*\*)*.
- p. 74. l. 8. *post*. aliquid *adde* & imperfectum
- ibid. l. antepen. *post* producitur *adde* Sic ab aëre vitio nato *f\*\*)*.
- p. 77. l. antepen. *post* primo *adde* transverso
- p. 78. l. 4. *adde* Arcus etiam duos ROEDERERUS dixit, internum a capite tertio ad processum transversum primæ lumborum vertebræ; externum ab insertionem in primam vertebra dorso, ad ultimum apicem costæ tertiæ euntem, tamen ut fateatur, alterutrum arcum sæpe deesse. Prima vero, quam dixi, portio sæpe cum quadrato fibras aliquas confundit.
- ibid. l. 10. *lege* qui psoam transmittit.
- p. 82. l. 3. *post* distare *adde* Paulo aliter iterum SANTORINUS.
- ibid. l. 12. *adde* Eam arteriam raro exemplo MORGAGNUS fere per foramen tendinei centri transivisse vidit.
- p. 83. l. 3. *post*. hepaticis *adde* Cl. etiam HUBERUS vidit, duo fuisse foramina, per quorum anterius idem magnus truncus venarum phrenicarum transit, per alterum vena cava.
- ibid. l. 5. *lege* reperimus
- ibid. l. 14. *post* dorsalibus *adde* natus, &

pag.

*h\*)* In *disputat. inaugurali*.

*h\*\*)* *Anat.* I. p. 255.

*s\*\*)* *Mémoire de Dijon.* T. I.

*s\*\*\*)* p. 110.

*s\*\*\*\*)* SABBATIER *Anat.* T. k.

p. 74. not. b) *adde* Nihil carnosum in piscium spinosorum diaphragmate esse VICQ D'AZYR

*Mémoire des sav. étrang.* T. VII. p. 29.

*f\*\*)* Apud GREDINGIUM in LUDWIGII *Adversar.* III. p. 4.

pag. 77. not. g) *adde* SANTORIN. *posth.* T. X.†

ibid. not. n) *adde* Appendices duabus non plures habet SANTORINUS *posth.* T. X.

pag. 79. not. i) *adde* Unicam SANTORINUS T. X.

ibid. not. u) *adde* Pulchre expresserunt ALBINUS & SANTORINUS.

pag. 80. not. r) *adde* SANTORIN.

pag. 81. not. d) *adde* SANTORIN. c.

ibid. not. g) *adde* SANTORIN. d.

ibid. not. m) SANTORIN.

ibid. *ad verbum* appendice *in textu* lin. ult. *adde* not. o\*) Alæ sinistræ fibræ paulo aliter apud SANTORIN. l. l.

pag. 83. l. 18. *post septi adde transversi*

p. 85. l. 7. *adde retrorsum minus.*

ibid. l. antep. *adde* Cl. TRABUCCHI planum fieri negat, quod non viderit ipse;  
sed ego & planum, & deorsum convexum vidi.

p. 86. l. penult. *lege* extrorsum,

p. 87. l. ult. *adde* Et vicissim in expiratione tumere eandem & repleri.

Non vidi, alius tamen testis adest, etiam aortam arteriam inter carneos diaphragmatis fasciculos constrictam fuisse, dum septum transversum vehementer descendebat.

p. 89. l. 8. *post immiscuisse adde* Testis hujus rami Gottingæ ostensi est Cl. HUBER *m*\*).

p. 90. l. 7. *adde* Cl. viri CAMPERUS & COOPMANS viderunt, per ipsam venam subclaviam inter ejus membranas descendisse.

ibid. l. 16. *post* ramo *adde* furculus

p. 91. l. 18. *post* longo *adde* colli

p. 92. l. antep. *lege* vehementer compresso

p. 93. l. 1. *lege* quoad earum aliquid ad hunc musculum pertinet;

p. 94. l. 13. *adde* Dextram ex renali sinistra MECKEL *u*\*).

p. 95. l. 4. *lege* inosculatos.

p. 96. l. 6. *lege* furculi tendunt superiores; alter *p*) ex quarto fere cet.

p. 97. l. 13. retro *lege* pone

p. 100. l. 19. *adde* & demum bronchialem dextram *a*\*).

p. 101. l. 11. *post* sequuntur *adde* duæque hic arteriæ uni venæ respondent.

p. 202. l. 14. *adde* Arterias intercostales sex ex tribus trunculis ortas vidit Cl. FOHLIUS *e*\*).

ibid. l. 19. retro *lege* pone

ibid. l. 20. retroque *lege* poneque

p. 103. l. 8. *post* ligamentum *adde* hepatis

p. 105. l. 6. *lege* & dextri cum sinistris, & utrique cum diaphragmaticis cet

pag. 83. not. *h*) *adde* Apud SANTORINUM l. c. in utroque latere.

pag. 88. not. *i*) *adde* GOURAIGNE de respiration.

ibid. ad verbum principis in textu lin. 9. *adde* not. *k*\*) PRESSAVIN.  
*m*\*) In tract. de medulla spinali.

pag. 93. not. *i*) *adde* Cl. CAMERARIUM in tribus dissert. medic. 1694. 8.

*n*\*) Epist. ad me 121. p. 356.

*a*\*) HUBER Act. Helvet. VIII. p. 81.

*e*\*) Observ. angiolog.



- p. 106. l. 8. *lege* aut duos, aut tres ramos intercostales  
 ibid. l. 14. *lege* & alii cum mammariis circuli  
 p. 107. l. 13. *post* vitulo *adde* equo secundum LANCISIUM  
 ibid. l. 15. *post* rarissimæ sunt *adde* In bove subinde duas esse venas azygas le-  
 go, sinistram in coronariam aperiri, dextram in venam cavam inferiorem  
 b\*). Criceto duæ sunt, sinistra major b\*\*).  
 ibid. l. penult. ea *lege* eo  
 p. 108. l. 11. *retro lege* pone  
 ibid. l. 15. *post* membranis *adde* venulas  
 ibid. l. 17. *lege* Fuit, ubi vena sine pari secundam bronchiale cet.  
 p. 109. l. 3. *lege* azyga  
 ibid. l. 17. *post* intercostales *adde* arteriæ  
 ibid. l. pen. vena *lege* venas  
 p. 110. l. 3. *post* corpore *adde* vertebrarum  
 ibid. l. 15. *post* incidi *adde* Denique est, ubi ad renalia usque vasa major esset,  
 quam vena cava.

## S E C T I O II.

## PARTES THORACE CONTENTÆ.

- P** Ag. 114. l. 13. COWPER *lege* CAMPER  
 p. 115. l. 8. *lege* ut in tres, aliquando etiam in quatuor, cet.  
 p. 116. l. 18. *lege* exteriorem  
 ibid. l. 20. *adde* Antequam enim thymum vulneraveris, nihil vere cavi adest,  
 præter intervalla lobulorum; ubi læsisti, aër in cellulofam telam subiens ca-  
 veam facit, quam natura non præparavit. Quæ vero cavea videtur, lobu-  
 lorum ea intervallum est.  
 p. 118. l. 8. *adde* Vasculum semel J. Adam KULMUS visum potuit, cum pel-  
 lucidum fuerit, lymphatici generis fuisse.  
 ibid. l. 19. *adde* Tamen magna pars thymi extra pectus est in jugulo.  
 p. 119. l. 13. *post* insident *adde* In iis cellulis hydrops aliquando visus est, de  
 eo genere, quod veteres *ανατομία* dixerunt, ab eo diversus, qui fit aquis  
 in pectoris caveam effusis.

b\*) BOURGELAT *Supplément*, p. 102.b\*\*) SULZER *Versuch einer Naturgeschichte des Hamsters*, p. 63.

p. 120. l. 3. *post* pertinet *adde* magis, quam alios vapores, alcalinæ naturæ indicia præbere, & syrupum violarum tingere LASSUS x\*\*\*).

In febribus frequenter pulmonem, pleuram, pericardium, cor, ejusmodi obduci crusta ex lymphâ facta Cl. LIND x†). Idem vitiose cet.

ibid. l. 7. *post* lateret *adde* Cujus etiam mali innumerabilia exempla collegi. Sebacea lardosa crusta pulmonem obducens & pleuram z\*).

ibid. l. 17. *adde* Hydrargyrus in arteriam pulmonalem ovis injectus per pleuram exsudavit d\*).

p. 122. l. 11. *adde* Hæc pulmonis cohæsiō, post morbos inflammatorios pectoris & pulmonis, frequens subnascitur, ut eo loco ad pleuram adhærescat, quo inflammationem passus est. In asthma etiam & pectoris hydrope, pulmo ad latus affixus visus est.

Verum etiam in sanissimis hominibus pulmo pleuræ adhærens reperitur; potissimum etiam in adultioribus. Ita, ut practicas annotationes omittam, *Paulus* SORBAIT & *Jos.* LIEUTAUD, Archiætrorum comēs, & *H.* VYLHOORN; & olim *A.* PICCOLHOMINIUS atque *Franciscus* GLISSON, ut paucos ex multis recenseam. In animalibus id vitium rarius est.

p. 124. l. ult. *adde* In infante, cui equidem pectus pulmonis vitio apertum erat, aer in ejus cavo fuit z\*).

p. 125. l. 11. *lege* vulnere in pectus penetranti

p. 127. l. 6. *adde* Olim GALENUS in moribundo animali pulmonem a diaphragmate discedere per experimentum affirmavit tantum, quod tunc discessus in parva respiratione minor sit q\*).

p. 128. l. 20. *post* effunditur *adde* quæ pectus dividunt.

ibid. l. 22. *adde* Liceat hic perpulchrum nuperorum clariss. virorum inventum describere *Petri* CAMPERI b\*), & *J.* HUNTERI b\*\*). Aer nempe, qui tho-

pag. 120. *ad verbum* coagulabilem *in textu* lin. 1. *adde* not. x\*\*) LASSUS, Cl. COTUNUS exhalare scripsit, & vitio coagulabilem fieri *Ischiad. nervos.* p. 24. Apparet coagulabilem naturam a Cl. viro agnosci; verum humores nostri putrescendo ex coagulabilibus aquosi fiunt, nec vicissim.

x\*\*\*) Idem. p. 21.

x†) LIND *fever and infect.* p. 282.

z\*) GREDING *Advers.* III. p. 4.

d\*) *Amstelod. coll. priv. obs. anat.* II.

pag. 122. *ad verbum* religare *in textu* lin. 6. *adde* not. s\*) In tertia parte cadaverum adhærentem reperit GREDING apud LUDWIG III. p. 4. nempe in mente capitis, aliisque visceris captivis.

z\*) DINKLER apud SANDIFORT, *Bibliothek*, II.

q\*) *Admir.* VIII. 5.

b\*) *Mém. présentés*, VII. p. 320. *Hedendaagse Letter. Oefening.* IV.

b\*\*) *Philos. Transf.* LXIV.



racis cavea in avibus continetur, idem in avium alte volantium, ut in Pelicano, universa ossa longa alæ, femoris, in sterni caveam, in maxillam inferiorem, in vertebrale cavum, in cellulas cranii continuatur, quibus in ossibus nulla medulla est. Diaphragmate etiam perforato cavea thoracis cum abdominis cavo consentit. Sed etiam in cellulosas telas, collo, œsophago, & asperæ arteriæ circumpositas, aër exit, ut in universum cellulosæ caveæ, & pariter ventres & ossium tubuli, aëre ita replentur, ut ex uno cavo in omnia fere aditus sit.

In avibus minus alte volantibus aër in pauca ossa longa subit, ut in gallina solum in humerum, & demum in avibus vix se elevantibus pauca ossa cava aërem recipiunt.

In universum tamen hæc aëris in universas corporis caveas abundantia aves leviores reddit, eo leviores, quo calor earum insignior sit, utique adeo aër in earum corpore rarefit. Negavit vir clar. verum si velit negare, hunc fuisse naturæ præstitutum finem, rem tamen ipsam non negaverit, levitatemque, quæ non potest ab animali abesse, cujus areæ magna pars aëre fiat, qui milles & ultra partibus solidis levior sit.

pag. 129. l. 2. *post* Dudum adde aërem ex pulmonibus in pectus exire negavit -GALENUS c\*);

ibid. l. 10. *adde* & Cl. MASON.

ibid. l. 18. *adde* & Antonius PORTAL in suis experimentis, ut neque inspiranti animali, neque expiranti, pulmo pleuram deferat.

p. 130. l. 16. *lege* recolere

ibid. l. 20. *lege* pleuram

p. 131. l. 16. *post* aperueris *adde* In vivo homine exemplum est pulmonis de pleura fugientis continuo, cum pleura perfossa fuisset apud GOOCH.

p. 132. l. 5. *adde* Nuper etiam in Anglia clari chirurgi experti monuerunt, per vulnus receptum aërem inter pulmonem atque pleuram retentum pulmonem comprimere, respirationem reddere difficillimam, ut læso homini paracentesi subvenire necesse sit, qua infestus aër emittatur, de cujus inventi gloria etiam lites exarserunt. Is ergo pectoris status, quem adversarii nostri pro naturali habent, manifesto naturæ adversus est, ut etiam periculosum auxilium requirat.

In cadavere a Cl. GREDING inciso, cum aër vitio natus in pulmone esset, diaphragma de sua sede versus hepar detrusum fuerat z\*).

c\*) *Admir.* VIII. 5.

pag. 129. *ad* ALBINI nomen in *textu* lin. 9. *adde* not. k\*) Etiam in *nat. hom.* p. 41.

\*) Apud LUDWIG *Advers.* III. p. 4.

pag. 134. l. 3. *post* FLOYERI *adde* & Cl. CIGNÆ in pulmone cuniculi infesto aëre occisi.

p. 135. l. 10. *post* imitati sunt *adde* & vir justī apprime judicii Radulphus BATHURST.

ibid. l. 18. *adde* Deinde in morbo aërem inter carnem pulmonis & ejus velamen effusum vesicas excitasse vidi, neque exitum invenisse.

p. 137. l. 5. expedit *lege* exferit,

p. 139. l. 16. *adde* In animalibus quadrupedibus calidis pulmo mobilis est, qui thoracis caveam replet. In avibus pulmo fixus, pectoris cavea minor. In quadrupedibus frigidis pulmo, & pectus, & abdomen, male distinctas caveas replet, & in chamæleonte fere universum corpus. In piscibus frigidis plerisque pulmo nullus est, ejusque locum branchia tenent. Sunt tamen aliqui pisces pulmone vesiculoso, qualis serpentis, ut lampetra, alique chondropterygii (\*). In serpentibus pulmo partim vesiculosus est, partim carnosus. In vermibus & insectis plerisque pro pulmonibus asperæ arteriæ sunt, solitariae, nullo conjunctæ parenchymate.

Homini & quadrupedi *pulmones* peculiariter dextrum & cet.

p. 141. l. 5. *adde* Raris in exemplis plures, etiam septem lobi fuerunt.

ibid. l. 8. *post* fere *adde* sexfidum, nonnunquam

ibid. l. antepen. *post* mustela *adde* taxo.

ibid. l. ead. *post* catopardus *adde* animalia americana agouti & talpa.

ibid. l. penult. *post* herbivora *adde* sex lobos castor habet, & simia, aper tayassu, capra dorcas, sciurus, rattus aquaticus.

p. 142. l. 1. *dele* sex dorcas -- & sciurus.

ibid. l. 3. *post* phoca *adde* vespertilio, & *post* mianis *adde* tres buffalus.

ibid. l. 5. *dele* Simia septem --- & viverra.

ibid. l. 10. Pisces frigidi sanguinis --- tubuli bronchorum similes, *lege* In piscibus frigidis branchiæ sunt, plerumque sine pulmone, aliquando cum pulmone. Machinæ sunt in capitis cum collo confiniis cartilagineæ, cartilagine incisa & subdivisa in ramos sulcatos, quorum sulcorum quisque arteriam per totam longitudinem decurrentem habet, quæ in venam reflectitur parallelam arteriæ. Eæ branchiæ, dum animal vivit, perpetuo motu agitantur.

Vermes, qui in bufones ranasque convalescunt, & qui in insecta aquatica, ephemerarum exemplo, tum astaci, branchias habent hætenus branchiis piscium analogas.

Insectis meræ sunt asperæ arteriæ magno factæ artificio, a stigmatibus

(\*) In chondropterygiis VICO d'AZYR *Mémoire présent.* VII. p. 31.



natae, ramosae, quae ad omnia viscera animalis suis ramis tendunt. Est ubi filum mobile asperae arteriae circumdatur.

pag. 144. l. 15. *adde* Alia discrimina PORTALIUS annotavit, quae vero potissimum ad fetus historiam pertinent.

In avibus nonnullis aquaticis, ut in grue inque fero cygno, aspera arteria in propriam sterni caveam recipitur, in qua ea contra se ipsam ter reflectitur, ut nuper Cl. I. Targioni ROZZETTI confirmavit:

p. 145. l. 4. *amphibiis lege natantibus*

ibid. l. 10. *post leoni adde* aliquam tamen partem cartilaginis expertem Cl. SERRAO fecit,

ibid. l. ead. *post gentis est adde* castori huic de gente murina,

p. 148. l. 15. *post legi potest adde* & potissimum nuperi Britanni, quae sedes videatur esse morbi gravis *Croup*, seu suffocationis stridulae. Nisi forte, quam eo loco membranam dixerunt, potius mucus fuit membranae speciem imitatus, qualem saepe polypi asperae arteriae nomine clinici auctores descripserunt, qui figuram ejus arteriae exprimeret, & secreta redditus sit e).

ibid. l. ead. *dele* Plicae fecerunt --- WILLISIUS tribuerit.

p. 149. l. 8. *lege* filorum

p. 152. l. 6. *post visa adde* quae per eadem vascula etiam repleantur.

p. 154. l. 11. *post costam adde* Hanc obscuriuscule ERASISTRATUS dixit a GALENO citatus.

ibid. l. ult. *post prodit adde* iterum ab ERASISTRATO dicta,

p. 155. l. 20. *post miscentur adde* quas manifestas vidi.

p. 156. l. ult. *lege* Dextra, quae venae sine pari propago est, & ERASISTRATO dicta, per quam pus rejiceretur; eadem a I. Jacobo RAVIO cet.

p. 157. l. 1. *lege* azyga

ibid. l. 8. *adde* quamque ex azyga natam vidit SCHREIBERUS g\*)?

p. 158. l. 19. *post* 8910 *adde* majorem etiam in juvene P. Conradus FABRICIUS vidit, cum quo viro multum & res publica amisit, & ego.

pag. 147. not. o) *adde* Negat Cl. SABBATIER, II. p. 183. Difficulus tamen tot magnos viros in re facili errasse putes, & negantis innumera requiruntur experimenta.

ibid. not. s) *adde* In animali & decussatis & oppositis) (similes *Amstelodamenses* viderunt coll. priv. obs. anat.

ibid. not. u) *adde* *Amstelodamenses*.

pag. 155. *ad verbum* ossis in *textu* lin. 13. *adde* not. g\*) Ossis in pulmone COLUMBUS, p. 265.

ibid. not. h) *adde* Calculi tussi rejecti RUYSCH *Thef.* I. 38.

æ\*) *Loc. aff.* V.

g\*) *Epist. ad me data* 5.

p. 159. l. 4. *adde* Cum ductus arteriosus subclaviam arteriam sinistram adiret, arteria pulmonalis, magna ratione quam aorta, major fuit apud Cl. KLIMKOSCH. Multo quam aorta, tenuior est & mollior; tamen & induratur, & concrementis lapideis obducitur *k*\*), aut offescit *k*\*\*).

ibid. l. 7. *lege* quam

ibid. pen. *lege* quam 1361 ad 1600, & 1341 ad 1849 t).

p. 161. l. 1. *post* quæ *adde* ex medio fere trunco, magis tamen ad dextra procedit *f*\*),

ibid. l. 16. *lege* confervent

p. 162. l. 5. *adde* & alias dicuntur. In avibus duo ductus arteriosi sunt, & singuli rami pulmonalis arteriæ suum ramum ad aortam mittunt, superiorem, inferiorem.

p. 163. l. pen. *lege* inosculationes & *adde* & nuper Cl. REICHEL arterias per angulos vesicularum rete facere, atque in venas continuari unius globuli.

p. 164. l. 15. *post* necat *adde* inque lue bubula,

p. 165. l. 1. *post* vidi *adde* hydropem ipsius pulmonis, grave malum, paucisque dictum clinicis.

ibid. l. 2. *post* excreat *adde* & peruvianum animal ejus generis.

p. 166. l. 17. *adde* Quare non minor, si eventus clar. viris perfecte contrarii obtigerint, & etiam nuper scriptum sit, pulmonem inflatum manere tumidum, neque adeo aërem in venas resum.

ibid. l. antep. *post* venas *adde* nonnunquam in duas *u*\*).

p. 167. l. 3. *adde* vel potius spatium inter superiorem venam semilunare relinquunt & dextram posteriorem, obliquius descendunt, & cum anteriori majorem angulum faciunt.

ibid. l. 9. *adde* In universum dextris minores sunt & breviores *c*\*).

p. 169. l. 16. *adde* Nuper demum extitit Cl. PORTALIUS, qui venas arteriis & numerosiores & majores esse scripsit, quæ ad unam arteriam duæ sint; addit se pulmonem repletum in aqua macerasse, tunc apparuisse venas arteriis majores *f*\*). Experimentum non feci, truncos contentus metiri. Coniicias discrimen non esse maximum.

*k*\*) SACHI *lap.* p. 100.

*k*\*\*) In bove *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. III. obs.* 38.

*f*\*) ERDMANN *disp. de arter. thyreoid.* T. II. f. 2.

pag. 164. not. b) *adde* *Amstelod. coll. priu. obs. anat.* p. 11.

*u*\*) POHL *obs. angiolo. de venis*, 1773.

*c*\*) PORTAL *Hist. de l'Acad. des scienc.* 1771.

pag. 167. not. l) *adde* In eorum *obs. anat.* P. II. in oye.

*f*\*) *Histoire de l'Acad.* 1771.



p. 169. l. 17. *adde* in phoca PORTALIUS. De his nihil mihi constat; in homine vero, neque certe numerosiores reperio, neque ampliores. In salamandra, vena modo arteria major, modo ei æqualis SPALLANZANUS.

p. 170. l. 3. *post* HUNAULD *adde* & Cl. HEWSON anteriora, & posteriora; eorumque in ductum thoracicum, inque angulum venæ subclaviæ & jugularis, exitum,

ibid. l. antep. *post* sensus fit, *adde* isque satis accuratus, & *post* repugno *adde* & in bronchiis tussim irritando incitari, & in membrana pulposa cuti continua dolorem federe.

Liceat hic paucis de pleuritidis fede mentem meam declarare, qui, cum nunquam de hac quæstione quicquam scripserim, in has lites fui involutus. Plurima collegi ad fere ducentas cadaverum sectiones. Eo redeunt: post dolores pleuriticos, pulmonis inflammationem & abscessus sæpe apparuisse, quod ipse vidi; pleuram vero sanam repertam. Inflammatam etiam fuisse absque pleuritidis signis, & in musculis pleuræ circumpositis pleuritidis vestigium apparuisse. Neque defuisse tamen exempla, in quibus post pleuritidem pleuræ pulmo adhæsit, atque in ea membrana vestigia fuerunt inflammationis.

Ex his certis experimentis comparatis apparet, veram sedem mali in pulmone esse, pleuram nonnunquam in consensum trahi, absque tamen ejus malo morbum locum habere posse. Nihil ergo ex pathologicis pro pleuræ natura sentiente concludi posse, nisi in pleuritico cadavere pleura sola affecta reperiatur, dum pulmo & intercostales muscoli sani sunt.

p. 172. l. 12. *lege* qui ab aëre repleti cylindrici videntur cet.

ibid. l. 13. *lege* inspecti

p. 173. l. 13. *lege* multangulares & *post* vesiculæ *adde* quæ in minores vesiculas dividuntur, quoad oculis se subripiant.

ibid. l. 21. *adde* Quare etiam aër de lobo in lobum non transit, quo via non patuit, nisi per liberum intervallum.

ibid. l. 25. *post* cogit *adde* in tabidis non raras visu,

ibid. l. antep. *post* turgere *adde* lentius vero hæc omnia, quam de vesiculis in vesiculas.

p. 174. l. 14. *lege* lacerta

ibid. l. 15. *lege* cavæ

pag.

pag. 170. *ad verbum* magni in *textu* lin. 9. *adde* not. p\*) Non bene G. DOVE, tamen magnos fecit CARRERE *inflamm.* p. 376. 377. 378.

pag. 173. not. s) *adde* Hoc ipsum malum esse, quod vocant *Brokenwinded horses* FLOYER *pulfewatch*, p. 399.

- pag. 174. l. antepen. in quibus *lege* per intervalla cellulosa vesicularum  
 p. 175. l. 2. *post* faciunt *adde* Denique membranulæ ipsæ vesicularum in convexitate sua rete vasculosum gerunt, quod de vesicula ad vesiculam communicat. Lacertæ majori cet.  
 p. 177. l. 14. *post* composuerat *adde* ut ex posthumis apparet, nullasque vesiculas *Willisianas* admisit, quæ ex dilatato ramo bronchi fierent.  
 ibid. l. 23. *post* cellulas *adde* ex cellulis compositas,  
 p. 178. l. 12. *post* transire *adde* aut aërem quidem etiam in ramum bronchi impulsu regressu tamen totum pulmonem replere *m*\*). Nihil vero simile fieri, si vinculo reditum aeris per bronchum interceperis,

S E C T I O III.

A E R.

- P** Ag. 179. l. 5. *post* affero *adde* cum mea studia per vastissimum rei naturalis ambitum non potuerim æqua vi diffundere.  
 p. 183. l. 1. *post* portione *adde* in sudore, pulmonis halitu, parca in saliva & bile, magna in sanguine.  
 ibid. l. 5. *post* abest *adde* & a terra aluminis, aliisve corporibus *b*\*)  
 p. 184. l. 8. non exuere *lege* quam exuere  
 ibid. l. 11. *adde* Aer, qui ex dissolutis corporibus generatur, perinde in aqua contabescit & solvitur, multo tamen celerius is certe, qui ex alcali in acido soluto generatur  
 p. 185. l. 3. *post* agnovit *adde* & CAMERARIUS *z*†)  
 ibid. l. 5. *post* fixus *adde* qui corporibus solidis adhæret  
 p. 186. l. 13. *adde* Sed is aer fixus potentissimi veneni effectum edit, ad respirationem ineptus *i*), etiam flammam supprimit *k*); mures continuo oc-

*m*\*) WILDRICK de fabric. pulmon. Franequer. 1767. p. 30.

pag. 181. not. l) *adde* Negat d'ARWEN Phil. Transf. Vol. LXIX. sed in rebus sensibus conspicuis MUSSCHENBROEKIO fidem adhibeo, neque alium eventum in vena possum expectare ab eo, quem in auricula cordis vir eximius in experiundo vidit.

pag. 182. not. c) *adde* SUE.

ibid. not. f) *adde* SUE antropolog. p. 204.

*b*\*) GORGOLIUS diff. de putredinis theoria Cl. MAKBRIDII, Halæ 1768. SMETH de aëre fixo.

*z*†) De tensione cordis, natum ex aceto & creta.

*i*) MAYOW nitr. aër. p. 130.

*k*) HALES hæmastat. p. 272. 285. Hist. de l'Acad. des scienc. 1710. p. 17. PORTIUS diff. var. p. 314. Miscell. Taurin. p. 131. BOYLE exp. phys. mech. II. p. 101.



cidit *l*), & aviculas *m*); tum colubros *n*), limaces, qui vacuum spatium non reformidant *o*), ranas *p*), & apes *q*), muscas *r*).

§. III\*. *Aër varius.*

Quæ prius sparsa erant, ea nuper a Cl. viro *Josepho* PRIESTLEY collecta, novisque experimentis aucta, eo redeunt, ut aëris fixi alia sit & alia natura, ut ex diversis corporibus per varios acores variisque modis educitur. Ipse vir clar. amat peculiaria cuique aëri nomina imponere *s*), alii malunt aërem quidem unicum vulgo notum facere, sed pro varietate admitti vaporis alium aliumque *t*).

- 1) Ergo aërem fixum peculiariter eum vocat, qui ex creta nascitur cum acore aliquo fervente. Is aër vegetabilia, animalia occidit, etiam insecta stupefacit, cum aëre vulgari non miscetur, eumque destruit, acidæque indolis est, ut etiam aquam grato acore imbuat *u*), æmulamque reddat acidularum, putredini adversam, etiam in morbis putridis per experimenta utilem *x*).
- 2) Aër, in quo candela accensa fuit, aut sulphur. Ea flamma aërem consumit, ut non supra quindecuplam partem supersit *y*), ut pondus tamen non mutet. Vapores ejus enecant, iis vero fundum petentibus liberatus aër iste superstes a destructione non nocet.

Hujus aëris noxiam vim vegetatio plantarum destruit. Effectus funestos candelæ habet *P. AMMAN* *z*), & per experimenta Cl. *LAGHI* *a*) vapores incensi sulphuris *b*); phosphorus *c*) aëris, in quo lucet, elaterem destruit. Terebinthinæ inflammatae vapor *d*). Fumus extinctæ candelæ in aërem

*l*) BOYLE ibid. p. 105.

*m*) Id. ib. p. 108.

*n*) Ibid.

*o*) p. 109. 110.

*p*) MUSSCHENBROEK in *Cimentin*. p. 121.

*q*) BOYLE p. 100.

*r*) p. 100. 101. 102. ut tamen fuscitati possint.

*s*) *On different kinds of air*.

*t*) SMETH de aëre fixo, GORGOLIUS l. c.

*u*) PRIESTLEY sur l'imprégnation de l'eau.

*x*) Et in Anglia facta a Cl. *Hugues* PERCIVAL & teste *I. L. TARGIONI* in Italia.

*y*) PRIESTLEY, sic fere *HALES* *vegetable stat. exp.* 103. 106. 117. 128. *LANGRISH* *physf. exp. upon brutes* p. 145. Plus etiam destruit pulvis pyrius *HAWKSBEE* *physf. med. exp.* d.  $\frac{10}{26}$ .

*z*) Cubiculum funestum, in quo candela incensa fuit *med. crit.* 159.

*a*) *Comm. Acad. Bonon.* IV. p. 81. 90.

*b*) *De HEYDE obsf.* 56. *HALES*, p. 254. *LANGRISH*, p. 145. *van den BOS*.

*c*) BOYLE *noctiluca aër.* p. 49.

*d*) Non quidem enecavit, ægros tamen reddidit homines, *MOSEDER deliq. anim.*

inflatus e). Ignis super corium madidum structus f). Vis noxia aëris per flammam corrupti multo pestilentior est, quam aëris respirati g). Affinis est aër, qui per ferrum candens h) aut æs i) transit, aut per flammam (spiritus vini k), aut demum carbonēs; idem enim vitro receptus & per inspirationem attractus necat. Huc etiam vaporem refero per specula caustica de metallis extortum, qui aëris partem  $\frac{1}{2}$  destruit, reliquam noxiam reddit.

Longe vero celebrior est aër, quem incensi carbonēs corruperunt. Eo enim cum homines necessario usi fuerint, & demum per multa experimenta & conspurcationem funestam didicerint, dudum passim incautis lethi causa fuit, etiam Imperatoris *Valentii*; neque ignorata vis venefica *Hugoni BENSIO m)*.

Quare non mirum est, homines in ejusmodi aëre factitio, deque effervescente musto n) aut cerevisia o) exspiranti, extingui, quoties eo vapore cellæ vinariæ repletæ sunt p). Mors subita ex vapore nato in cisterna, in qua sordes a destillatione sacchari reliquæ servabantur q). Ex vapore dolii aqua marina pleni periit homo, cum summæ putredinis indiciis r).

e) *Delic. chirurg.* p. 72. 73. 74.

f) *KRAFT physic.* p. 322.

g) *HALES l. c.* p. 272.

h) *DESAGULIERS cours.* T. II. p. 558. *Miscell. Taur.* II. p. 38.

i) *DESAGULIERS,*

k) *Idem ibid.*

l) *HAWKSBEЕ Phil. Trans.* n. 328. *DESAGULIERS,* p. 389. 552.

m) *AMATUS Cur.* 33. *Cent. VII. Marc. DONATUS hist. med.* p. 170. *HILDANUS de gangren.* p. 786. *FABER in HERNANDEZ* p. 784. *FONTAN Analect.* c. 22. *C. BARTHOL. Exerc. Med.* p. 38. *Satyr. Siles.* T. V. n. 1. *Delic. Med. Chir.* p. 487. *art de faire les rapports* p. 514. *Fränck. Anmerk.* T. I. n. 13. T. II. p. 145. *MANITIUS de Idiosyncrasi.* p. 25. *BIKKER nat. hum.* p. 55. Huc pertinet celebris historia studioforum Jenensium, qui, cum thesauros venarentur, a fumo accensarum prunarum interierunt apud *TANNENBERG de suffoc. a must.* p. 56. *Aët. Med. Vratislav.* 1719. M. Dec. *HOFMANN Med. Conf.* Cent. V. Dec. III. n. 108. Ex carbonum in bene clausis mapalibus fumo pene perierunt Belgæ in nova Zembla *LINSCHOTEN Itin.* T. II. p. 23. *Assemblée de Beziers* 1731. Dec. Inde lethargus *ADOLPHI de conclav. agrot.*

n) *STAHL fundam. chem.* T. III. p. 91. *RAMAZZINI de morb. artif.* c. 20. *ROTARI Giorn. de' Letter.* 29. p. 434. *DRELINCOURT de human. fet. membran.* n. 32. *ZACUT. medic. princ. obs.* I. L. 10. Animi inde deliquium *NEBEL de virib. electric. medic.* p. 38. *NEUMANN Oper. chem.* p. 1164. *Eph. nat. Cur.* Dec. III. ann. 2. obs. 45. *Journal de Médecine* 1756. *CAMER annul. pneum.* p. 34. 35. *MUSSCHENBROEK ad Cimentinos.*

o) *NEUMANN oper. chem.* ex edit. *ZIMMERMANN.* p. 755. 756. 1164. Idem esse, quod inebriat, & flammam atque animalia necare *VERHEYEN L. II.* p. 98.

p) *STAHL ibid.* *NEUMANN ibid.* *VERHEYEN ibid.*

q) *G. HUGHES Hist. of Barbados* p. 251. 252.

r) Sanguis per os, nares & aures fluxit, & cadaver continuo contabuit *du HAMEL art de préserver* p. 41.



Nuper autem accuratius inquirendo compertum fuit, fumum carbonis sanguinis per pulmones iter sufflaminare, ita fieri, ut dexter ventriculus, & dextra auris, & vena cava, & demum venæ cerebri & cerebrum sanguine plenissima, sinister vero sinus, & sinistra auris inanes sint *s*), & demum sanguis in cellulofam telam capitis effusus, & intestina inflammata *t*). Ita in hominibus carbonum venenata vi enectis, & in animalibus experimento subiectis, muscoli in universum mole aucti pertinent ad sanguinem in cellulofam effusum, & eo retulerim diuturnum horum cadaverum calorem & mollietatem *u*), sic etiam symptomata ab eo fumo nata eo referas, capitis gravitatem, sensus jacturam, livorem faciei, capitis tumorem, pulsus defectum & respirationis *x*). Ignem idem suffocat *y*), & insecta, quæ vacui spatii violentiæ resistunt *z*); aeris naturalis partem destruit.

*Ejusdem* gravior fuerit venenata indoles spiritus carbonum vitro recepti, qui naturam venenatam diutissime retinet *a*).

Neque longe differre potest aer, qui in fodinis carbonariis Anglicis, aliisve passim, habitat flammam concepturus. Si quando simplices metallarii eum ore hauserunt, vomitum movet & alvum, & etiam subito suffocat. Hi etiam mortales diu a morte molles calidique manent, neque rigescunt, ut cadavera solent *b*). Mirum posset videri, in iisdem etiam carbonariis fodinis vaporem non inflammabilem *c*) reperiri, perinde funestum. Idem ab igne dissipatus post aliquam moram renascitur *d*).

Alios vapores subterraneos & mephitides omitto, ut nec in aeris speciebus *Priestleyanis* continentur, & cum de metallis minerisve non satis certo constet, a quibus vitium ducunt.

Scintilla electrica aerem diminuit & mutat, ut cum nitroso cesset fumare.

3. *Aër inflammabilis*; hujus aeris variæ sunt scaturigines; quem carbones generant, nunc dixi. Sed etiam ex aliis corporibus incensis obtinetur, quæcunque ignem concipere apta sunt. *Noster* fere ex ferro *e*) obtinuit & zinco.

*s*) PORTAL rapport.

*t*) HARMANS apud *Per.* IV.

*u*) PORTAL.

*x*) HARMANS.

*y*) Conf. HALES exp. 109.

*z*) MUSSCHENBROEK in *Ciment.* p. 107.

*a*) CLAYTON *misc. med.* III. p. 290. *Philosophic. Transact.* n. 452.

*b*) JARS *ibid.* p. 256.

*c*) POWER *microsc.* p. 179.

*d*) Le MONIER ap. CASSINI *mes. de la terre* p. 197.

*e*) HALES exp. 57.

Hoc aeris genus ingrati est odoris *f*), potissimum, qui ex animalibus educitur, eorumque partibus. Ex pisces, ostreis cet. HALES habuit *g*).

Elaterem destruit; ex metallis per speculum ustorium obtinuit CL. PRIESTLEY; ex paludosis aquis ascendit teste FRANKLINO & CL. VOLTA.

Aqua receptus odorem suum per ipsam aquam spargit, eamque cuticula iridis coloribus varia obducit, verum in ea ipsa aqua naturam inflammabilem deponit, & porro candelam exstinguit.

Animalia occidit, etiam limaces, colubros, ranas, insecta, perinde ut aer fixus, neque ab eorum morte vim inflammabilem amittit.

Sola concussione in aqua totus innocuus redditur, & ad respirationem aptus, a vegetatione vero minime corrigitur.

Porro aer, quem respiratio corrumpit, aut putredo, quem suo loco dicemus.

- 4) Tum *aer nitrosus*, qui nempe per acorem nitrosus ex metallis exque hydrargyro educitur, per eum acorem dissolutus. Hujus aeris mirificæ sunt dotes. Cum aere communi atmosphærico mistus fervet, eum turbat, aurantio colore vitiat, tertia parte minuit, ipse quartam amittit. Idem amittit sensum facilitatem, qua in aqua solvitur. Cum aere inflammabili mistus viridem flammam efficit. Plantas & insecta omnia subito enecat, etiam vulgari aere mistus. Aquam purgantem \*) acris imbuunt. Putredini vehementer resistit, natamque corrigit multo, quam aer fixus, potentius, ut in eo aere CL. PRIESTLEY speret animalcula & fructus æque ac in spiritu aliquo inflammabili duraturos. Confirmat eam spem CL. ACHARD *b*), cum hoc aere putredinem & a lotio & a carne averterit.

Per concussione in aqua emendatur, & nunc tuto per respirationem adducitur. Flammam auget & adjuvat.

Hoc aere occisi aves sanguinem habuerunt coactum *i*); ab eo, sed ex multo nato, asphyxia.

- 5) *Aer salinus*, qui fit ex metallo per acorem salinum soluto. Hic aer in aqua solvitur, eam reddit acidissimam, ponderosior idem est, quam aer vulgaris, & flammam exstinguit; cum liquoribus inflammabilibus aerem inflammabilem generat,

*f*) Hamburg. Magaz. T. VII. p. 557. vaporem subdulcem vocant. Add. *Mémoire de l'Acad. de Berlin*, T. 13. p. 107. TILLY du charbon minéral. Animalia corpora, non ita vegetabilia consumit. Inflammabilis in operibus carbonariis *Workington*, JARS *voyages metall.* & TILLY p. 103.

*g*) HALES exp. 57.

\*) pungente videtur legendum esse. Not. edit. huj. auct.

*h*) Journ. Litter. L. XIV.

*i*) SAGAR *System.* p. 538.



6) *Aër alcalinus*, factus ex spiritu salis ammoniaci, cujus calefacti vapor vase recipitur hydrargyro pleno. Similem alii sales volatiles alcalini fundunt. Ab aqua imbibitur, quam reddit alcalinam. Cum aere fixo crystallos facit oblongas decussatas. Celerrime glaciem solvit.

pag. 188. l. 17. *adde* WOLF 816 ad 1.

ibid. l. 18. 885  $\frac{1}{122}$  ad 1, *lege* 855  $\frac{1}{122}$  ad 1.

p. 189. l. 19. *post* descendat *adde* perinde fere in glaciali monte *le BUET* apud Cl. de LUC & in *M. actæ*,

p. 190. l. 12. *lege* centum & viginti quinque

ibid. l. 13. 126. *lege* 150.

ibid. l. 14. 246. *lege* 275.

ibid. l. 16. *lege* Quare cum 182 ad 275 se habeant fere uti 2 ad 3, erunt cetera.

ibid. 19. *lege* uti  $\frac{1}{2}$  ad  $\frac{1}{3}$ .

p. 192. l. 8. *post* plus *adde* MUSSCHENBROEKIUS pressionem, quam urinator sustinet, ad 332. 340. l. æstimat.

p. 195. l. 2. *post* imposito *adde* ut spongiis aures defendere cogantur,

ibid. l. 10. *adde* Denique quando summa cum velocitate pila ex majori tormento cominus fere corpus hominis radit, visa est & ossa frangere, intacta cute, & hominem interimere, sola ab enormi aeris pressione.

p. 196. l. pen. *post* esset *adde* & alius passer cum ad tredecim pollices descenderet, alius cum ad sedecim pollices,

p. 197. l. 12. *adde* Hujus funesti effectus in nixu, inque nimio musculorum labore, alias dicemus. His enim hominibus nixus nocet, qui pondus sui corporis singulo in passu per tres quatuorve pollices elevat.

p. 198. l. 3. *post* pollices *adde* quem alii ad 290 pollices auxerunt.

p. 202. l. 8. *adde* aut 130 ubi summus,

ibid. l. 14. *adde* Inde æolipilæ *Cesianæ* & aliæ circa Clavennam rhæticam, quando in subterraneis cavernis aer, frigore immutato servato, viribus integris in aerem exteriorem per æstivos calores rarefactum erumpit. Inde ventus ille, de quo scripsi, status rupensis, quando aer in Valesia matutino sole contempuit, dum aer borealis montibus a sole defensus densitatem retinuit. Denique cum aer vaporibus tot ægrorum calefactus per foramen in fornice summo conclavis exit, in limine ejus aer undique per omnes succedit aditus.

Demum singulare huc pertinet phænomenon in fodinis a Cl. JARS annotatum. Et hyeme & æstate perpetuo aeris torrens mutatur, sic æstate

pag 196 ad verbum credantur in textu *adde* not. 2\*) BOYLE *Phil. Transact.* n. 63.

ibid. ad verbum vixit in textu lin. ult. *adde* not. b\*) Vipera tamen vixit in aëre sexies rariori.

idem in subterraneis cuniculis gravior ascendit in leviores atmosphæram; hyeme, quando atmosphæra ponderosior facta est, descendit idem ab atmosphæra in aërem non mutatum, hinc leviores, cuniculorum u\*).

pag. 202. l. ult. *adde* Ita porro aeris elater in loco clauso ab igne augetur, in loco libero minuitur, quia aer ab igne rarefit, ejusque adeo in eodem volumine minor nunc est massa z).

p. 205. l. 14. *post addito adde* ita ut tamen dilatari nequeat fornacis parietibus coercitus.

ibid. l. 24. *lege* rarefactionem

p. 206. l. 5. *adde* Demum aer, qui in aqua dissolutus fuerat, ad volumen 47000es majus se expandit, & majora adhuc WINKLERUS incrementa voluminis recensuit, in quæ aer se demiserit.

ibid. l. 12. *lege* vapores

ibid. l. 16. *post animalibus adde* & perinde per putredinem animalis, quod in eo aere corruptioni traditum est.

ibid. l. 20. *post resistere adde* Octo pedes aeris respirationem non supra quindecim minuta prima alunt.

p. 207. l. 9. *adde* Porro elaterem aeris a respiratione destrui nuper Ill. SPALLANZANUS confirmavit.

ibid. l. 12. *post agnovit adde* Animal in aere non renovato intra  $3\frac{1}{2}$  hor. periit, rana intra sexaginta; neque profuit aerem reddidisse densiorem.

ibid. l. ult. *adde* Neque vel plantæ in aere non renovato supersunt, neque flamma alitur, postquam respirantia animalia eum aerem corruperunt.

p. 208. l. 1. *dele* Tempora, quibus ---- ut aeris volumina.

ibid. l. 6. *adde* In universum pereunt in ratione directa molis. Pleraque animalia in aere clauso celeriter pereunt, celerius etiam, si rarior fuerit.

Insectorum tamen ova in animalia in aere clauso invalescunt y\*).

ibid. l. 21. Apparet utique ---- elateris decedere, *lege* Vehementiores etiam istis sunt effectus, quos PRIESTLEY recenset. In ejusmodi nempe corruptum aerem inclusa animalia fere continuo post vehementes convulsiones extinguuntur, ut tamen muscoli diutius resistent e\*), & juniora animalia.

p. 209. l. 3. *adde* Neque densatus aer, ut quidem scribitur in nuperis Cl. CIGNÆ experimentis, animali incluso vitam servavit. Neque ab elatere deletus; nam aere etiam reddito intereunt, dum corruptus aer supersit.

u\*) *Mémoire de l'Acad.* 1764.

z) WINKLER *Untersuchung.* p. 116.

y\*) SPALLANZANUS ibid.

e\*) PRIESTLEY.



pag. 209. l. 7. *post felis adde* Occidere aërem non renovatum Cl. PRIESTLEY, quia phlogisto de animali halante nimium saturatus est, neque adeo phlogiston de corpore nostro potest resorbere. Tanto enim deteriorem esse aërem, quo minus phlogisto recipiendo aptus sit.

Stimulo nocere *Idem*; cum convulsiones excitet. Eadem fere Cl. SPALANZANO est sententia, addito experimento, quod eo pestilentior aër fiat, quo plura fuerint animalia, quæ in eo aëre respirarunt, nervosque pati, cum hæc animalia fere convulsa pereant.

Non longe recedit viri Ill. *Marsilii* LANDRIANI sententia, qui ob phlogiston de pulmone halans & aërem replens, quem respirare cogitur, animal mori docuit.

ibid. l. 9. *post dicentur adde &* in aëre, in quo animal extinctum est subito. Putavit eos vapores vim exferere, quæ bronchia constringat, pulmonem reddat. Caro certe animalis in aëre extincti, qui respirando fuit corruptus, celeriter putrescit *q†*).

ibid. l. ult. *post frigefacto adde* Cogitatum est de aëris elatere destructo, cum aliquibus in exemplis aër corruptus respiratione suffocavit, cum majori vi impelleretur. Sed annotatum est, aërem corruptum animal necare, etiam reddito aëre, neque in mephitide elaterem destrui, neque in eo argentum vivum subsidet.

p. 210. l. 8. *adde* Addas aërem factitium ex creta per acidum liquorem soluta, respirationem non alere, quia subito fere in homine contabescit, solvitur & elaterem amittit celerius quam aër vulgaris.

ibid. l. 10. *post toleramus adde* cujus tanta pars aqua sit.

ibid. l. 15. *adde* De hac ergo quæstione interim ampliamus. Denique difficultatem auget, quod etiam ea animalia in aëre non renovato intereant, quæ pulmone destructo non intereunt, ut ranæ *y\*\**).

Contra vim vaporum constringentem objicias, neque vesiculas pulmonum irritabiles esse, neque aëris vaporibus pleni eam violentiam, quæ aëris cloacini, quem tamen homines facile ferunt. Nempe eo conjectura redibit, esse in aëre aliquid ad vitam alendam requisitum, aliquid in aëre, quod respirando amittatur, siquidem in experimento animalia occiduntur ab aëre clauso, quæ respirationis interceptionem facile ferunt.

Quæ putrescunt animalia, ea aërem generant ejus similem, quem respirando corrupimus, & perinde funestum. Validior putredo acrem ipsis plantis fructum reddit, nisi vero eas destruxerit, mire incrementa urget.

Putridum

*q†*) ALEXANDER *Essays*.

*y\*\**) SPALANZANUS.

Putridum aërem & vegetatio plantarum emendat, ut demum absque noxa respirationi serviat; corrigit etiam electricus torrens, ut sub campana vitrea, in quo animal computruit, innoxius fiat, si campana cum suis fulcris sphaeræ rotatæ electrico torrente perfluatur; demum si in aquam receptus concutiat. Ab acore solo non corrigitur, ab aëre fixo utique, certe minus fit noxius.

pag. 210. l. 19. *post* amittit *adde* & in ejusmodi quidem aëre non quidem canis, rana tamen interiit, etiam irritabilitate amissa.

p. 212. l. 4. *dele* Idem ignem supprimit---cum summæ putredinis indiciis. *ibid.* l. pen. *dele* carbonariis

p. 213. l. 2. *adde* Flammam etiam putredo generat.

*ibid.* l. 4. *dele* Sed in ejusmodi---intervallum renascitur.

*ibid.* l. antepen. Hujusmodi mephitides creduntur---in corpore retineri nequeat *lege* Neque in stlopo patiat. pulverem pyrium ignem concipere. Parum cum assurgat & vix supra pedem, nihil in eo patitur erectus homo, neque canis, nisi caput ei deprimatur; id si feceris, exanimatur, at restituitur equidem, si continuo corruptum aërem meliori mutaveris.

Ejusmodi mephitides circa Vesuvium & Aetnam montes passim exhalant, etiam per puteos, quorum aquæ non nocent, exque cellis, eo tempore quo Vulcanii montes excandescunt.

Iste etiam vapor putatus est bronchia constringere, pulmonem reddere inmeabilem. Pulmonem certe animalis in eo vapore collabi, eumque vaporem quasi vacui sensum producere clari viri observarunt, qui experimenti causa eum hauserant. Et tamen in eo argentum vivum non descendit, neque acrimonia certo sensu percipitur. Sed compara, quæ de bronchiorum constrictione diximus.

p. 214. l. 7. *post* Ribariensium *adde* thermarumque Egranarum, Wildungen-  
sium, atque Carolinarum

*ibid.* l. 8. *post* manifestius *adde* ex odoris testimonio

*ibid.* l. antepen. *adde* Si quicquam in rerum natura bronchia constringere potest, id fumus fecerit sulphuris.

p. 215. l. 6. *post* putrefacit *adde* Vulgo inde occisi vespillones. Ex sepulchro aperto, in quo cadaver foetidissimum, febris epidemica maligna. Ex cloacæ pædore, qui repurgaturus descenderat, subito periit. Ex sentinae pædore varia mala & mortes subitæ, multa per exempla.

*ibid.* l. 18. *post* pestilens *adde* Quare pericula a cadaveribus in cellis per templa sepultis imminencia nuper viros publicæ salutis studiosos impulerunt, ut legum præsidia contra superstitiosum civibusque funestum morem implorarent.

*Fasciæ. III.*

D



pag. 216. l. 3. *adde* Notissimum est, quam pestifera in calidis regionibus per æstivos ardores paludum sint effluvia, ut in Bengala; in maritimis Pisani, in lacunis Pomptinis. Spuma in ejusmodi palustri aqua tauros in Jamaica insula subito occidit. Neque ignoratur, effossis paludibus, aquis emissis Pisani, Bagnanæ, Stutgardiae, Neapoli, Cæsoinæ, Balneo regio, aquis Martiis salubritatem esse restitutam; aquæ vero falsæ novis aquis mistæ pestilentius putrescunt, quoties in maritimis stagnant.

ibid. l. 16. in puteo *lege* in vase ligneo salsa pleno & diu clauso

ibid. l. ead. *post* frumentariis *adde* cryptis Aegyptiis intactis, cisternis

ibid. l. ult. *adde* & tamen eventus nimis certus est. Vapores noxios pellionum, faponariorum ad putredinem referas.

Super ipsam aquam stagnans aer putredinem pestilentem contrahit (\*), etiam cum glacie tegetetur (\*\*), aut super puteum colligeretur (\*\*\*)). Ejusmodi aquæ vapor de puteo exiens flammam cepisse, homines ambussisse visus est (†).

Alii putantur esse vapores, qui de terra ascendunt, qui pestilentem efficaciam venti *Samiel* efficiunt (††), subito occidentem (†††).

p. 217. l. 8. *adde* Ego quidem nondum satis habeo experimentorum, ut certi quid definiam.

p. 218. l. 16. *adde* Aqua de mari plurima exhalat, quam ad pluvias, adque flumina, fontesque generandos sufficere *Edmundus* HALLEY comperit, qui tamen exhalationem aquæ fecit justo minorem; mihi enim de falsis fontibus Aquileiensibus duodecim horæ æstivæ fere tres lineas dissiparunt.

ibid. l. antepenult. mirosque *lege* minoresque & *post* contemplatur *adde* Copiosissimum ignem, quem venti pestilentes Orientis secum sumunt, diximus (\*\*).

p. 219. l. 3. *post* alumen *adde* salem Epsomensen, salem mirabilem GLAUBERI.

p. 220. l. 2. *adde* Cuprum in aere æruginem concipit, sed ærugo fit crystallis cupri ab acido vitriolico dissoluti †). Aphronitrum ex spatho generatur ab

(\*) SMETH de aëre fixo.

(\*\*) BARROW IV. p. 75. in sinu Hudsoniensi.

(\*\*\*) C. a REYES p. 65. *Hist. de l'Acad.* 1701. p. 18. CARDAN. *discurs. Phys. med.* PLOT Oxfordshire p. 62. 63. RADSCYNSKI *hist. nat. Pol.* p. 229. FABER ad HERNANDEZ p. 78. BOADE *nat. histor. of Ireland.* p. 145. *Zod. Med. Gall. T. I.* p. 174. B. *Med. legal.* p. 7.

(†) Holl. *Maatschapp. Verhandel.* T. XV.

(††) CHARDIN IX. p. 221.

(†††) THEVENOT, TAVERNIER cet.

(\*\*) Lib. VI.

(†) FALCONER *poison of copper.*

acido vitriolico soluto *t\*\**). Tartarus vitriolatus ex clavellatis cineribus aëri libero diu expositis *t\*\*\**).

pag. 220. l. 7. *post annum adde aut per septem annos*

ibid. l. antepenult. *post cadunt adde & ros in Aegypto falsus est.*

p. 221. l. 2. *post erodit adde ferrum solvit.*

ibid. l. 14. *adde Pinuum odorem sexaginta a terra leucis percipiunt, qui Americam Septemtrionalem præternavigant s\*)*

ibid. l. ult. *lege eandem*

p. 222. l. 8 *adde Romæ Cl. GROSLEY vapores per aërem obvolitantes & vidit, & olfactu distinxit, qui alcali volatilis naturam retinuerint.*

ibid. l. 17. *post terra est adde Gypsum pulvis variis locis abundantius obvolitans cum spiritu recipitur, & pulmone nocet.*

ibid. l. 16. *post convulsi adde In specu Cypria chalchanti odorem GALENUS percepit.*

ibid. l. antepenult. *post deponat adde De zinco simile est testimonium per aërem ferri.*

p. 223. l. 5. *lege in summas tures*

## S E C T I O IV.

## R E S P I R A T I O.

**P**ag. 224. l. 3. *post vim adde cum fodalibus*

p. 225. l. 8. *post bronchia adde annulis asperæ arteriæ sibi impositis*

ibid. l. ult. *post abdomine adde aut pectore*

p. 226. l. 3. *adde Certa tamen ad respirationem moliendam maturitas in fetu requiritur. Qui sexto mense editus fuerat, respiravit, neutiquam, qui 130 die.*

Prima initia respirationis nuper Cl. PORTAL ostendit in broncho dextro fieri; is enim elevatur facilius, quia liberior est, dum sinistrum aorta am-

*t\*\**) FISCHER de aphronitro.

*t\*\*\**) SUCH de tartaro vitriolato.

pag. 221. not. f) *adde PIETSCH de nitro n. 30. conf. MARGGRAF Mémoire de Berlin, 1752.*

ibid. not. i) *adde ALBERTI & BOEHM de salis medii genesis ex acido aëreo.*

*s\*)* BURNABY & R. LENTILIUS.

pag. 221. not. t) *adde Effossis paludibus Pisis salubritatem redditam esse CARUES.*

pag. 225. not. h) *adde PIA, IV. p. 77. Ibid. 2. Journal de Médecine, 1765. May. Mémoire sur les noyés*



- plectitur & comprimit. Exempla addit sibi visa, in quibus pulmo dexter nataverat, cum sinister nondum ab aëre dilatatus in aqua subfideret.
- pag. 226. l. 12. *adde* Sic neque in pectore pleuram inter & pulmonem vacuum spatium nascitur, in quod aër subeat.
- p. 227. l. 2. *adde* Cum ab empyemate pectus fuisset perforatum, non ideo collabi pulmonem, neque pulmonem de motu cessasse.
- ibid. l. 10. *post* coaluisse *adde* Potuit etiam pulmo non collabi, qui pleuræ adhæssisset.
- ibid. l. pen. motum amittit *lege* & immobilis in dorso hæret in GALENI experimento toties a nobis repetito, & animal cet.
- p. 228. l. 12. *post* BREMOND *adde* Perinde ut ab eadem compressione diaphragma vidi de pectoris vulnere expelli, & cor, & aërem, qui pectore continebatur.
- p. 230. l. 3. *adde* Nuper Cl. GOURAIGNE aërem suo elatere in pulmonem aere debiliori plenum descendere docuit *y\*)*, & pectus dilatari, quia aer subit; non subire aerem, nisi pectus dilatatum fuerit. Sed repugnat vita hominum superstitum in aere calidiori, quam est hominis sanguis; hic vero aer pulmonalis densior, atmosphæricus rarior est *y\*\*)*.
- p. 231. l. 19. *adde* ut per nupera Britannorum inventa eo in casu necesse sit pectus perforari, quia aer exeat.
- p. 232. l. 7. *post* dilatatur *adde* GALENO teste.
- ibid. l. 11. *post* confirmant *adde* GALENUS ostendit, destructis omnibus musculis & pectore aperto, solum diaphragma laborare, imasque pectoris partes moveri.
- p. 235. l. 4. *post* capacitas *adde* pectoris.
- ibid. l. 10. *post* pectus *adde* proprium
- ibid. l. 11. laxiorem *lege* longiorem
- p. 236. l. 27. quo *lege* qua
- p. 237. l. 4. *post* ponderis *adde* aeris
- ibid. l. pen. *post* incisionibus *adde* cor,
- p. 238. l. 21. adhæsit *lege* obstitit,
- ibid. l. ult. *lege* rigidi
- p. 239. l. ult. *lege* & parte musculorum destructa tanta pars cet.
- p. 240. l. 10. idem *lege* eadem

pag. 226. not. t) *adde* tum loc. *affect.* L. V.

g\*) De respiratione, addit inflato aëre in animali mortuo omnia phaenomena inspirationis produci.

g\*\*) Fusc L. V.

pag. 242. l. 18. *lege* *περωγων*

p. 243. l. antepen. *aereis lege aere plen*

p. 244. l. antepen. *post retracta adde & tortuosa*

p. 246. l. 3. *lege* *percurrentis*

ibid. l. 12. *post partis adde* Cl. BERNARD putat, extra inspirationem sanguinis partes quadraginta octo in arteriam pulmonalem penetrare, in inspiratione 54; tamen ut primis in initiis major sit facilitas qua sanguis subit, ea vero perpetuo minuatur.

ibid. l. 13. idem *lege* inde

ibid. l. 21. *post* projicitur *adde* ut in vivis animalibus manifesto visum est.

p. 248. l. 7. *lege* vices

ibid. l. antepen. *adde* fecit nuper Cl. PORTAL.

p. 249. l. 3. Sed idem vitium, eademque causa mortis --- ut utrique indicationi satisfiat, *lege* Per experimenta enim numerosa nuper capta constitit, strangulatos equidem sæpe cum signis apoplexiæ perire, sanguine in cerebrum ejusque sinus congesto \*), vasis encephali cruore plenis, suborto delirio & sopore.

Vera tamen causa mortis utique in STOLTI aliisque periculis est, quod, aspera arteria a laqueo intercepta, pulmo respirationis usu privetur, ab aere distendi nequeat; hinc sanguis in dextris cavis cordis, in arteria pulmonali, in pulmone, & demum in omnibus venis colli, pectoris, & abdominis, congeratur, ad sinistras vero cordis caveas nullus veniat, & arteriæ ipsæ inanes sint. Neque absque exemplo est, venas enormiter distentas demum ruptas fuisse; ipsam demum, *Cornelio* *CONSENTINO* teste, cavam venam; passimque sanguinem effusum, & super cerebrum, & super intestina. Non video, quare Ill. HAENIO visum sit, sanguinem non frequenter in cerebrum congeri \*\*).

Cl. STOLTE experimenta huc faciunt in submersis capta, & memini in nobilissimo viro, ob injustum homicidium in Anglia laqueo extincto, sanguinem sub cutem brachii & manuum effusum fuisse r).

Quæ strangulatio mala facit, eadem a submersione sub aqua fiunt; inque iis, nostro ævo multorum bonorum civium conjunctis conatibus magis cognitis, liceat hic aliquanto esse uberiores.

pag. 249. not. o) lin. 4. *adde* WEBER Fascic. II. obs. 6. BÜTTNER zweyköpfigt Kind, p. II. HAEN rat. med. T. I. GUMMER submers.

\*) MENDEL de suffocatis.

\*\*) l. c.



Animal sub aquammersum aerem quidem captat & inspirare conatur, & in mortuo etiam epiglottis erecta reperitur \*\*\*); sed aqua cinctum aerem non invenit, & plerumque aquam deglutit, & in ventriculum & in pulmonem, ut etiam fundum petat, ut in strangulato \*\*\*\*). Etsi enim exempla sunt, in quibus aut in ventriculo †) submersi animalis nulla aqua fuit g), aut in pulmone; longe tamen plerumque in cadaveribus incisus & in ventriculo ††) aqua reperitur, & in pulmone p), inque aspera arteria, cum residuo aere, qui in pulmone relictus erat, subacta, inque spumam versa. Utramque aquam & ipse vidi in animalibus de industria submersis, & viderunt plurimi clari viri †††), etiam suum per colorem conspicuam, cum in aquam tinctam animal experimenti causa demersissent, eamque homines infelices \*) vomitu rejiciunt. Demum ex iis hominibus, quos laudabilis industria Societatis Amstelodamensis servavit, plurimi aquam spumamque de ore reddiderunt \*\*), etiam vomuerunt, aut per alvum egresserunt, & admistum perinde lutum †), & aquam saponariam \*\*\*).

Cum vero aqua non perinde ut aer pulmonem ita distendat, ut per rarum elementum sanguis de arteriis in venas facilius transeat b), & potius pondere suo transituro sanguini resistat, fit ex submersione, quod ex strangulatione; ut nempe sanguis in arteria pulmonali, ventriculo, & auricula dextra, inque venis ad cor ducentibus, colligatur, neque ullus in sinistras \*\*\*\*) caveas, etiam meo experimento: ita subtracto sinistro cordi suo stimulo quiescit idem, & venæ demum rumpuntur, aut in pulmone †), aut alibi. Ita in Cl. viri, Professoris nunc Gottingensis, *Job. Frederici* Gmelini periculis, ita in HAENII, pulmo a congesto sanguine infartus est, ut aquæ jecoris similis

\*\*\*)) *Hannöver. Magaz.* 1763.

\*\*\*\*)) BÜTTNER P. II.

†) WEBER ib.

g) adde WEBER fasc. II. 2.

††) GUMMER l. c. exp. 2. 4. 6. *Hannöver. Magaz.* 1763. MENDEL.

p) lin. 4. adde HAEN rat. med. T. XV. BOYLE *Philos. Trans.* n. 62. GUMMER l. c. MENDEL. — lin. 6. adde GUMMER ibid. exp. 2. 4. BOYLE *Philos. Trans.* n. 62. in ann. V. *Medec.* in lite *Claudina Rouge* experimento facto.

†††) GUMMER ubique Exper. I.

\*) Ipse FORESTUS *obs. chir.* Lib. VI. p. 33. *PIA sur les noyés.*

\*\*)) Homo Cl. *PIA* dictus etiam stercus deglutitum & simul tres pintas aquæ revomit, IV. p. 155.

\*\*\*)) FOREST. XV. *obs.* 2.

\*\*\*\*)) EVERS in suffocatis a fumo carbonis, a fumo sulphuris. Ceterum huc quoque spectant not. g) i) & k) legendum tamen est loco SAUVAGES *Art. Litt.* Upsal. 1742. ab aëre non renovato.

†) ROUX *Journal de Medec.* 1774. Mois d'Octobre.

videretur, & fundum peteret ††). Hæc theoria, mortisque ab impedita respiratione deducta causa †††), confirmatur experimento canis, qui submersus sub aqua vitalis superest, si, per longum tubulum ex aspera arteria eductum super aquam, ei aeris com meatus reservatur ††††). Hinc submersi feliciter nonnunquam per HOOKII experimentum servati sunt ††).

Hi homines aliquamdiu non vivunt \*), cum neque cor saliat, neque respicient \*\*), neque sentiant, neque extracti meminerint eorum quæ sibi acciderunt \*\*\*), demum frigeant toti, & eorum conditio in veram perpetuamque mortem transeat, nisi auxilia artis accesserint. Aliquod tamen tempus est & pro strangulatis, & pro submersis, & pro enectis a fumo carbonario, in quo a benefica amicorum industria suscitari possunt; idque tempus in submersis quindecim minutorum, semihoræ, etiam horæ integræ in iis miseris fuit, quos Societas Amstelodamensis vitæ reddidit \*\*\*\*). Mirificas historias legas, in quibus narratur, multas post submersionem horas tamen potuisse vitam restitui, maxime mirifica olitoris PECHLINO dicta; non facile tamen fidem adhibeo, qui & ipse vidi, & Cl. HAENIUM †) & GMELINUM habeam consentientes, pauca post minuta horæ aves ††) canesque irrevocabili morte interiisse, neque ullo conatu neque scintillis electricis eductis potuisse suscitari. Videtur hic aliquod hominis esse privilegium, qui, cum paulo aqua gravior sit, subinde emerferit, aeremque captaverit; cujusmodi cani, vi sub aquammerso, nihil contingere potest. Id tamen privilegium non potest adeo laxari, ut homo, hætenus animalibus quadrupedibus simillimus, & perinde aquam deglutiens, eventus ab animalium casibus totos diversos sperare possit; & procul dubio præsidia, quæ continuo laudabo, sæpe tenax illa spuma inutilia reddiderit, qua pulmo & bronchi submersorum replentur.

Nempe ea si via libera foret, ab aere in os inflato plurimum sperarem, quo infantes \*), qui a partu non valebant respirare, vitæ sunt redditi; quo resti-

††) BÜTTNER I. C. WEBER 116.

†††) *Hist. de l'Acad.* 1725. 12.

††††) pag. 226. Auctor excidit.

\*) Lib. IV.

\*\*) Obscure respirare ESCHENBACH.

\*\*\*) PIA.

\*\*\*\*) DRENKELING, p. 28. Minutis 30 hirundo *Hamb. Magaz.* 1767. n. 20. Verum non erat mortua, & cor pulsabat.

†) Difficulter suscitavi, sic HAEN XV. Unicum canem post 4 minuta idem HAENIUS revocavit, sic ESCHENBACH. Multa animalia non potuit suscitare PORTALIUS a vapore moribunda.

††) Post semiminutum mortuæ R. BOYLE *Philos. Transf.* n. 62. Alia animalia intra sex minuta, sic musculus celerrime.

\*) MENDEL, PORTAL apud COLOMB. p. 17.



tuti, quos fumus carbonarius occiderat; quod etiam auxilium passim & a Cl. BERTANDI, & WESZPREMI, a BORELLO aliisque commendatum sit, & ab E. SQUARIO luculento experimento in femina confirmatum, quæ 45 minutis horæ in puteo merfa fuerat d), quod idem Amstelodami frequentissime efficax experti sint. Omnino etiam nunc, ut in HOOKII experimento, aere vi impulsio pulmo moribundi hominis distenditur, & redditur sanguini arteriæ pulmonalis libertas, qua in venam transire, pulmones expedire, in arterias viam sibi aperire possit. Cor etiam sinistrum, quod ab officio cessaverat, ad pulsationem redibit, stimulo recuperato, quo ex lege naturæ ad micandum compellitur \*\*).

Cum vero aut ob eam, quam accusavi, spumam \*\*\*), aut ob aliam quamcunque causam, aer impulsus difficilius pulmonem distendat, alio modo quaesitum est, ut cor quiescens, restituto sanguinis stimulo, ad micationem incitetur. Bonus olim ALBINUS m), & nuper ROEDERERUS n) suaserunt, compresso abdomine & pectore, sanguinem mechanica pressione urgere, ut ad cor sinistrum veniat.

Affine auxilium est id, quo WEPFERUS o) olim, deinde NEEDHAMUS p) corda mortua cogebat reviviscere. Inflat ductum thoracicum; aer in pulmonem veniens urgebat sanguinem, ut in sinistras cordis caveas subiret, ita pulsuum rhythmum redibant.

Non alienum ab isto consilium est incisionis venæ alicujus z), potissimum vero jugularis venæ \*\*\*\*), ut per amplæ, & cominus pulmoni præfectæ. Ostendi in vivis animalibus b), quoties cor quieverat & sanguis arteriosus a motu cessaverat, incisa vena sanguinem fluxisse, & cor ipsam ad motum rediisse, dum simul oneratus pulmo liberabatur. Id consilium vulgo notum est, & ab Amstelodamensibus passim utiliter adhibitum. In Cl. GUMMER experimento canis revixit, cui aquis merso casu †) jugularis vena læsa fuisset.

Plerumque tamen facilius auxilium præfertur, irritatio nempe quæcunque vehementior, sternutationem ††) cientia medicamenta, acria ori infusa †††),  
naribus-

d) adde PORTAL rapport. In puerpera PIA. IV. p. 174. alia p. 157. in vivo GRUBEL Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. IV. obs. 43.

\*\*) Lib. IV. ad fin.

\*\*\*)) Negat JEANNIN mort subite, p. 29.

z) adde PORTAL rapports in suffocatis a noxio vapore. Ceterum verba not. b) Anhelofos — — THRUSTON p. 64. huc quoque spectant.

\*\*\*\*)) DRENKELING l. p. 28.

†) Exp. 6.

††) Huc spectant loci THRUSTON, BRUHIERI & PARAEI not. i) laudati

†††) Journ. Helvetiqu. BOERHAAVE, vid. not. c).

naribusque, ignis admotus +++)), dolor quicunque vehemens r), adpersa abunde frigida \*), scintilla electrica \*\*), & potissimum clyster tabacarius \*\*\*) proprium per siphonem subditus, ut acris fumus incensi tabaci diu & repetito in intestinum impulsus id ad motum peristalticum sollicitet, ac eo motu ipsa sanguinis circulatio cordisve motus restituatur. Hoc instrumento Societates illæ beneficæ Amstelodami & Parisiis nunc feliciter uti solent s).

Bronchotomen referas ad inflatum aerem. Eam proprio libello DETHARDINGIUS junior commendavit, & experimento confirmavit \*\*\*\*), alii improbant.

p. 252. l. 4. *post liberum adde per totam vitam*

ibid. l. 9. *adde* Sed etiam in I. F. GMELINI experimento catellus sub aquamersus periit, cui foramen ovale nondum clausum fuerat. Et apud PIERKINUM Leodiensem submersus interiit, cui foramen ovale apertum erat l\*). Fabulosum est, castori aut phocæ adulto foramen ovale apertum patere.

ibid. l. antepenult. *post scripsit adde & alius, de quo Walther RALEIGH apud R. BATHURST;*

p. 253. l. 11. Sed in nixu collum---qui sub clavicula protuberaret *lege sed in nixu sanguinem in vasis stare & colligi ostendimus y\*)*.

p. 254. l. 1. *post salit adde in Stephani HALES experimentis in equa quatuor integris pedibus.*

p. 255. l. 6. *post qui adde arterias*

ibid. l. 11. non ea unice diameter *lege non axis siphonis solus,*

p. 256. l. 6. *post determinetur adde cui positis massæ a caloris gradibus*  
 $m = \frac{11 am + 8 bn}{11 a + 8 b}$ , & alterius massæ b gradu caloris  $n = \frac{11 am + 8 bn}{11 a + 8 b}$ ; inde positis massis aeris & sanguinis æqualibus, calore vero aeris minori, quam

++++) *Verhandel. der Holl. Maatschapp. IV. p. 418. ISNARD in libello.*

\*) Huc pettinent not. u) & x) quibus *adde* PIA spiritu salis ammoniaci in nares dato.

\*\*) In suffocatis a noxio vapore PORTAL. Canis, qui in specu Agnani lacus exanimis factus est, a solo aëre non facile suscitatur, melius in aquam projectus BIRCH *Hist. of the R. Soc. I. p. 421.*

\*\*\*) In exanimo a lapsu PIA IV, p. 137. Motum submersæ avi ego reddidi, non vitam.

s) *lin. 5. adde* PIONIER in *Journal des Savans.* PIA sæpe P. IV. ita revocari vidit, cum nihil aliud proficeret — *Et post n. 82. adde* Rejicit in casu vaporis noxii PORTAL.

\*\*\*\*) PIA IV. p. 178. 179. post semihoram. Laudant in *Drenkelingen*, I. p. 28. (Ceterum eæ notæ, quibus nullæ novi textus litteræ respondent, delendæ sunt).

l\*) SIGAUD *de la FOND* p. 298.

y\*) *Lib. VIII. Sect. IV. n. 34. p. 397.*

pag. 254. not p) *adde* Pulsus inspiranti minuitur GALEN *diff. respir. p. 12. Suffocatio voluntaria CIGNA respir. n. 3.*

*Fascic. III.*

E



- calor est sanguinis, ut  $a + 8$  sit incrementum caloris in aëre  $= 11$ . Ab ea formula *Rickmanniana* iterum aliter se habet, sed parum differunt omnes.
- pag. 256. l. 18. *post clauso adde aër.*
- ibid. l. 20. aereum *lege* sanguinem
- p. 257. l. subquindupla *lege* subquindecupla.
- p. 258. l. 5. *lege* & paulo ultra
- ibid. l. antepenult. *lege* Sed aer non renovatus amittit eas dotes, per quas ad respirationem aptus est. Cl. *Stephanus* HALEs u) 522 pollices cet.
- p. 259. l. 25. *adde* Id vero putatur fieri, si aer elaterem suum amiserit, quo in pulmone retinetur.
- p. 260. l. 15. *adde* Nunc quidem ostensum est, merito haëtenus dubitari, num id, quod aer in respirando amittit, id ipsum, propter quod ad respirandum utilis erat, & nunc definat utilis esse, num id elater sit. Putredinem suspicantur alii. Demus vaporem subputridum de pulmone halare, aerem inficere; is tamen certo adeo tenuis est, adeo debilitèr putridus, ut in homine sano nullum putredinis signum edat. Et tamen is aer retentus continuo suffocat, cum aer latrinarum evidenter putridus, aut aer de cadavere, multis horis respirationi sufficiat, & morbum faciat, non vero strangulet. Demus iterum vapores vitriolicos, sulphureos, bronchia constringere, pulmonem reddere immeabilem, nemo tamen in aere pulmone retento, aut in anima, ejusmodi acrimoniam ostenderit. Quare ne supra ea progrediamur, quæ certa fide nobis comperta sunt, in eo effato subsistimus, aerem, utcumque id fiat, certo per respirationem amittere eam aptitudinem, qua pulmonem dilatare atque sanguini iter aperire debet. Num vero aer vitiatu pulmo- nem quasi convellat, num unice cesset distendere, nondum definitio e\*), eo minus, quod nuperi clar. viri mortem ab aere putrescente illatam ne quidem defectui respirationis tribuant.
- p. 261. l. 9. *adde* & nuper Cl. JADELOT o\*).
- ibid. l. 18. *adde* Demum omnino eum nervum non comprimi certum est, qui in pleuræ canaliculo sibi exsculpto tectus descendat, neque convexus pressioni se offerat.
- p. 262. l. 17. *post recurrero adde* qui placitis STAHLII nunquam fidem dederim; irascentur potius, qui me a BOERHAAVII sententia & a mechanica

pag. 259. not. b) *adde* COTTE *meteorol.* p. 331. sic in animali per electrum occiso.

c\*) CARMINATI, p. 109. Siquidem in eodem aëre neque hirudo pereat, neque multi alii vermes.

pag. 261. not. o) *lege* KRÜGER *de nerv. phren.*

o\*) *Physf. corp. sani.*

secta deficere queruntur, ut plane apostata nomen mihi impingant. Verum non alia mihi secta est, nisi agnita veritas, aut id, quod mihi quidem verum videtur. Nunc tota respiratio &c.

pag. 262. l. 18. *post* vidi *adde* tum ut alii clari viri,

ibid. l. 19. *post* replent *adde* aerem retinent in distento pulmone, aut subito deplent cet.

ibid. l. penult. *post* aliaque *adde* meticulosa.

p. 263. l. 26. *lege* & quidem omnium minime

p. 264. l. 24. *post* produci *adde* facile

ibid. l. 25. *post* quam *adde* vix & *post* potui: In sternutatione posse non ignoro.

Sed nullus ejus violentiæ stimulus ab homine recte valente percipitur.

p. 265. l. 26. *adde* & inhiberi possit.

p. 266. l. 9. *adde* mortalium.

ibid. l. 14. *post* inclinatae *adde* aut demum, ut nuperi malunt, frigore occupatae somnoque fuere, cum arundinibus a vento merguntur.

p. 267. l. 8. *adde* a linteamine, a casei frusto, ab uvæ acino,

ibid. l. 12. *post* infantes & in Martinica insul. æthiopes,

ibid. l. 17. *adde* Subito demum ipsæ illæ hirundines ad ferendam hiemem natae, & irrevocabili morte pereunt, si sanæ validæque sub aquas mersæ tenentur.

p. 268. l. 1. *post* corpus *adde* peregrinum

ibid. l. 9. fringillam etiam minori tempore.

p. 269. l. 7. *lege* neque ad observandam naturam cet.

ibid. l. 12. *post* majus *adde* Celebre nomen est abbatis *Moccia*, viri ingenosi; obesi, qui nulla sub aqua mergitur. Hystericas feminas, dum paroxysmus viget, non mergi vulgo notum est, & multa ejusmodi exempla in *Causes celebres* collecta sunt.

p. 270. l. 13. *adde* Sed neque in strangulato homine mortem moratur.

ibid. l. antep. *lege* Eos enim homines creditum est ex apoplexia cet.

ibid. l. ult. *post* meras *adde* & vasa cerebri sæpe sanguine plena sunt.

pag. 262. not. s) *lege* GÜNZIUS.

ibid. not. x) *post* GALENUS *adde* mot. muscul. II. 5. ubi manifesto separat a corde & ab intestinis, quæ a natura reguntur, non ab anima;

ibid. not. 2) *lege* VALISNERI &c.

pag. 263. not. i) *lege* Passim de servis nigritis, quos citavimus. *Adde* THIBAULT, MARTINI.

pag. 264. not. l) *adde* Contra ea YPEY, p. 16.

ibid. not. u) *adde* YPEY.

pag. 268. not. p) *adde* Septem Astracani apud S. G. GMELIN It. II. p. 205.



pag. 271. l. 3. *adde* Vera tamen & vulgatio<sup>r</sup> mortis causa est, quod sanguis in arteriis pulmonalibus, in dextris cordis caveis, in venoso systemate collectus restagnat.

ibid. l. 9. *adde* luxatum caput *i*\*), ruptas vertebrae, ut caput de cute penderet; sic etiam a laqueo musculus mastoideus, musculos laryngis, laryngem ipsum fractos.

p. 273. l. 10. *lege* renumque

p. 276. l. 6. eas *lege* cartilagineas

p. 278. l. 19. *adde* Merito eadem, quæ a relabentibus in naturalem situm thoracis partibus, etiam absque musculorum motu, fiat, ultimum est naturæ fatigantis in moriente animali molimen.

p. 279. l. 4. *post* accesserit *adde* neque tunc aut facile, aut semper.

ibid. l. 7. *post* ratione *adde* & etiam is lobus solus natat, qui solus respiravit, dum alter fundum petit, ad quem aëri nondum datus est accessus.

ibid. l. 11. *adde* ut toties vidi in pullis meis.

p. 280. l. 4. *post* præstat *adde* Ita interpretor experimenta dissona clar. virorum, in quorum aliis pulmo fetus, qui nunquam respiravit, per putredinem natavit, in aliis subsedit. Vidi & ego subsedisse, cum aliquot mensibus pulmo in cloaca cum fetu fuisset servatus, & ex eo phænomeno causam summi reæ servandæ. Sed alias utique & certo natasse vidi. Maxima demum & perfecta putredo, postquam volatile omne & aër exhalavit, & solus fere mucus atque terra de fetu superest, iterum subsidentiam efficit *z*\*).

ibid. l. 8. *adde* quam videbit bullarum specie, de tota superficie aut pulmonis aut integri fetus, quasi efflorescere.

ibid. l. 11. *post* respiravit *adde* Summa putredo, quæ pulmonem & integra corpuscula fetuum in tabum resolvit, dissipato aëre iterum sinit tabum fundum petere, in quem pulmo versus est.

p. 281. l. 5. *adde* & III. PORTALIUS;

ibid. l. 8. *post* vitiis *adde* post pleuritidem, peripneumoniam, scorbutum, asthma, hæmoptoën

ibid. l. ult. *post* agitavit *adde* Neque enim adeo subito fetus respirat, neque cum vigore *u*\*). In fetu in utero pulmones compressi rubri fundum petie-

pag. 279. ad verbum densus in textu lin. 3. *adde* not. *i*\*) BÜTTNER zweyköpfige Frucht, p. 13. 14. Sed nuper addit, non tamen ut subsideat.

*i*\*) SABBATIER p. 102.

*z*\*) BOCKEL.

pag. 280. not. *u*) lin. 2. *adde* BÜTTNER zweyköpfige Frucht, II. BOSE de diagnosi vitæ fetus & neogeniti.

*u*\*) SABBATIER II p. 131.

runt *u\*\**). Etiam pulmo fetus mortui inflatus, cum pars nataret, parte sui subsedit *u\*\*\**).

Apparet, siquidem hæc est ex celeberrimis quæstionibus ad medicinam forensam pertinentibus, argumentum a pulmone natante & subsidente repetitum bonum esse verumque, ut subsidens ostendat fetum non respirasse, natans respirasse confirmet, neque fallere, dum sumus memores, putredinem efficere posse, ut pulmo fetus natet, etsi nunquam aërem duxit; morbum facere, ut subsideat, qui dudum & repetito respiravit. Novi Ill. viros etiam nuper dissentire, & negasse putredini eam potestatem, sed certo, quæ vidi, refero, & quæ nullo experimento negativo possunt refutari.

pag. 282. l. 7. *post* subsidet *adde* cujus eventus certa sunt testimonia.

Compressus in fulgurato, in animali in crypta canina enecto.

ibid. l. antepen. *post* undique *adde* a contracto pectore

p. 283. l. 24. *adde* Cl. BERNARD per respirationem singulò in pulsu plus aëris in sinistrum cordis ventriculum penetrare, calculis positus, existimavit.

p. 284. l. 13. *adde* Apparet adeo, quod non adeo facile erat prævidere, eundem esse effectum diutius protractæ inspirationis & respirationis; in priori casu & in altero, perinde vasa sanguinea compressa esse & sanguini impervia. Inspiratione protracta vasa & bronchi se spontanee contrahunt, cum a corrupto aëre male distendantur. Post longiorem expirationem, & vis contractilis bronchiorum pulmonem constringit, & una thoracis pressio.

p. 285. l. 11. *post* transmittunt *adde* frigida eadem,

ibid. l. 13. *adde* Iidem branchiis vinculo constrictis male afficiuntur, hiant, celeriter os aperiunt, clauduntque, & morti videntur proximi. Laxato tamen vinculo ad se redeunt Ill. GIOVANO teste. Sed hujus phænomeni alia causa est, & sanguinis unice circuitus turbatur, non exigua arteria vinculo intercepta.

ibid. l. ult. *adde* reviviscunt *a\*)*.

*u\*\**) BÜTTNER l. c.

*u\*\*\**) Id. ibid.

pag. 284. l. 22. *ad verbum* avibus *in textu* *adde* not. *b\*)* Aves continuo SPALANZANI opuscoli I.

ibid. not. 2) *adde* etiam vipera.

pag. 285. not. *k)* *adde* Catellus non revixit.

ibid. not. 3) *adde* SPALANZANI.

ibid. not. *t)* lin. 2. *adde* Non pereunt BOYLE n. 62. — lin. ult. *adde* Ad se redierunt *Philos. Transf.* n. 33.

ibid. not. *y)* lin. 1. *adde* Sic SPALANZAN. ibid. — lin. ult. *adde* Reddito aëre convalescunt BOYLE n. 62.

ibid. not. 2) *adde* Aliæ perierunt BOYLE n. 62, aliæ ad se redierunt.

*a\*)* BOYLE l. c.



- pag. 286. l. 3. *lege* Etiam facilius exsanguia animalia aut aëre carēnt *h\*)* aut levio-  
riorem & rarefactum ferunt *c)*, ut cochleæ, aut congeneres limaces *d)*, cet.  
ibid. l. 7. *post* volare *adde* sunt, quæ, mortua cum videntur, aëre reddito vitam  
recuperent *i\*)*.
- p. 287. l. 15. *adde* Contrarius est expirationis in venosum abdominis sangui-  
nem effectus. Quum enim diaphragma venam cavam inter inspirandum com-  
primat, sanguinem a pectore repellit, intra hepatis venas & inferiorem cavam  
cogit refluere; exspiratio contra laxato diaphragmate, agentibus nunc abdo-  
minis musculis universum abdomen urgentibus, sanguinem cordi facilius  
reddit.
- p. 288. l. 18. *adde* Erinaceus, qui hieme sopitur, non respirat conglobatus;  
idem respirationes molitur, si extenderis *t\*)*.
- p. 291. l. 21. *lege* Contra in maligna febre celerem respirationem viderunt  
clari viri, pulsu parum mutato *m\*)*.
- ibid. l. 23. *adde* In Cl. MARTINI annotationibus pulsus in variolis alio & alio  
tempore diversam ad respirationem rationem habent. Fuerunt pulsus 127  
cum respirationibus 35, & 140 cum respirationibus 37, & sic aliæ &  
aliæ rationes fuerunt *n\*)*.
- p. 292. l. 12. *adde* Alios calculos inivit Cl. BERNARD, quos nunc, cum hæ-  
res non possint certis experimentis definiri, malumus omittere.
- p. 296. l. 21. *adde* Sed ea melius dicemus, quando de fugendo lacte fermo erit.
- p. 298. l. 13. *post* moratu *adde* ut arteriæ distendantur *m\*)*; & *post* aneurysma-  
ta *lege* a nisu adeo frequenter nata, ut etiam in equis *n\*)* notissimum mor-  
bum efficiant, demum a nixu arteriarum & venarum, ipsiusque cavæ dirup-  
tiones, inque nitentibus crebræ cet.
- ibid. l. 15. *post* sparsæ *adde* ut hæmoptoen nimis notam omittam.
- ibid. l. antepen. *post* pulmonem *adde* cujus vasa rumpi visa sunt *q\*)*; & *post*  
capitis *adde* congeritur;

*q\*)* SPALANZANI tardissime pereunt.

*i\*)* BOYLE *Phil. Transf.* n. 63.

*t)* TARGIONI *Viaggi*, VII. p. 177.

*n\*)* *Wetensk. Academ. Handling.* 1773. Trimestr. 3.

pag. 298. not. *m)* *adde* In minimis vasculis sanguis a nisu acceleratur CALDANI experi-  
ment.

*m\*)* HALES p. 162.

*n)* *lege* LANCIS. *aneurysm.* p. 110. edit. nov. Le DRAN *obs.* 150. *Hist. de l'Acad.* 1700.  
*hist.* 6. 1750. *hist.* 3. SAVIARD *obs.* 40. GUATTAN. *obs.* 2. RELOF *Mém. de Berlin.* T. XIII.

*n\*)* Fontes ascendentes Ger. V. SWIETEN III. p. 288.

*q)* *lege* HIPPOCR. *Epidem.* IV. n. 14. cum homo alinum sustulisset.

*q\*)* CLAUDER *de method. balsamand.* p. 175. in cane.

pag. 298. l. ult. *adde* Ruptæ venæ *t*<sup>\*)</sup>; sanguis effusus sub membrana pulmonis, qua ad claviculam veniebat *t*<sup>\*\*)</sup>.

p. 299. l. 2. *adde* Eodem pertinet sanguinis tantus impetus, ut per lotii vias exeat *u*<sup>\*)</sup>, inque cutis vascula *u*<sup>\*\*)</sup>, & in varia spatia cellulosa *u*<sup>†</sup>); ut etiam de labiis erumperet *u*<sup>††</sup>).

ibid. l. ult. *lege* isque succedit

p. 301. l. 4. *post* calculosa *adde* minime rara

ibid. l. 6. *adde* officula, nummi, uvæ acini, spica graminis.

p. 302. l. 20. *adde* Demum a calcis vapore, ab helleboro, frequentissime repetita.

p. 303. l. 4. *adde* Pisum de aspera arteria succussione ejus rejectum.

A stimulo facilius extorquetur, quam tussis, certe in homine; stimulum autem putes teneriori membranæ admoveri, nempe narium, quæ acutius, quam in bronchis sentiat.

p. 305. l. 4. *adde* Voluntatis opus agnoscas, cujus in cerebro sedes est, & quæ organa sibi idonea, nec alia, in motum ciet.

p. 306. l. 16. *post* extinxerunt *adde* Diaphragmati inflammato & læso, certissima testimonia sunt, neque risum supervenisse, neque singultum. Optimus olim ITHIUS, quo cariorem & gratiorem discipulum nullum habui, cum ex morbo acuto interiisset, diaphragma inflammatum, abscessu etiam erosum habuit, neque ullus risus præcesserat.

A calculosa materia convulsiones & risum Sardonium natum legi, nempe eam faciei conditionem, quæ in risu obtinet.

pag. 308. l. 4. *adde* A risu aneurysma. Vulnus arteriæ a risu funesto eventu recruduit.

p. 310. l. 1. *post* incluso *adde* aut ab ejus abscessu *y*<sup>\*)</sup>,

ibid. l. 9. *post* reformidavi *adde* Par fere causa singultus fuit in dysenteria, in gangræna intestinorum, a ventriculo a protracto epiploo laceffito;

ibid. l. 17. *adde* ab ictero ex abdominis vulnere.

p. 311. l. 12. *lege* & *post* sonum succedit exspiratio, ita certe vulgo docetur, nescio quid enim mihi superest obscuritatis.

*t*<sup>\*)</sup> *Zod. Gall.* III. p. 444.

*t*<sup>\*\*)</sup> *BECKET obs. chirurg.* 16.

*u*<sup>\*)</sup> *LISTER ad Aphorism.* HIPPOCRAT. p. 121.

*u*<sup>\*\*)</sup> *Sudor inde cruentus Eph. Nat. Cur. Cent.* VIII. *obs.* 81.

*u*<sup>†</sup>) *In scrotum SAVIARD* p. 129.

*u*<sup>††</sup>) *In ultimo Epiri principe Alexandro, quem vulgo vocant Scanderbeg S. ALBERTI de sudore cruento.*

*y*<sup>\*)</sup> *YPEY* 202. 203. *Pure per alvum decedente idem quievit.*

*pag.* 311. *not. u)* *adde* *TSCHUDI, de singultu, STÖRZEL de singultu.*

*ibid.* *not. x)* *adde* *TSCHUDI.*



- pag. 311. l. penult. *dele* Num fit inter --- & vidi in puerulis.  
 p. 312. l. 2. *post* trahitur *adde* Immo vero Cl. STÖRZEL putat in singultu œsophagum manifesto moveri, & ventriculum sursum trahere *a\*)*. Sed repugnant phænomena diaphragmatis descendentes, cum quo non potest non œsophagus descendere.  
 ibid. l. 16. *lege* satellitium

## S E C T I O V.

## R E S P I R A T I O N I S U T I L I T A S.

- P** Ag. 314. l. 18. *post* privatur *adde* ita certe relatum est.  
 ibid. l. 23. *post* vixisse *adde* Eodem tempore catellus vixit, quem, postquam respiraverat, BUFFONIUS lacte merfit.  
 p. 317. *post* extensione *adde* a capite extenso, collo educto, arteria aspera dilatata, a nixu fetus ad contrahendos omnes suos musculos edito.  
 p. 318. l. 25 *post* suscitentur *adde* per multa & bona experimenta, quod cor, quod absque motu fuit, nunc micet, id pertinere cet.  
 p. 319. l. 6. *post* rejiciunt *adde* Sic universa animalia, quæ in testis vivunt, ibid. l. 8. *post* introducunt *adde* universasque corporis partes adeunt.  
 ibid. l. 13. *adde* De polypis utique, aliisque animalibus perpetuo sub aqua viventibus, simplicissimis, corde destitutis, non affirmavero spirare: sed vermes, mollusca, insecta, quadrupeda, aves, respirant; neque pisces absque renovato aëre vivunt.  
 ibid. l. ult. *lege* fanos & *post* commercio *adde* Demum experimenti causa Cl. HERISSANT bufones in gypsum inclusit, vixerunt duobus mensibus.  
 p. 320. l. 15. *post* ævo *adde* ab HIPPOCRATE, ARISTOTELE & GALENO  
 p. 322. l. 21. *post* percepisse *adde* in suffocato infante globulos aëreos ROEDERERUS vidit.  
 p. 323. l. 8. *post* demum *adde* in morbo boum, in renum, aliorumque viscerum superficie, & intestinorum, in ovarii sacco  
 ibid. l. ult. *post* tympanites est *adde* sæpe & alias visus  
 p. 324. l. 2. *post* regionibus *adde* in abdominis, in pectoris cavitates effuso.  
 ibid. l. 11. *adde* Aërem, quo otides irata pellem sub collo inflant, putes ex pectoris cavea eo venire.

pag.

*a\*)* l. c.pag. 312. not. c) *adde* ARISTOTELES *posth.* 33.pag. 319 not. h) *adde* *Extrait des Journaux*, 1773. Janvier.

pag. 325. l. antepen. *adde* Extant equidem nuperrima experimenta Cl. DARWIG, quibus hæc omnia videntur refutari. Nempe jugularem venam & vesiculam felleam sub antlia pneumatica non intumescere subtracto aere, neque venam cavam sanguine plenam, vesicam urinariam utique d\*). Mira hæc, quæ contra tot alios clar. viros adoptare vix ausis.

p. 328. l. 20. *lege* reddi.

ibid. l. ult. *adde* de quibus alias fufius agemus.

p. 331. l. 1. *lege* admitti,

ibid. l. 6. *lege* advenire.

p. 332. l. 4. *adde* ut nuper Cl. CIGNA.

p. 333. l. 17. *adde* Idem alii elementum pro electrica materia habent.

p. 334. l. ult. *adde* & imminentem putredinem averti DOSSIE.

p. 335. l. 11. *post* admistam *adde* & plurimum phlogisti,

ibid. l. 15. *dele* nitri.

ibid. l. penult. *post* adhærescens *adde* cum calce addita

p. 336. l. 1. Non *lege* Nam & *post* parari *adde* in nitrum

ibid. l. 4. *post*. aerem *adde* internum corporum

p. 337. l. 13. *adde* & in quibus aer verus elasticus admistus, neque solutus adest.

ibid. l. antepen. *adde* Ipso calore sanguinis sanguis a 96 ad 120 gradum dilatur, ut volumen ejus  $\frac{1}{517}$  augeatur o\*). Aliquantum sanguinem comprimi posse non miraberis, cum nuper demum compertum sit, & aquam, & vini spiritum, & olea aliquantum comprimi posse, ut tamen ea ratio exigua sit, & 44. 48. atque 66 per millionem divisis o\*\*).

p. 338. l. 19. *post* nasci *adde* aut demum, ad nostros enim fines perinde est, ad fermentationem pertinet, quæ putredinem præcedit.

p. 339. l. 13. *post* tunc *adde* arteria sanguine plena.

p. 340. l. 20 *adde* Viscera ipsa & sanguis in cadavere, qua aer contingit, florida rubescunt. Oricellæ etiam tincturæ & purpuræ muricinæ aer demum ruborem impertit. Sed hæc dudum expendimus.

p. 341. l. 10. *post* hæmoptoe *adde* cui nulla, nisi simplicissima medicatio chirurgica adhibita fuit.

p. 342. l. 14. *post* exit *adde* & de otide diximus, quæ pellem inflat.

p. 343. l. pen. *lege* & 482 ad 464  $\frac{4}{5}$

pag. 329. lin 15. *ad verbum* receptus *adde* not. y\*\*) Contraria quidem horum NOLLETUS, & plus inspirari aëris quam expiratur.

o\*) FALCONER *bathwaters*, T. II.

o\*\*) *Philos. Transf.* V. LIV.



pag. 344. l. 14. 120 lege 125.

ibid. l. 22. 32. lege 36.

ibid. l. 23. adde retentis mensuris *Stephani* HALES.

p. 346. l. 17. lege ut illum potius calefaciat,

p. 348. l. 10. adde quorum uterque intra idem tempus evacuatur.

ibid. l. 15. lege neque tamen aliquem eo tempore fuisse pulmonem,

p. 350. l. 14. adde In morbis etiam ostendimus, perpetuo latiore fuisse cordis ventriculum, qui difficulter se suo sanguine liberabat.

ibid. l. 22. lege quem arteriosus ductus de sanguine in pulmonem tendente avehit.

p. 351. l. 1. lege accessum

p. 352. l. ult. adde non vero repugno.

p. 354. l. 16. adde Particulæ per pulmonem putrescentes potissimum diffillantur, cum ad eam degenerationem humores nostri sponte inclinent x\*). Hæ etsi etiam de cute cum perspiratione *Sanctoriana* perspirant, tamen per pulmonem copiosius aufugere videntur x\*\*). Multo enim uberior hæc est exhalatio quæ modico in frigore oculis conspicua reddatur; non perinde perspiratio cutanea, quam demum in aere multo densiori fodinarum *Clausthalienium* pariter de digitis fumantem vidi. Magis etiam odorata est anima.

Una aufugiunt particulæ alcalæscences x\*\*\*) foetidæ, seu eadem fuerint cum putridis, ut vulgo putatur, seu conjunctæ.

Demum phlogiston superfluum ea via dissipatur x†) adeo manifesto, ut homo in camera paulo accuratius clausa a pastu obambulans, phlogisti portionem in aere ejus camerae tertia parte augeat x††).

Non ideo sanguis refrigeratur, cum in sinistro corde non sit frigidior x†††); cavetur tamen, ne nimium phlogisti in animali coarcescetur summo cum ejus periculo.

p. 355. l. 2. adde Quare nuperrime Ill. CIGNA noxii humoris de sanguine secessionem pro præcipua utilitate habet, quam respiratio animali præstet.

p. 357. l. 19. lege sanguinem

p. 358. l. 12. lege venarum

pag. 346. not. k) adde Non esse ALBINUS nat. hom. p. 50.

x\*) Libr. V.

x\*\*) HOFMANN, qui eum finem faciendi pulmonis præcipuum fuisse putat.

x\*\*\*) LANDRIANI.

x†) Idem p. 29.

x††) Idem p. 48.

x†††) p. 1,0.

pag. 358. l. 15. *post* apparuit *adde* Sed neque nuper Cl. SPALLANZANO, qui in pulmone sanguinem celerius quam in mesenterio fluere vidit, quam in palato vero lentius.

ibid. l. 23. *lege* Et absque eo elemento in pulmonem recepto perinde cet.

p. 360. l. 3. *post* BOERHAAVIUS *adde* atque nuper BUFFONUS, qui pulmonem pro follibus habet, quorum motu vitalis ignis excitatur.

p. 361. l. 29. *dele* Venæ cavæ pressionem---hic non repeto.

ibid. l. ult. *adde* De venoso sanguine fere dico, in aortam enim diaphragmati multo minor est potentia.

p. 364. l. 15. *post* vox est *adde* ut olim Radulphus BATHURST vidit.

ibid. l. 16. *post* huic *adde* inter certas & evictas respirationis utilitates

ibid. l. ult. *adde* Hæc ita dicta volo, non ut aliam aliquam efficaciam ad vitæ radices profundius penetrantem, in respiratione esse negem; id volo, de ejus ignotæ utilitatis natura, quam etiam animalibus in testis habitantibus & insectis aer in intimis præstet, mihi nondum liquere.

p. 365. l. 1. *dele* Parum forte satisfactum---perspicacior intellexero.

ibid. l. 18. *post* scaturiginem *adde* Ita antagonismum esse diaphragma inter & pleuram atque peritonæum, quas membranas cum suis cellulosis telis diaphragma alternis vicibus distrahat f\*).

ibid. l. penult. ineptæ *lege* lentæ & *lin.* ult. *adde* nimis lentum, nimis inconspicuum, quam qui ad circuitum sanguinis adeo rapidum proximi aliquid conferat.

f\*) BORDEU *sur le tissu muqueux*, p. 77. cet.



# ELEMENTORUM PHYSIOLOGIÆ

## LIBER NONUS.

### VOX ET LOQUELA.

#### SECTIO I.

##### LARYNX IN UNIVERSUM.

- P**ag. 366. l. 10. *post* quadrupedibus *adde* calidis  
 p. 367. l. ult. *post* pictas *adde* & medulla,  
 p. 369. l. 6. *post* offescit *adde* etiam ut medullam contineat;  
 ibid. l. penult. *post* arteria *adde* & nervus,  
 p. 371. l. 1. *post* mente *adde* quam præfens naturæ testimonium  
 p. 372. l. 17. *adde* etiam cetis  
 p. 374. l. 4. *post* protegat *adde* quod miror potuisse nonnemi negari  
 ibid. l. 6. *adde* osseam factam negat MORGAGNUS se vidisse.  
 p. 376. l. 10. *post* vetusta *adde* GALENO dicta & ORIBASIO, non ignorata  
 C. STEPHANO & EUSTACHIO, pro re nova a Severino PINEAU dicta, aque  
 LAURENTIO  
 ibid. l. ult. *post* innotuit *adde* BARTHOLINUS, C. BAUHINUS, DRELINCURTIUS,  
 & pro nova iterum re SCHELHAMMER.  
 p. 377. l. 2. *adde* Muci sunt receptacula fatis affinia valvularum, quas in mu-  
 liebri pudendo dicemus.  
 p. 379. l. 9. *adde* Membranaceum ligamentum ab epiglottide ad capitula car-  
 tilaginum arytænoidearum abit, in quo in animalibus subinde duæ cartila-  
 gines obliquæ reperiuntur *m*\*).  
 p. 380. l. ult. *adde* III. CAMPERUS tensionem ligamentorum minutius expo-  
 suit *b*\*). Basin ossis hyoidis sibi relictæ in statu naturali cartilagini thyreo-  
 ideæ incumbere; in voce vero acuta reddenda os hyoides per suas vires an-  
 trorsum duci, ut ejus ossis basis ultra cartilaginem thyreoideam producat,  
 & simul larynx pone basin ossis hyoidei elevetur; ita & ipse sursum it, & os

p. g. 369. not. c) *adde* CAMPER apud BUSCH *de organo vocis*.

pag. 376. not. o) *adde* Ab obstructis ventriculis vocis vitium NEMESIUS.

*m*\*) CAMPER ap. BUSCH *de mechanism. organ. vocis homin.* 1770. 4.

*b*\*) Apud BUSCH l. c.

hyoideum antrorsum. Dum nunc cartilago thyreoidea ascendit, tendi ligamenta glottidis necesse est; dum enim ea cartilago sursum it, arytaenoidea cartilaginee immotæ persistant: dum interim (forte) aspera arteria diducta & una cricoideam abducit, sic ut sola thyreoidea sursum eat. Porro ab osse hyoide thyreoidea in priora trahitur, cricoidea actione cricothyreoidei postici retrorsum. Ita ligamentis tensis vox acuta producitur.

Contra in gravi voce cricoidea cartilago antrorsum ducitur, ita ejus distantia a cricoidea nulla fit. Cricoarytaenoidei postici muscoli cartilaginee ejus nominis deorsum & ad latera trahunt, processus anteriores ad se invicem adducunt, ita bases earum cartilaginum deducuntur, glottis fere clauditur, sola pars postrema rimæ dilatatur.

pag. 382. l. pen. *lege* transversum

p. 395. l. 17. *adde* Si vero thyreoidea cartilago alia a causa eodem tempore antrorsum it, cricoideam ipse retrorsum ducit, & glottidem tendit c\*\*).

p. 386. l. 6. eo magis vero diducit--& ligamenta relaxet *lege* guttales etiam cartilaginee hætenus vertit, ut bases finem interiorem ad anteriora convertat, exteriorem ad posteriora.

ibid. l. 18. *adde* Contra CAMPERUS eum capitula quidem cartilaginum arytaenoidarum ad se invicem adducere, sed bases diducere, rimam posteriorem dilatare, glottidem claudere docet. Nondum quidem hic a sententia recedo, cum præterea musculus, de quo scribo, cum thyreoarytaenideo idem sit, qui, ipso CAMPERO consentiente, ligamenta glottidis relaxat.

p. 388. l. 1. *post* diducat *adde* sic etiam CAMPERUS.

p. 389. l. 15. *adde* A genioglossa WALTHERUS deduxit.

p. 390. l. ult. *adde* a stilopharyngeo ad epiglottidem fibras WALTHERUS deduxit; a primæ vertebræ processu transverso in totam partem transversam thyreoideæ cartilaginis *Nicolaus HABICOT*.

p. 391. l. 17. *adde* Is mucus coactus in membranæ speciem abit in morbo, quem Scoti superiores medici descripserunt, & dixerunt suffocationem stridulam.

p. 397. l. 9. *adde* Majores alias hydatides fuerunt.

ibid. l. 13. *post* vidit *adde* quæ numerosa nuper egregius incisior *Guil. HEWSON* vidit, in dextro latere in angulum venam inter jugularem & subclaviam inserta, in sinistro in ipsum ductum thoracicum.

pag. 385. *ad verbum* posterioribus in *textu* lin. 17 *adde* not. c\*) CAMPER apud BUSCH.

c\*\*) Tendere Cl. SABBATIER, II. p. 93. cujus sententiæ argumenta nunc non possum in præsentem larynge expendere.

pag. 386. not. h) *adde* CAMPER.

ibid. not. n) *adde* CAMPER.

pag. 388. not. b) *adde* CAMPER.



- pag. 399. l. 14. *adde* neque infrequens est, in morboſa glandula vias apertas ad caveam aſperæ-arteriæ duxiſſe.
- p. 404. l. 6. *adde* Eſt ubi altera ab aorta acceſſit.
- p. 406. l. 19. *lege* Major eſt, & a GALENO inventore *n*) celebratus, quem cet.
- p. 408. l. 6. *rarum lege* ramum
- p. 409. l. 3. *adde* & in animali nuper Cl. PORTAL.
- ibid. l. 9. *poſt* ſcriptores *adde* idemque, quem laudavi, PORTALIUS.
- ibid. l. 17. *adde* quo videtur Cl. CAVERHILL eventus pertinuiſſe, qui vocem debilitari vidit, non totam tolli.

## S E C T I O II.

## O R G A N A L O Q U E L A E.

- P**ag. 414. l. 2. *adde* ſolet autem in quadrupedibus magis cõpoſitus eſſe. ibid. l. ult. *adde* vel certe a membrana tendineâ claviculæ affixa *q*\*).
- p. 415. l. 16. *adde* aut in altero latere, aut in utroque.
- p. 418. l. 20. *poſt* fuerit *adde* ſive nunc in ſua cum oſſe temporum dearticulatione fundata fuerit, ſive retenta a maſſeteribus, temporalibus, & internis pterygoideis, clauſo ore aut aperto, erit maxilla inferior muſculo biventri pro cet.
- p. 419. l. 4. *adde* Eodem tempore & maxillam ſuperiorem elevare & inferiorem deorſum ducere alii *r*\*).
- ibid. l. 11. *adde* In deglutiendo utique agit, ejuſque muſculi actio digitis percipitur.
- p. 421. l. 20. *adde* Quadrupedibus oviparis aliqua eſt minus libera, ut de ea in ipſo crocodilo ambigatur *c*\*). Inſectis REAUMURIUS (certe api), cochleæ SWAMMERDAMIUS linguam tribuit.
- p. 422. l. 20. *adde* Nuperos chirurgos video de hoc frenulo, deque ejus amputatione, ut de re non rara & de neceſſario auxilio, dicere.
- p. 431. l. 18. *adde* atque uvula corrupta multos commode loqui HILDANUS teſtis eſt.
- ibid. l. 20. *lege* per veli palatini vitiata organa cet.

pag. 403. not. *b*\*) *adde* NEUBAUER & ERDMANN *diff. poſth.* T. 2. f. 2. MECKEL in *epiſt. ad me* II. n. 321.

*q*\*) SABBATIER ibid.

*r*\*) SABBATIER I. p. 411.

*c*\*) Nullam habere ARISTOTEL. Part. IV. n. 11. SEBA T. CX. f. 1.

## S E C T I O III.

## T O N I.

- P**ag. 434. l. 8. Neque tamen dissimulandum est secundum Cl. la CHAPPELLE totum artificium poni in aëri penu, quem ventriloquus in posteriori parte cavæ oris reservat, & pro arbitrio edit.
- ibid. l. ult. *post* aquaticis *adde* auctore olim ALDROVANDO,
- p. 436. l. 12. *dele* erinaceo,
- p. 438. l. 13. *adde* lutra, lepore,
- ibid. l. 14. *post* RUNGII *adde* atque veteris amici I. GESNERI, demum PORTALII. Idem experimentum eodem cum successu in larynge inferiori avium aquaticarum DUVERNEYO successit.
- p. 440. l. 7. *post* percipitur *adde* una aryænoideæ cartilagine retrorsum ducuntur, & ad se invicem accedunt.
- ibid. l. 8. *adde* descendit etiam sola restitutione, quando vires elevantes desinunt agere.
- p. 442. l. antepen. *adde* In tussi convulsiva sonus acutus fit ob glottidis arctationem.
- p. 445. l. 22. *lege* sonorum
- p. 451. l. 8. *adde* Pro FERRENIO etiam Ill. CAMPERUS sentit, tantum ut vocem artificialem imperfectam & fuscam esse moneat, qualem nunquam non audi.
- p. 453. l. 3. *adde* A vocis robur aërem in avibus omnes fere in caveas etiam ossium receptum facere posse, Cl. I. HUNTER, quod in serino sit manifestissimum t\*).
- ibid. l. 21. *dele* in erinaceo---pene membranea.
- ibid. l. antepen. *post* lacerta *adde* vocali
- ibid. l. ult. *adde* Gravem & clangosam vocem gruis plicæ tres asperæ arteriæ fecerint, quæ in propria sterni carne repetito contra se ipsam inflectitur, qualis etiam in cigno est sylvatico.
- p. 458. l. 17. *dele* Addi posset---ad humanam accedere.
- ibid. l. 22. *post* exprimunt *adde* aut alias aves, cum quibus educantur, discunt imitari,

pag. 432. not. s) *adde* cum nulla uvula esset, adultior certas litteras pronuntiare non poterat WEDEL morb. infant. p. 12.

pag. 435. not. l) Quæ in prima editione Auctor de vocis in anseris organo p. 449. & 450 not. t) disputavit, ea in nova huc retulit.

t\*) Phil. Transact. n. LXIV.



## SECTIO IV.

## LOQUELA.

Pag. 465. l. 12. *adde* Ut possint in lingua Tamulica 13 diversæ vocales esse, aut 16 in Sanscritica, id quidem non intelligo *m*\*).

ibid. l. 19. *adde* Insulæ Taiti *e, g, f, z*, non pronuntiant; Irosekii *b, f, m*, & *p*.

ibid. l. antep. *adde* Sunt tamen in lingua Sanscritica evidentissimæ litteræ consonantes, quas numerant omnino 35 *r*\*). In Tamulica, cui tantum 18 numerant, sunt tamen duæ Europæis ignotæ & sæpe a Danicis missionariis citatæ *r*\*); quare fit, ut alii & alii Europæi eas suis litteris aliter expriment, etiam ut alii *d, b* scribant, alii *r*.

p. 468. l. 12. *adde* A Chinenfibus *d* nunquam pronunciatur

p. 472. l. 15. *adde* Hæc vitia potius ad veli palatini morbos retulerim, quam ad uvulam proprii nominis *r*\*).

p. 474. l. 8. *post* lego *adde* & alia affinia exempla video.

ibid. l. antepen. *post* docent *adde* restituere.

p. 475. l. 18. *post* pendet *adde* & lusciniæ, si absque parente cum alia avicula canora fuerit educata, ejus vocem suam facit, neque porro lusciniæ cantum canit.

p. 478. l. 11. *adde* Nuper legimus esse Edimburgi Cl. BRAIDWOOD, qui scholam pro docendis surdis & mutis aperuerat, ut virginem etiam mathemata docuerit *q*\*).

Deinde Cl. ARNOLD, V. D. M. propè Gießam his ipsis annis patritium puerum Bernensem loqui docuit ad AMMANNI fere morem, ingeniosis artibus adjutus.

Cl. LASSUS & Abbas EPEE *q*\*\*\*) potius symbola aliqua & inventionem docent, etsi LASSUS in principio etiam loqui docuit, quod institutum ob ingrate vitiosos accentus deseruit.

p. 479. l. 6. *adde* Aliquanto facilius fit, quod hi pueri muti & surdi ingenio soleant valere.

ibid. antep. *post* PORTA *adde* quod artificium nuper in Germania repetitum fuit.

ibid. l. ult. *adde* ita omnino omnes soni, calvariæ ossibus utcumque impressi, exaudiuntur, etiam quando tympanum & reliqua auditus organa officio suo fungi desierunt.

*m*\*) Anquetil du PERRON Voyage.

*r*\*) Anquetil du PERRON.

*r*\*\*) Idem.

*r*\*) vid. p. 432.

*q*\*\*) JOHNSTON rel.

*q*\*\*\*) Institut. des sourds & muets, à Paris 1776. 12.

pag. 479. not. *r*) *adde* Minime vero successit LASSO aut ARNOLDO. Sonum audiebant, litteras non distinguebant.

AUCTARIUM  
AD  
ALBERTI HALLERI  
ELEMENTA  
PHYSIOLOGIÆ  
CORPORIS HUMANI.  
*FASCICULI QUARTI PARS PRIMA.*

CEREBRUM. NERVI. MUSCULI.



LAUSANNÆ HELVETIORUM,  
Sumptibus JULII HENRICI POTT ET SOCIOR.

---

M. D. CC. LXXXII.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
THE JOURNAL OF  
THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

Published weekly, except during the summer months, when it is published bi-weekly.  
Subscription price, \$5.00 per annum in advance.  
Single copies, 15 cents.  
Entered as second-class matter, May 1, 1902, under post office number 250, at Chicago, Ill., under special agreement of post office and postmaster at special rate of postage provided for in Section 1103, Act of October 3, 1917.  
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103, Act of October 3, 1917, authorized on July 1, 1964.  
Postmaster: Send address changes in this journal to The Journal of the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill. 60610.

Published by The American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill. 60610.  
Copyright, 1964, by The American Medical Association

---

# ELEMENTORUM PHYSIOLOGIÆ

C O R P O R I S H U M A N I.

T O M U S Q U A R T U S.

---

P R Æ F A T I O.

- P** ag. VI. l. 19. *lege* Sed in altero latere & ego reliqui, ut discrimen appareret.  
 p. VII. l. ult. *post* incidi *adde* ad eas fibras valvulam pariter, & majori jure pertinere.  
 p. VIII. l. 1. *dele* Tantum do interim---aut emendare studebo.  
 ibid. l. 7. *adde* Ostendi in libro XXIV discipulos rariter cellulosæ telæ valvulæ coli tribuisse, quos æquum sit, sua a præceptore hausisse.  
 ibid. l. 22. eandem *lege* accuratius.
- 

P R Æ F A T I O A L T E R A A U C T O R I S.

**P** Riman præfationem omittere destinaveram, nunc etsi non omitto, omnia certe pressi undique, quæ in morituro fene aliquam in præceptorem ab æternitate susceptum simultatem prodere possent. Rebus enim pensitatis, vidi, cum annotationes ALBINI supersint, sintque ad posteros sua ob merita perventuræ, non posse me defensionem meam premere, quam æquum sit, una cum accusatione superesse, ne posterius de lite ab Ill. viro mihi mota ex sola accusatione judicent. Eo magis vero necessariam apologiam esse persuadeor, quod me vivo & superstite, etiam docti viri, etiam minus iniqui, passim de ea lite ita scripserint, ac si de invento aliquo anatomico lis fuisset, quod ego mihi tribuissem, ALBINUS sibi vindicasset. Nunc nihil subfuit ejusmodi causæ. Membranæ enim pupillaris inventæ gloriam dudum WACHENDORFIO cesseram, ALBINI merita laudaveram in detegenda vera structura valvulæ coli.

In novo opere monendum duxi, me de cerebro, ejus anatome, & functionibus, plus adjecisse, quam in aliis solebam operibus. Cum nulla pars œconomiae animalis obscurior sit, & numerosioribus obnoxia litibus, cum passim nos lux anatomes deferat, cum eam supplere sim conatus collectis ex morbis, exque



morbosis corporibus annotationibus, aliquanto liberalius putavi collecta exempla me repetere debere, ut de constantia veri constet. Neque enim dubium est, eum eventum, qui naturæ quasi familiaris sit & inquilinus, eundem frequentius se offerre

Bernæ Helvet. d. XX. Mens. Mart. c1010cclxxvii.

---

## LIBER DECIMUS.

### CEREBRUM ET NERVI.

---

#### SECTIO I.

##### CEREBRUM PROPRIE DICTUM.

**P**ag. 1. l. ult. *adde* Sic clar. viri UNZERUS, BODDAERT *a\*\**), alii etiam polypis sua cerebra esse scripserunt, nullum experimentum suum allegarunt. Verum non licet rebus in physicis pro rebus evictis recipere, quæ nullus sensus demonstrat. Cum in polypis nodulos, in aliis minutis animalculis fibras distinguamus, nihil videtur esse, cur cerebrum visum fugeret. Et in universum videor mihi annotasse, cum oculis cerebrum conjungi, & reperi, quando oculi adsunt, abesse, ubi desiderantur.

p. 2. l. 8. *adde* Sed etiam lepus marinus aliquid habet medullæ spinalis simile nodulis interceptum *p\*)*, & in polypo majori marino systema nervosum egregium Cl. KOELREUTERUS invenit *p\*\**).

p. 3. l. 2. *post* lobi sunt *adde* in limace *i\*)*.

*Præf.* pag. II. l. 27. *ad verbum* odiis *adde* not. 2\*) Per Ill. Bar. de ASCH epist. anno jan. 1751 ad me datam, quam nuper excudi feci.

pag. I. l. 13. *ad verba* polypis illis *adde* not. a\*) BONNET *Contemplation* Préf. p. 25.

a\*\*) *Verhandeling. der Maatschapp. te Haarlem* T. XIV.

h) *lege* SCHÆFFER *vom krebhartigen Kiefenfuß*, p. 39.

p\*) BOHADSCH *de anim. marinis*, p. 8. 9. 10.

p\*\*) In sermone mecum collato Habet PLINIUS L. XI. c. 39.

pag. 2. not. y) *adde* Hic aliquid simile cerebelli in bombyce, ubi additur non satis certe adesse, *Comment. Bonon.* V. I. p. 193. SWAMMERDAM *Bibl.* p. 316. Aequale  $\frac{1}{150}$  capilli LYONNET p. 96.

i\*) SPALLANZANI *riproduzion* p. 60.

pag. 3. l. 8. ut tamen ea sui similia sint--- & percæ alteri, lege In plusculis piscibus varietates profecutus est Cl. VICQ d'AZYR q) & Petrus CAMPER r). In meis experimentis cerebrum piscibus, quam avibus, multo minus altum, planiusque, longum, modice convexum, superne & inferne in duas columnas suis sulcis divisum. Tubercula in universum superiora quinque, olfactoria duo, cerebellum anatum. Inferiora pariter fere quinque, tubercula olfactoria & alia reniformia, & glandula pituitaria media. Plurima ceterum varietas, & in multis piscibus duo tubercula abscondita, quæ ab aliis absunt a).

CAMPERUS pleraque similia habet, tantum neque tubercula recondita, neque cornua ammonis, neque glandulam pinealem. Samuel COLLINS plurimam ex multis piscibus varietatem habet, quæ conferri potest, & quam hic enumerasse nimium foret b).

p. 5. l. 14. adde salamandræ p\*).

ibid. l. 15. adde testudini q\*) & viperæ q\*\*).

ibid. l. penult. lege uti 1 ad 1200 r).

p. 6. l. 6. adde pantheræ z\*).

ibid. l. 7. adde hyænæ d\*), lupo nigro e\*), cibetto h\*), coati h\*\*), aguti h\*\*\*).

q) *Mém. des Savans étrangers* T. VI.

r) Ibid. T. VII. p. 181.

a) *Opusc. anat. min.* T. III.

b) *System.* T. I. p. 60---69.

p\*) WURFBAIN p. 69. Mera fere appendix medullæ spinalis, VESLING *epist. posth.* V.

q\*) *Parisini.* q\*\*) VESLING ibid. IV.

pag. 6. not. 2) adde Pondus animalis 243. l. quarum singula unc. 16 five gr. 9216 æquivalet; cerebri unciarum quinque & drachmarum trium; cerebelli drachmarum septem cum dimidia. Encephalon ergo ad totum animal ut 1 ad 615. BUFFON IX. p. 36.

2\*) Animal = 101. l. cerebrum unciarum 5, drachmarum trium, cerebellum 3ix, quæ ratio est 1 ad 249. ibid. p. 182.

b) dele uncias 16.

d) lin. ult. lege quæ ad  $\frac{1}{154}$ ,  $\frac{1}{88}$  &  $\frac{1}{50}$  redeunt.

d\*) Pondus ei 60 l. cerebrum 3xxj, cerebellum 3iv, gr. xv. ratio ad animal 1 ad 302. BUFFON p. 286.

e\*) Pondus corporis 1643, cerebri 3xx, gr. xv, cerebelli 3iv, gr. xv. ratio ut 1 ad 224. BUFFON IX. p. 368.

h) adde Corpus pondere librarum 23, 3vj, cerebrum drachmarum 17, granorum 48, cerebellum drachmarum quatuor, quæ ratio fere est 1 ad 49, ibid. p. 249.

h\*) Pondus ei unc. 210, cerebri 3vijß. cerebelli 3ij, gr. xvij, ratio ad corpus fere 1 ad 170. BUFFON IX. p. 322.

h\*\*) Pondus unciarum 243, cerebri drachmarum undecim, cerebelli drachm. 2 $\frac{1}{2}$ ; ratio fere 1 ad 146. BUFFON VIII. p. 348.

h\*\*\*) Pondus unciarum 61 cum dimidia, cerebellum granorum 64, cerebrum drachmarum trium, ratio fere 1 ad 131. BUFFON VIII. p. 386.



pag. 7. l. 8. *post* quintuplum *adde* iterum in aliis cerebrum modo nato homini uncias quatuordecim, cum universus ponderet libras octo. In adulto corpus centum & sexaginta librarum, cerebrum librarum quatuor, atque adeo cerebrum ad corpus ut 1 ad 40; quadruplo & ultra adeo minus pro ratione corporis in adulto, quam in fetu.

ibid. l. 16. *adde* Sic dromedario  $s^*)$ , bovi *bufle*  $s^{**})$ .

ibid. l. 21. *lege* & fere  $\frac{1}{868}$  aut  $\frac{1}{1174}$  corporis proprii

ibid. l. ult. *adde* Triplo minus humano Cl. BOURGELAT  $c^*)$ .

p. 8. l. 3. *lege* ut æquaret libras  $\frac{1}{80} d)$  sui corporis

ibid. l. 5. *lege* quæ ratio est  $\frac{1}{221} f)$ .

ibid. l. 9. *lege* ad  $\frac{1}{342}$ .

ibid. l. 12. *lege*  $\frac{1}{218}$ .

ibid. l. 17. *lege* mus vulgaris omnium maximum, quod sit sui corpusculi  $\frac{1}{43} s)$ ; mus agrarius  $\frac{1}{45} t)$ , & *adde* Marmota  $\frac{1}{279} t^*)$ , vespertilio  $\frac{1}{107} t^{**})$ , surmulot  $\frac{1}{124} t^{***})$ , talpa  $\frac{1}{30} t^{****})$ , glis  $\frac{1}{53} t†)$ , porcus indicus  $\frac{1}{189} t††)$ , cricetus  $\frac{1}{115} t†††)$ , urfus & ipse omnivorus, cujus præterea fabrica ab humana non longissime differt  $\frac{1}{323} t††††)$ .

i) *adde* Animal pondere 17. l. cerebrum  $3iv\beta$ , cerebellum  $3i\beta$ , quæ ratio est 1 ad 362. BUFFON VIII. p. 317.

pag. 7. not. n) *lege* Nempe in bove  $\frac{1}{868}$ .

o) *adde* Non adeo exiguum Ill. CAMPER.

$s^*)$  Librarum in animali pondus 369, cerebri  $3xij$ ,  $3vj$ , cerebelli  $3iib$ , quæ ratio est 1 ad 216. BUFFON XI. p. 260.

$s^{**})$  Cui pondus l. 1150, cerebrum l. i. cerebellum  $3iij$ ,  $3ij$ , quæ ratio est 1 ad 903, ibid.

p. 342.

c) *adde* Sextam tantum partem longitudinis capitis habet GARFAULT, p. 26.

$c^*)$  *Elem. d'hippiatr.* p. 112.

pag. 8. not. n) ad uncias 136.

$t^*)$  Marmota, quæ libras pendeat sex, cerebri habuit drachmas duas, grana viginti; cerebelli grana 34, BUFFON VIII. p. 234.

$t^{**})$  Cuius pondus erat granorum 616, cerebrum gr.  $3\frac{1}{2}$ , cerebellum gr.  $2\frac{1}{4}$  habuit, ibid.

p. 138.

$t^{***})$  Cui pondus semidrachmarum 219, cerebrum 36 gr. cerebellum gr. 12. p. 212.

$t^{****})$  Cui pondus unciarum octo, drachmarum trium, cerebrum gran. 18. cerebellum gr.

4. p. 94.

$t†)$  Cui pondus drachmarum 23, cerebrum gr. 21, cerebellum granorum septem cum semisse, p. 172.

$t††)$  Cui pondus unciarum 23. cerebrum gr. 52, cerebellum gr. octodecim, p. 12.

$t†††)$  Cui pondus drachmarum 62 cum semisse, cerebrum drachmæ dimidiæ, cerebellum granor. novem. T. XIII. p. 131. Sed alias major fuit, SULZER *Naturgeschichte des Hamsters*

p. 94.

$t††††)$  Pondus corporis librarum 141, cerebri drachmarum 57. gran. 15. cerebelli drachm 12. gran. 36.

pag. 9. l. 6.  $\frac{1}{102}$  lege  $\frac{1}{78}$

p. 10. l. 2.  $\frac{1}{23}$  lege  $\frac{1}{15}$

ibid. l. 8. *Verbis*, Denique classis humanæ cet. §. IV\*. *incipit, eaque*, In simiis "*inscripta est*, & *verbis*, Homini cerebrum aliquando cet. \*Quinta orditur.

ibid. l. 11. *adde* Nunc nuper BUFFONIUS multarum simiarum cerebra adpendit, quorum pondus totius corporis ponderis est in simia *Ovifiti* pene  $\frac{1}{28} q^*$ ; in *Coaita* fere  $\frac{1}{40} q^{**}$ ; in *Saiou* ratio fere incredibilis  $\frac{1}{17} q^{***}$ ; in *Sai* iterum ratio fere  $\frac{1}{16} q^{****}$ ; in *Saimiri*  $\frac{1}{21} q^\dagger$ ; in *Mone*  $\frac{1}{41} q^\dagger$ ; in *Talapoin*  $\frac{1}{35} q^\dagger\dagger$ ; in *Patas*  $\frac{1}{41} r^*$ ; in *Malbrouk* fere  $\frac{1}{24} r^{**}$ ; in *Papione*  $\frac{1}{95} r^{***}$ ; in *Gibbon*  $\frac{1}{50} r^{****}$ ; in *Macaque*  $\frac{1}{94} r^\dagger$ ; in *Magot*  $\frac{1}{67} r^\dagger$ ; in *Mangabey*  $\frac{1}{74} r^\dagger\dagger$ .

ibid. l. 13. *lege* alias fuit trium librarum  $t$ ), & trium librarum, semidrachmarum novem  $t^*$ ), & trium librarum atque octo unciarum cum cet.

p. 11. l. 5. *post* equo *adde* non proportionem, sed pondere ipso. Simiæ quæ-

pag. 9. not. x) *adde* BUFFON XIII. p. 335. Cum animal penderet  $\text{℥} \text{xxvj}$ , cerebrum erat  $\text{℥} \text{vj}$ , cerebellum  $\text{℥} \text{ij}$ ,  $\text{℥} \text{ij}$ , ut adeo encephali ad corpus ratio foret  $= 1$  ad 55. Non ideo majus, quam homini.

pag. 10. not. n) *lege* Grana undecim in granis 346.

o) *lege* Grana 21 in granis 380. Pondus cet.

$q^*$ ) Cerebri pondus drachmæ unius, granorum decem, cerebelli granorum 13, animalis univ.  $\text{℥} \text{iv}$ , drachmarum quinque cum semisse, BUFFON T. XV. p. 104.

$q^{**}$ ) Pondus animalis unc. 144. cerebrum unc. trium, gran. 54. cerebellum drachm. 3 cum semisse, ibid. p. 30.

$q^{***}$ ) Animalis pondus unciarum 26, drachmarum quinque, cerebri unc. 2 cum drachma dimidia, cerebelli drachm. 2. gran. 10. ib. p. 44.

$q^{****}$ ) Animalis pondus drachmarum 406, cerebri drachm. 22 cum semisse, cerebelli dr. 2 cum semisse, ib. 57.

$q^\dagger$ ) Animalis pondus 22 unciar. cerebrum drachmar. septem cum granis 64, cerebellum gr. 33. ibid. p. 74.

$q^\dagger\dagger$ ) Animalis pondus libr. 5, unc. 9 cum semisse, cerebri drachm. 15, gran. 28, cerebelli drachmæ 1, gr. 62. T. XIV. p. 265.

$q^\dagger\dagger\dagger$ ) Pondus corporis unc. 44. cum semisse, cerebri unc. unius, gr. 56. cerebelli drachm. 1. gr. 11. ibid. p. 294.

$r^*$ ) Corpus unc. 136. cerebrum drachm. 23. cum semisse, cerebellum drachmarum trium, ibid. p. 217.

$r^{**}$ ) Animal pondere unc. 72. cerebrum drachm. 17, gran. 36, cerebellum drachm. sex, gr. 6. ibid. p. 233.

$r^{***}$ ) Animalis pondus libr. 26, cerebri drachm. 30. gr. 32. cerebelli drachmar. 4, gr. 32. ib. p. 144.

$r^{****}$ ) Animal libr. 9. cerebrum drachmarum 18, gr. 48, cerebellum drachm. 4. gran. 12. ibid. p. 99.

$r^\dagger$ ) Animal unc. 194, cerebri drachm. 14. gr. 36, cerebelli drachm. 2, gr. 12. ibid. p. 199.

$r^\dagger\dagger$ ) Animal libr. 23, cerebrum unc. 3, cerebellum dr. 3 cum semisse, ibid. p. 119.

$r^\dagger\dagger\dagger$ ) Animal libr. 10, cerebrum drachm. quatuordecim, cerebellum drachm. 3. cum una tertia, ib. p. 250.

$t^*$ ) *Mém. de Berlin*, T. XX. p. 75.



dam minores, ut mures & animalia minora, videntur cerebrum habere potius ad corpus uniuersum majus. Verum & hæ simiolæ, & aviculæ, in quibus aut æqua cet.

pag. 11. l. 8. *dele* Deinde oculos habent grandissimos.

p. 11. l. 13. *adde* Ipsi demum simiæ non eadem est rotunditas capitis

§. V\*. *Cerebri pondus specificum.*

In uniuersum aqua ponderosius, in ea fundum petit *g*<sup>\*)</sup>), ejusque pondus specificum a MUSSCHENBROEKIO *g*<sup>\*\*)</sup>) æstimatum est ad aquam 1, 0310 ad 1, 0000. Non expectares, cum Cerebri, ut dicetur, magna pars adeps sit. Singularis vero est H. MECKELII annotatio, cerebrum nempe cum ætate leuius fieri, ut idem cubus junioris cerebri gr. 64  $\frac{1}{2}$ , cerebelli gr. 63  $\frac{1}{2}$ , aduktioris vero cerebri grana non supra 4 reciperet *g*<sup>\*\*\*)</sup>); in alio exemplo idem cubus grana sexaginta cum semisse alias 63 recepit. Idem in maniaco cerebrum leuius reperit totis septem drachmis *g*<sup>\*\*\*)</sup>).

In epilepsia *g*<sup>\*\*\*\*)</sup>), mania *g*<sup>†)</sup>), stultitia *g*<sup>††)</sup>), hypochondriaco malo *g*<sup>†††)</sup>), frequentius durius est, non quidem semper *g*<sup>††††)</sup>).

p. 13. l. 15. *lege* crista

p. 14. l. 10. *post* evanescunt *adde* demum etiam in sanis cadaveribus *s*<sup>\*)</sup>).

ibid. l. 11. *adde* gliri *u*<sup>\*)</sup>), marmotæ *u*<sup>\*\*)</sup>), talpæ *u*<sup>\*\*\*)</sup>), sciuro *u*<sup>†)</sup>), vespertilioni *u*<sup>††)</sup>).

ibid. l. 13. *post* apparent *adde* In catopardo tantum secundum longitudinem plicatur *d*<sup>\*)</sup>).

p. 15. l. 19. *post* referri potest *adde* eoque peculiari *p*<sup>\*)</sup>)

pag.

*g*<sup>\*)</sup>) BOIVEL *bleff. de la tête*, p. 199.

*g*<sup>\*\*)</sup>) *Introduç.* p. 556.

*g*<sup>\*\*\*)</sup>) *Mémoires de l'acad. de Berlin*, T. XX. p. 67.

*g*<sup>\*\*\*\*)</sup>) *Ibid.* p. 75.

*g*<sup>\*\*\*\*\*)</sup>) MORGAGNI *de sed. & caus. morb.* I. p. 71.

*g*<sup>†)</sup>) PRINGLE in viro III. in epistola ad me data. MORGAGNI p. 55. 158. 159.

*g*<sup>††)</sup>) MORGAGNI II. p. 55. 401.

*g*<sup>†††)</sup>) SCHMIEDEL *pericard.* I. p. 22. 23.

*g*<sup>††††)</sup>) MORGAGNI I. p. 60.

pag. 12. not. t.) *adde* vulpi BUFFON VIII. p. 235.

*s*<sup>\*)</sup>) GREDING, apud LUDWIG, III. p. 4.

*u*<sup>\*)</sup>) BUFFON VII. p. 290.

*u*<sup>\*\*)</sup>) *Idem* VIII. p. 234.

*u*<sup>\*\*\*)</sup>) *Ibid.* p. 94.

*u*<sup>†)</sup>) *Ibid.* p. 63.

*u*<sup>††)</sup>) *Ibid.* p. 140.

*d*<sup>\*)</sup>) *Parifini.*

*p*<sup>\*)</sup>) ALBIN. *natur. homin.* p. 133.

pag. 15. l. 20. adde A dura cerebri membrana in basi cranii oriri Cl. vir *Andreas BONN* p\*\*).

p. 16. l. 21. lege fila

p. 18. l. 10. dele matrem ex Arabicæ linguæ analogia

ibid. l. 11. post dixerunt adde circa tempora *Gabrielis a ZERBIS* t\*), neque enim Arabibus ita dictam fuisse monet *SCHNEIDERUS* t\*\*)

p. 20. l. 3. adde In medulla spinali hydrocephali ope in duas laminas divisam fuisse lego p\*).

ibid. l. 13. post strangulatis adde apoplecticis \*), hydrophobis \*\*), febre ardente \*\*\*), variolis \*\*\*\*), delirio \*\*\*\*\*), & convulsione †), stupore ††), maniacis †††), peste laborantibus ††††), cephalæa †††††).

p. 21. l. 15. post videtur adde ipso consentiente Cl. viro *A. C. LORRY*, qui antea contrariam opinionem defendit m\*).

p. 21. l. 17. adde Alias a gelatina effusa & concrefcente alba fit & crassior m††). Crassior in febre epidemica *FASANO*.

p\*\*) *Membranar. continuat.* p. 24.

pag. 16. not. b) adde Negat Cl. *JANKE* cellulosa dici posse de *foramin. calv.* p. 38.

pag. 17. not. f) lin. 1. adde Aqua fluida *MORGAGNI* de *sed. & caus. morb.* p. 48. *BIRCH*

IV. p. 501. In melancholico aquæ libra sub dura matre *Journal de Médéc.* 1763. Août —

lin. 5. adde Lympha inter arachnoideam tunicam & piam *MORGAGNI*, in hemiplegia I. p. 84.

Lympha mucosa in epilepsia *BAADER obs.* 48. *GISEKE Abhandl.* p. 287. Viscor gummi similis in febre epidemica *FASANO*.

t\*) *SCHNEIDER catarrh.* p. 16.

t\*\*) ibid.

p\*) *GILG spin. bifida.*

pag. 20. lin. 13. ad verbum meninx in textu adde not. y†). Rubor quasi sanguinis exsurgens *MORGAGNI* de *sed. & caus. morb.* II. p. 301.

\*) Vasa piæ matris varicosa *HENKEL Sammlung.* VIII. sanguine plena, *Journ. de Méd.* 1764. Sept.

\*\*) *MORGAGNI sed. & caus.* I. p. 62. 63.

\*\*\*) *LIEUTAUD précis* I. p. 30.

\*\*\*\*) *LE FRANÇOIS Réflexions critiques* p. 196. cerebri vasa sanguine plena.

\*\*\*\*\*) *BAADER obs.* 26. Membranæ valde rubræ. Vasa sanguine plena. *SAUVAGES Nosolog.* IV. p. 372. *Journal de Médecine*, 1763. Oct.

†) *NANNONI medic. simpl.* p. 247.

††) *Id. obs.* 25. meninges inflammatae.

†††) *CALDANI rifless.* p. 63.

††††) *SCHUCHZER.*

†††††) Varicosa *DE HAEN rat. medend.* IV. p. 173.

m\*) *Mémoires des Savans étrangers*, III. p. 165.

pag. 21. not. m†) adde *SUE* in *MONRO*, *HEBENSTREIT off. concret.* *GRETING Adv.*

III. p. 4. *GRETING* frequenter in maniacis, apud *LUDWIG Adv.* II. p. 3.

m††) *GRETING* ibid. In comate duræ membranæ similis, *Edimbourg. Essays*, III. p. 143.



pag. 22. l. 13. *post* tenuis est *adde* Annotatum est, in juniore animali & nuper nato medullam corticis simillimam esse, ut vix distinguas *s\*\**).

ibid. l. pen. *lege* In piscibus *marinis*, etiam majoribus, a gelatina parum differre putes *a*), si recte scriptores vocibus usi sunt & *adde* nihil enim simile in piscibus reperi, quos incidi, ut forte de circumfuso cerebrum inter & duram membranam oleo sermo sit. Ita certe in cerebro canis *Seekatze* medulla aqua tantum tegitur *a\*\**).

p. 23. l. 1. *lege* crescere dictum est & *adde* verum contraria sunt accurata experimenta MECKELII.

ibid. l. 6. *adde* phreneticis *c\**), epilepticis *c\*\**), deliris *c\*\*\**), febribus malignis *ct*), apoplecticis *ctt*), post cariem femoris *cttt*),

ibid. l. 7. *dele* manifestiora etiam in nonnullis --- corticem cerebri percurrunt.

p. 24. l. 5. *adde* Plurium ordinum *H. BOERHAAVE p\**)

p. 27. l. 4. *post* repertum *adde* & cerebrum glandulis plenum in epilepticis vidit *Ant. DEIDIER b\**).

ibid. l. 7. *adde* Nuper denique *Cl. Vincentius MALACARNE* in cerebello, exemptis portionibus piæ matris intimis, vidit innumerabilia granula globosa versus superficiem laminarum disposita, ut medullæ se immergerent *d\**). Deum microscopiis suis acerrimis *S. M. della TORRE* non corticem quidem, sed medullam cerebri globulis fieri docuit *d\*\**).

p. 27. l. 11. *lege* minores

p. 29. l. 9. *adde* & *BOERHAAVIANA*.

p. 30. l. 4. *post* homo est *adde* & subinde cortici similior

ibid. l. 8. *adde* in hydrophobis *n\**), epilepticis *n\*\**), infans *n\*\*\**).

*s\*\**) MASSIMI *Esper.* 33. in cane.

*a\*)* Drontheim. *Gesellschaft*, II. p. 235.

*c\*)* BOERHAAVE *morb. nerv.* p. 133. ut rubicundior, quam in iis sit cerebris, quorum vasa minio repleta fuerunt,

*\*\*)* STOERK *annus med.* I. p. 101. *Richard de HAUTESIERK* I. p. 107.

*c\*\*\*)* NANNONI *obs.* 36. BAADER *obs.* 26.

*ct*) RICHARD I. p. 82.

*ctt*) Idem cum vasis varicosis.

*cttt*) Idem. I. p. 84.

p. 23. lin 14. *ad verbum* componere in *textu adde* not. *f\*)*. Etiam *ALBIN. natur. homin.*

*p\*)* *Morb. nerv.* p. 99.

*b\*)* *Patholog.* p. 313

*d\*)* p. 124. *d\*)* *Nuove osservazioni.*

p. 30. not. *k*) *adde* *Subnigra epist.* ad me III. p. 408. Non consentit quidem *Cl. STOLTE submers.* neque ego experimenta propria habeo.

*n\*)* NEAD *venen.* p. 144.

*n\*\**) RAST in epistola 1765.

*n\*\*\**) MORGAGNI I. p. 55.

pag. 30. l. 9. *adde* in febribus intermittentibus o\*) & epidemicis o\*\*), tum in aqua o\*\*\*).

p. 31. l. 6. *post* calloso *adde* commissuris s\*),

ibid. l. 20. *adde* Nullas autem medullæ cerebri fibras esse, quæ merum gelatum sit, id utique contra sensuum testimonium scriptum est c\*).

p. 32. *Verbis* „Liceat hic, etsi parum utilem cet. nova, eaque XIII\* *orditur paragraphus*, quæ „Analytis chemica“ *inscripta est*.

ibid. l. 3. *post* alibi *adde* conspicuus & *post* tela: Qui scripserunt ANDERSONII fide balænæ cerebrum merum esse oleum k\*), ii abusi sunt oleo duram inter membranam & cerebrum effuso. Negatum est etiam oleum reddere, ut verus adeps, cet.

ibid. l. 13. *adde* Verum in alia non dubie accuratiori analysi Ill. SPIELMANNI t\*) libra cerebri humani dedit spiritus alcalini drachmas duas, olei empyreumatici rubri integram unciam cum  $\frac{2}{3}$ , salis volatilis gr. 40.

A spiritu salis in massam lacteam resolvitur t\*\*), & a spiritu urinæ; cum spiritu vini & nitri mistum indurefcit t†), quod RUYSCHII arcanum fuerit.

Conquassatum dicitur gratum odorem edidisse t††).

p. 33. l. 13. *post* brevius est *adde* Sed in variis cadaveribus non eadem ratione z†) retrorsum latefcit. Firmius esse utique cerebro z††).

ibid. l. 16. *post* tangitur *adde* non tamen cohæret c\*).

ibid. l. 21. *adde* Inæqualiter cerebrum divisisse vidit Cl. INSFELD f\*)

o\*) COLONY p. 46.

o\*\*) FLASCUS ad LANCIS *Epid.* III.

o\*\*\*) *Physiol. batav.* p. 369.

s\*) SABBATIER *mém. prés.* VII. p. 600.

p. 31. not. u) *adde* In balæna. *Oper. min.* p. 200. 201. 203. alia tubercula p. 207. 211.

c\*) KIRKLAND *two dissert. the one on the brain and nerves* cet.

k\*) LE CAT *sensibil.* p. 228.

t\*) *Chem. Institut* p. 179.

t\*\*) COWARD *de ferment. volat.* p. 59.

t†) *Essays of a Society at Edimburg*, III. p. 129.

t††) MARTINI *Erschütter. des Gehirns*, p. 36.

pag. 32. not. u) *adde* Pyrophorum inde HEISTERUS produxit *Wahrnehmung*.

pag. 33. not. z) *adde* DUVERNEY T. I. p. 216.

z†) GREDING l. c. III. P. 4.

z††) BOURGELAT *Elem.* p. 473.

a) *adde* *Oper. min.* p. 214.

pag. 33. l. 14. *ad verbum* piscibus in *textu* *adde* not. l\*)). Habet Ill. CAMPERUS in aliis non dubie piscibus mihi nihil simile unquam visum.

c\*) GIRARDI ad SANTORIN. p. 45.

e) *adde* DUVERNEY.

f\*) *Lus. natur.* p. 41.



pag. 34. l. 20. *adde* Ad hujus hippocampi pedis varietates legi omnino debet, plurima qui vidit, J. E. GREDING *n*\*).

p. 35. l. 1. *post* undulatus *adde* antèrìus socio propior, posterius divergit *q*\*), ibid. l. 2. *adde* Ejus nervi locum sulcum tenuisse MORGAGNUS vidit *s*\*\*).

ibid. l. 10. *post* raro *adde* DUVERNEYO & *ibid.*

ibid. l. 15. *adde* quod tamen accuratìores anatomici se vidisse negant *c*\*).

p. 36. l. 1. *post* jugo *adde* tamen ut velum a pia matre productum intercedat *b*\*), ibid. l. 4. ejus vero locum ---- vas rubrum decurrit *lege* Vidi tamen in anserè ortum a commissura anteriori, & ab imo hemisphærio cerebri, & retrorsum in ventriculū anteriorem descendere, eum tegere, & in fibras demum dissolvi *i*\*).

ibid. l. 9. *adde* Brevior est, quam septum lucidum.

p. 37. l. ult. *adde* Obliquas esse posterius, & videri ex dissoluto corpore fimbriato nasci Cl. SABBATIER *g*\*), anteriores duas tenues & valde eminentes. Nullum esse psalterium Ill. MEKELIUS, cujus voces non satis intelligo *g*\*\*).

p. 38. l. ult. *adde* nullam fuisse caveam *x*\*) aliter interpretor, ut laminæ cohaerint, siccata aquula.

p. 39. l. 2. *post* pellucet *adde* Faciliorem sermonem meum fore persuadeor, si Cl. MECKELII & SABBATIER descriptiones integras excerptas dederò.

Ergo olim MECKELIUS posterius versus oram fornicis laminam septi lucidi dextram a sinistra distare ad tertiam unciae partem, & crura fornicis posteriora subire. In media longitudine thalamorum opticorum easdem laminas se contingere. Inter laminas, qua distant, plexus choroideus medius libere ponitur, & pia meninx a corpore calloso faciei internæ laminarum septi lucidi adhæret, easque porro convellit. Porro septi lucidi laminæ per striam medullarem uniuntur ad crura usque anteriora fornicis, quibus implantantur. Sed ab ora anteriori communi corporis callosi ad finem ejus corporis anteriorem eadem laminæ

*n*\*) *Advers.* LUDWIGH III. P. 4.

*q*\*) DUVERNEY t. 2. SABBATIER l. c. p. 594.

*s*\*) Venarum esse vestigia, qui nervi dicuntur: BERGEN *tab. nov. ventric.* ad i. i.

*s*\*\*) *De sed. & caus. morb.* I. p. 55. II. p. 406.

*c*\*) SABBATIER l. p. 594.

*h*\*) p. 29. 30.

*i*\*) *Oper. min.* p. 192. 196.

*g*\*) l. c. p. 596.

*g*\*\*) *Mém. de Berlin*, 1765. p. 97.

pag. 38. not. *s*) *adde* Habet HUBERUS in *progr.* 1760. & N. A. N. C. III. *obs.* 101.

*u*) *adde* MECKEL l. c. p. 96. GIRARDI l. c. p. 49.

*x*) *adde* DUVERNEY t. 1. Varietates vidit HUBERUS.

*x*\*) Ita vidit GIRARDI p. 49.

porro discedunt ad octavam fere pollicis partem, & pia matre obducuntur. Iterum inferius denuo uniuntur per substantiam medullarem inter corpora striata, & quando se contigerunt, utique uniuntur, ut unica nunc sit lamina. Anterior extremitas septi lucidi clausa est, qua laminæ ejus parti anteriori corporis callosi adhærent. In extremitate posteriori discedunt eadem, & dici potest, laminas septi lucidi constituere crura fornicis posteriora. Septum lucidum dimidio pollice longius est, quam fornix<sup>y\*)</sup>).

SABBATIER. Septi lucidi cavitas triangularis est, fatis similis falciformi finui, membrana subtili vestita, antèrius latior, posterius in caudam terminata. Non aperitur in cerebri ventrem tertium, sed extra cerebrum, tamen ut lamina medullari tenera & pia matre claudatur. Nunquam defuit hæc cavea<sup>y\*\*)</sup>).

pag. 40. l. 6. *adde* Veram caveam esse, putabat Ill. MORGAGNUS, defendi posse exemplo medullæ spinalis, in qua medullam inter & caveam vertebralem vera sit intercapedo<sup>k\*)</sup>. Grave certe argumentum est, & omnino in cadavere ea intercapedo inanis videtur, ut certe ab adipe non recte repleatur. Verum etiam si in medulla spinali agnoscere teneamur veram caveam, non inde argumentum in ventriculos cerebri transferri posset, in quibus contactus lacunaris superioris in inferioris colliculos manifestus est.

p. 41. l. 13. *post* curvus *adde* Ad unguis modum, eundemque lamina medullari tegi vidit GREDING<sup>z\*)</sup>).

ibid. l. penult. *adde* In his cavæ posterioris colliculis, eorumque varietate audiendus est Cl. J. E. GREDING<sup>b\*)</sup>). Parvum describit, triangularem, circa flexionem cornu hippocampi medullæ innatum. Demum tertium peculiarem colliculum<sup>b\*\*)</sup>).

p. 42. l. 4. *post* apertus est *adde* In parte tota posteriori GÜNZIUS fulcos transversos vidit<sup>b\*)</sup>).

ibid. l. 9. *post* continent *adde* Sic in piscibus, iisque, quos incidi, omnibus<sup>i\*)</sup>).

y\*) *Mém. de Berlin*, 1765.

y\*\*) l. c. p. 595. SANTORIN. *obs. posthum.* p. 49.

pag. 39. not. g) *adde* *Oper. min.* III. p. 216.

pag. 40. not. k) *adde* Recte etiam SABBATIER I. p. 164.

k\*) *De sed. & caus. morb.* I. p. 33.

l) *Oper. min.* III. p. 192.

z\*) Apud LUDWIG *Advers.* III. P. 4.

b\*) Apud LUDWIG *Advers.* l. c.

b\*\*) Ibid.

h\*) Ibid. p. X.

i\*) *Oper. min.* III. p. 216. BARTHOLIN. *Cent. II. obs.* 1. in orbe pisce.

pag. 42. not. p) *adde* Tum MARTINI *Streitschrift*, p. 40. 41. MECKEL *Mém.* 1768. p. 43.



pag. 42. l. pen. Hæc tamen quæstio ---- disquisitione indiget *lege* Anterius separantur per septum lucidum & fornicis principium, posterius per fornicem incumbentem medullæ oblongatæ q\*).

Alii tamen communicare asserunt, certe quia cum tertio ventriculo communicant q\*\*). Verum neque ea communicatio perpetua est, & si status transitum non inveniret, putares utique nullam adesse.

p. 43. l. 9. *adde* (qualis etiam undique de cerebro exhalat, dum diffecatur u\*).

p. 44. l. 7. *post* epidemicis *adde* variolosus h\*), affectibus catarrhalibus h\*\*),

ibid. l. 11. *adde* Libræ quatuor, uncia undecim in sacco a cerebro factæ q\*).

Caput ob aquam in ventriculis collectam adulti capiti æquale q\*\*).

p. 45. l. 8. *post* membranæ *adde* In speciem albuminis quidem non coactam fuisse, sedimentum tamen puriforme posuisse, ut lymphæ solet a\*\*),

ibid. l. 11. *adde* Video Ill. virum, & quem merito plurimi facio, coagulabilem esse negare, eandemque vitio aliquo in pectore nonnunquam coagulabilem reddi. Verum idem vir clar. contra numerosa utique experimenta etiam pericardii, & pectoris, & abdominis aquulam negat coagulari a††).

p. 46. l. 13. *adde* etsi demum jungantur.

p. 47. l. 5. *post* sede *adde* sub fornice ultra thalamos opticos

ibid. l. 9. *adde* Tertium ventriculum claudunt, ut nulla ejus rima pateat d\*)

p. 48. l. 2. *post* extat *adde* Sic in asthma \*) , hemiplegia \*\*) , & apoplexia \*\*\*).

q) *adde* PORTAL. *Mém.* 1770. p. 241.

q\*) ALBIN. *nat. hom.* p. 130.

q\*\*) LIEUTAUD *Essays* p. 338.

u\*) *Physiol. batav.* p. 369.

pag. 44. not. c) *adde* HENKEL *Samml.* VIII. Post hemiplegiam uncia duæ in ventriculo dextro, MORGAGNI l. p. 38.

d) *adde* DemisepTier in lethargico DUVERNEY *posthum.* II. p. 539.

f) *adde* Epilepticis BAADER *obs.* 48.

h\*) COTUNNUS *Sed. variolar.* p. 304.

h\*\*) LIEUTAUD *Synops.* I. p. 51.

q\*) BERTIN *osteolog.* II. p. 498.

q\*\*) *Act. Helvetic.* V. p. 286.

p. 45. not. x) *adde* ab acore cogitur VIEUSSSENS *Malad. intern.*

a\*\*) GREDING l. c.

a††) HEWSON *inquiries* II. p. 193. COTUNNUS *de ischiad. nervosa.*

pag. 47. not. z) *adde* MECKEL *Mémoire.* de 1765. p. 99.

d\*) MORGAGNI *de sed. & caus. morb.* II. p. 405.

e) *adde* Venam magnam & magnam arteriam DUVERNEY *posth.* T. III. f. 2. 3. 4.

\*) RIDLEY *obs.* p. 180.

\*\*) Corpus hydaticum phaseoli mole MORGAGNI *sed. caus.* I. p. 83. Vesiculæ plexus sinistri rigidæ, Idem ibid. p. 84.

\*\*\*) STOERK *de stramon.* p. 14.

- Varices post delirium \*\*\*\*). In comate vasa dura obstructa \*\*\*\*\*). Est ubi aliis in sedibus cerebri glandulæ visæ sunt, ut super corpora striata posteriora †). Duo corpora glandulosa singularia mucronibus coronata sub lucido septo in equo ††).
- pag. 48. l. 6. *adde* Addit Cl. DUVERNEY lobosum aliquid, spongiosum & cellulofum. Sic in comate rigido dura, compactæ albæ pilæ o\*), demum ossæ particula o\*\*).
- p. 49. l. ult. *adde* Nullas fuisse MORGAGNUS gravis testis est g\*).
- p. 50. l. 13. *adde* Sed neque in piscibus corpora striata reperio.
- ibid. l. antepen. *adde* *Second cordon* SABBATIER q\*).
- p. 51. l. 5. *post inferius adde* Demum a tuberculis mammillaribus, & quidem totum derivat, & funiculum SABBATIER t\*); quæ descriptio a meis adversariis hætenus recedit.
- ibid. l. 9. *adde* Longius & in interiorum eminentiarum sedem hippocampi deducit Cl. SABBATIER y\*), difficili, ut fatetur, inquisitione usus, ut nuper demum rem totam viderit, & omnino prius centrum geminum pro pedunculo glandulæ pinealis habuisse videtur y\*\*). Idem fibrosum esse, minui & exiguum fieri, qua ventriculus lateralis descendit.
- ibid. l. ult. *adde* Conjungi negat, & interponi laminam cineream Cl. SABBATIER f\*)
- p. 52. l. 14. *lege* deprimit.

\*\*\*\*) MORGAGNI l. c. p. 49.

\*\*\*\*\*) *Ess. of a Societ. at Edimb.* III. n. 23.

†) *Dict. d'Anatom.* II.

††) BOURGELAT *Elemens d'hippiatrique*, p. 474.

o\*) PANAROL. II. n. 9.

o\*\*) SUE *ost.* p. 21.

pag. 49. not. g) *adde* Habet etiam SANTORINUS *posth.* t. 3. f. 3. non satis ovatas strias.

g\*) *De sed. & caus. morb.* II. p. 281.

q\*) *Mém. des Savans étrangers*, VII. p. 601. seqq.

r\*) l. c. p. 602.

y\*) *Anat.* I. p. 503.

y\*\*) l. c.

pag. 51. not. f) *adde* Raro vidisse GREDINGIUM miror, ut tamen fateatur, ponte tenui medullari superne infiltratos fuisse, & perinde, qui negare videbatur, SABBATIER *Mém.* VII.

p. 578. SANTOR. T. 3. f. 2. p. 39.

f\*) *Anat.* I. p. 467. *Mém. des Sav. étrang.* T. VII. p. 498.

pag. 52. not. m) *adde* Non perpetuum esse Cl. GREDING *Adv.* II. P. II.

n) *adde* GREDING l. c.

q) *adde* GIRARDI t. 3. f. 2.

r) *adde* Habet fere eodem, quo ego, modo SABBATIER *Mém.* VII. p. 601. *Anat.* p. 497.



- pag. 53. l. 3. *adde* Cl. SABBATIER ad usque corpora mammillaria deduxit *t*<sup>\*</sup>); SANTORINUS ad thalamos *t*<sup>\*\*</sup>).
- ibid. l. 9. *adde* Insertum in glandulam pinealem funiculum, inque eam solam habet Cl. GREDING *y*<sup>\*</sup>). MECKELIUS perpetuam facit insertionem *y*<sup>\*\*</sup>)..
- ibid. l. 12. *adde* Tenera membrana tegi DUVERNEYUS conjectavit.
- p. 55. l. 4. *post* VIEUSSSENS *adde* Eo Cl. SABBATIER & centrum geminum retulit *u*<sup>\*</sup>), & funiculum, qui peculiarem commissuram posteriorem facit.
- ibid. l. 6. *post* habent *adde* ut anas ferus *y*<sup>\*</sup>).
- p. 56. l. 7. *adde* Non raro etiam in isto ventriculo humor apparet *b*<sup>\*</sup>). Et aves eum ventriculum habent *b*<sup>\*\*</sup>), & pisces *b*<sup>†</sup>).
- ibid. l. 9. *post* valens *adde* fibrosus *b*<sup>††</sup>)
- ibid. l. 15. *adde* Et defuisse visa est *l*<sup>†</sup>), & duplex *l*<sup>††</sup>). Aliam anteriorem vidit Cl. GREDING in fine anteriori tertii ventriculi *l*<sup>†††</sup>).
- p. 57. l. 11. *lege* Suspicio adeo hos veterum a ventriculis lateralibus in tertium aperto cet.
- ibid. l. 19. *lege* ostium *x*) ad basin cranii ducere videtur ante cet.
- p. 58. l. 12. *adde* Negat in aqua descendere ALBINUS *n*<sup>\*</sup>). Solidum facit Cl. SABBATIER *n*<sup>\*\*</sup>).

Ab

- t*<sup>\*</sup>) Anat. p. 503.
- t*<sup>\*\*</sup>) t. 3. f. 2. p. 115.
- pag. 53. not. u) *adde* Habet Cl. SABBATIER l. 6.
- y*<sup>\*</sup>) l. c.
- y*<sup>\*\*</sup>) *Mém de* 1765. p. 97.
- c) *adde* BARTHOLIN. Cent. II. hist. 1. COLLINS t. 53. f. 2. *Oper. min.* III. p. 216.
- pag. 54. not. m) *adde* Habet etiam MALACARNE.
- q) *adde* SANTORIN. *posthum.* III. p. 1.
- r) *adde* GREDING.
- u*<sup>\*</sup>) Anat. p. 503. *Mém. des savans étrang.* p. 601.
- y*<sup>\*</sup>) *Oper. min.* III. p. 190.
- p. 56. not. e) *adde* Sæpe communicare GREDING.
- h*<sup>\*</sup>) GREDING. GIRARDUS glacie plenum vidit ad t. 3. SANTORIN.
- h*<sup>\*\*</sup>) *Oper. min.* p. 192. &c.
- h*<sup>†</sup>) Ibid.
- h*<sup>\*</sup>) *adde* Habet GIRARDUS t. 3. f. 2.
- h*<sup>††</sup>) SABBATIER *Mém. des sav. étrang.* VII. p. 7. Anat. I. p. 49.
- l*<sup>†</sup>) GREDING l. c. Sed raro.
- l*<sup>††</sup>) Idem.
- l*<sup>†††</sup>) *Advers.* II. p. 3.
- pag. 56. lin. 16. *ad verbum* habent in *textu* *adde* not. *l*<sup>\*\*</sup>) *Oper. min.* III. p. 192.
- l*<sup>\*</sup>) *adde* Vulvam & anum ALBIN. *nat. hom.* p. 130.
- pag. 58. not. m) *adde* Idem GIRARDUS ad T. 3. f. 2. SANTORIN. Subire videbatur, sed vix ingressa fine obtuso desinebat.
- n*<sup>\*</sup>) *Nat. hom.* p. 130.
- n*<sup>\*\*</sup>) *Mém. des sav. étrang.* p. 598. 599.

Ab infundibulo in pituitariam glandulam canalem GIRARDUS dicit, non tamen perpetuum *n\*\*\*)*.

pag. 59. l. 3. *adde* Amplum calcarea materia plenum Ill. HAENIUS vidit *r\*)*, cellulosa plenum LUDWIGIUS *r\*\*\*)*.

Alias & in junioribus hominibus liberum vidit Cl. GREDING, alias neque medulla plenum, neque cellulosa tela, sed totum liberum; & telam illi, si qua visa est, vitio putat natam esse *r\*\*\*)*. Ita & Ill. LIEUTAUB inferne solidum dixit, & vocavit *tige pituitaire*.

Denique Cl. Professor Upsalienfis *Adolph. MURRAY* nuper summo studio in hanc infundibuli caveam inquisivit: reperit pia membrana fieri, & arachnoidea, & interposita cellulositate; descendendo fieri graciliorem, inde iterum latefcere. Cavum porro esse, & glacie manifesto repleri, celluloso textu carens. Dividi demum in duos ramos, quorum quilibet suum glandulæ pituitariæ lobum adeat *r†)*. Cum isto adeo viro, qui peculiari labore in hanc inquisitionem incubuerit, putaverim nos stare debere, ut infundibulum nomen suum mereatur, cavumque sit. Cavum etiam facit Cl. SABBATIER *r††)*.

*ibid.* l. 14. *post* quidem *adde* neque de lymphatico genere *x\*)*.

*ibid.* l. 15. *post* appendix *adde* Mollior reliquo cortice *y\*)*, tamen ut etiam dura & fere cartilaginea visa sit *y\*\*)*.

p. 60. l. 17. *adde* Olim a *Car. STEPHANO* dicta est *s\*)*.

p. 61. l. 11. *adde* Denique putat Cl. *MURRAY*, vidisse se ductus a glandula pituitaria in receptaculum apertos, nisi forte venulæ fuerunt. Sed plenius Cl. *GIRARDUS* canaliculum sub pia matre ab appendice hujus glandulæ ad infundibulum ascendere vidit, neque tamen perpetuum *m\*)*.

*n\*\*\*)* p. 36.

*r\*)* *Rat. medend.* VI. p. 271.

*r\*\*)* *Physiol.* n. 198.

*r\*\*\*)* l. c.

*r†)* *Disp. de infundibul. cerebri.*

*r††)* *Anat.* I. p. 464.

pag. 59. l. 11. *ad verbum* distans in textu *adde* not. *u\*)* LITTRE.

*x\*)* HEWSON *inquir.* II. p. 57.

*y\*)* GREDING *advers.* II. P. III.

*y\*\*)* *Ibid.*

pag. 60. lin. 17. *ad verbum* piscibus in textu *adde* not. *r\*)* *Oper. min.* T. III. p. 215.  
& in fovea calvariae pariter CAMPER *Mém. des sav. étrang.* VI. p. 184. cet.

*s\*)* p. 252.

pag. 60. not. *t)* *adde* Nuper ita sensit Ill. de SAUVAGES, *Nesolog.* V. p. 18.

*z)* *adde* Per vascula cavernosa SAUVAGES, ut cerebrum sublevet.

*m\*)* Ad SANTORIN. *posthum.* p. 36.



Veteres etiam hydrocephali exemplum produxerunt, cum glandula pituitaria scirrhusa esset *m\*\**), & aliud Ill. olim LUDWIGII extat. Epilepticus erat, in cujus cerebri ventriculis post mortem plurima aqua reperta est. Is, dum vivebat, levabatur capite prono dato, ut aqua in infundibulum facilius descenderet. Quare & infundibulum ei aqua plenum fuit *m\*\*\**).

pag. 62. l. 22. *adde* Animum tamen addit hypothefin proposituro, quod omnino in piscibus fere omnibus filamenta cerebri parti alienæ & frequenter ad nervum olfactorium ramum dedisse viderim *c\*)*. Quare hanc disquisitionem peritis viris, & sua ad incisiones opportunitate gaudentibus commendo. Constantia enim me movet, qua filamenta nervorum similia in omnibus piscibus educit. In febre maligna nuci æqualem ORTESCHIUS vidit *c\*\**). Secretioni potius aptam videri BOURGELAT *c†*).

p. 63. l. 6. *post* transversa *adde* quadrigemina.

p. 64. l. 3. *adde* extrorsum in gracilem caudam producit.

ibid. l. 10. *dele* nihil vero ---- sanguinis habent.

ibid. l. 13. *adde* In fele Samuel COLLINS tertium par tuberculorum habet, exterius positum, quam testis *b†*).

ibid. l. 15. *adde* Sic in piscibus frigidis *b††*).

ibid. l. pen. *post* particula *adde* veteribus tamen & GALENO non ignota.

*m\*\**) *Hist. de la Société Royale de Montpellier*, p. 110.

*m\*\*\**) *Epist. ad me* T. III.

pag. 61. not. q) *adde* Castaneæ mole BOURGELAT.

*c\*)* In cyprino, corticis tamen videntur pediculi, *Oper. min.* p. 204. in alio cyprino p. 207. In lucio pisce filamenta dat ad tubercula minora, ex quibus altera est origo nervi olfactorii, aliud filamentum ad commissuram inferiorem p. 208. Ad tubercula olfactoria in trocta p. 210. Sic in *Ombre chevalier* p. 212. Alii pedunculi in perca supra commissuram transversam cerebro affixi pag. 213.

*c\*\*) In Diario* T. p. 414.

*c†*) *Elem.* p. 479.

pag. 63. not. f) *adde* SANTORIN. *posth.* T. III. f. 2.

*m)* *adde* Potius minores SANTORINUS.

pag. 64. not. u) *adde* In elephanto CAMPER.

*b†*) *System.* t. 53.

pag. 64. not. b\*) *adde* *Oper. min.* III. p. 193.

*b††*) *Oper. min.* III. p. 216. cet.

*c\*)* *adde* Annúmerat glandulis, quæ in vasorum divisionibus ponuntur, GALENUS.

pag. 65. not. i) *adde* Vide icon. *meur. Fascic.* VI. t. 2.

ibid. l. 5. *ad verbum* imponitur in *textu* lin. 5. *adde* not. i\*) SANTORIN. *posth.* T. III. f. 2.

*m)* lin. 8. *adde* MORGAGNI *de sed. & caus. morb.* I. p. 118. 296. Dariuscula Id. p. 184.

(Ossea circa pinealem glandulam GALENUS *administr.* IV. c. 1. — lin. pen. *adde* Frequenter MECKEL *Mém.* de 1765. p. 94. NIEMANN ad COHEN *de calc.* p. 3. GREDING I. c. in D. LEGGE, cui debilis erat ventriculus, Ill. J. PRINGLE in litteris — lin. ult. *adde* Post febrem intermittentem COLONIS p. 56. In sano milite SCHMUCKER *Wahrnehmung.* p. 109.

- pag. 66. l. 4. *lege* Reperiri ejusmodi glandulam in plusculis q) quadrupedibus lego, non tamen in omnibus; tum in nonnullis avibus q\*): in frigidis piscibus aliis reperi q\*\*), in aliis nullam q\*\*\*). In homine cet.
- ibid. l. 8. *dele* non valde facile conservantur, &
- p. 67. l. 10. *adde* & pisces f\*\*).
- p. 68. l. 2. *adde* tum pisces.\*

## S E C T I O II.

## C E R E B E L L U M.

- P** Ag. 68. l. 3. *lege* ut etiam in piscibus similis eodem loco particula reperiatur); ibid. l. penult. *post* recipiat *adde* Cl. MALACARNE in quadraginta cerebellis tredecies reperit nihil differre, in viginti & tribus cerebellum mollius esse, decem demum, ubi durius, & tria potissimum duriora, quorum unum pene cartilagineum esset 2\*).
- p. 69. l. 9. *adde* Piscibus perexiguum.
- p. 70. l. 2. *post* dividitur *adde* Dictum est, in animali nuper nato corticeam naturam cerebelli a medullari vix distingui p\*). Verum sollicite inquirens Cl. MALACARNE p\*\*) utique etiam ea ætate utramque naturam distinctissimam reperit.
- p. 71. l. ult. *adde* qui floccus est *Vincentii* MALACARNE.
- p. 72. l. 6. *adde* Nuper *Vincentius* MALACARNE r\*) fusissime descripsit lobos,

pag. 66. not. q) *lin.* 2. *adde* CAMPER.

q\*) In struthiocamelo *Parisini*, in aquila BORRICH. *hermet. egypt. sapient.* p. 266. HAR-  
DER *apiar.* p. 63. Nulla in anseris, anate, tringa *Oper. min.* P. II. p. 197.

q\*\*) Carpio, capito, tinca. *Oper. min.* p. 215.

q\*\*\*) Coregono, lucio, trocta, *Oper. min.* l. c. In asello nulla CAMPER.

pag. 67. b) *adde* SANTORIN. *posth.* l.

ibid. l. 10. *ad verbum* aves *adde* not. f\*) *Oper. min.* III. p. 192.

f\*\*) Ibid.

pag. 68. not. r) *adde* In nostris *Oper. min.* III. p. 215.

y) *adde* Plerumque mollius GREDING *advers.* III. P. II.

2\*) MALACARNE p. 118. 119.

pag. 69. not. k) *lege* Cerebrum gr. 24. cerebellum gr. 8. cet.

m) *adde* Conf. multas mensuras p. 6. & Auctar. *Fasc.* IV. p. 5. seqq.

p\*) MASSIMI.

p\*\*) p. 121.

p. 70. not. r) *adde* Decem Cl. CARNAVALLE; tredecim DUVERNOI.

pag. 71. not. n) *adde* Uvula Cl. MALACARNE.

r\*) *De cerebello.*



lobulos, laminas parallelas, foliola. Lobos dixit, superiorem anteriorem, superiorem posteriorem, inferiorem posteriorem, subtilem, liventem, centralem. Eos lobos & loborum ipsas laminas numerat.

Distinguit porro *pyramidem laminosam*, quæ inverso cerebello, elevata medulla oblongata demum apparet. involutarum laminarum est fasciculus.

Tunc *tonfillas* & ipsas laminis compositas, unam utrinque affidentem uvulæ, & *uvulam* longam conicamque, quæ vulgo vermis audit inferior, & valvulas semilunares duas quarti ventriculi TARINO dictas; & ex eorum limbo eductum pediculum, sustinentem *floccos laminosos* inter plicas piæ membranæ & granula plexus chorioidei positos, crispas, liberos, in cavum cranium pullulantes, suos habentes nucleos. Demum *nucleos medullares* tectos substantia corticali pene undique, numero decem, quorum princeps sit vermis GALENI.

p. 72. l. 12. adde Laminas in eo medullares in duas divisas Cl. GREDING vidit.

p. 73. l. 12. adde Cl. MALACARNE pene eodem modo describit 1. fibras transversas esse; 2. duæ fasciæ medullares latera tenent fulci medullæ oblongatæ; 3. planum cineritium subfuscum; 4. fibræ longæ albæ sequentes ductum fibrarum pontis; 5. fibræ transversæ & distinctæ a fibris medullaribus longitudinem sequentibus *y\*\**).

ibid. l. ult. adde In piscibus pons mammillaris adest non simillimus humani *n\*)*.

pag. 75. l. 8. adde Medullaris cum sit, ob tenuitatem sæpe pellucet, alias fibris medullaribus conspicuis percurritur. Aliam, sed obscuram, valvulæ descriptionem SANTORINUS dat *k\*)*.

pag. 72. lin. 9. ad verbum *ferratas in textu* adde not. *s\*)* Aut certe flexus GREDING, & puncta, & veræ stellulæ nonnunquam *Advers. III. P. IV.*

ibid. not. 2) adde Mavult brachia dicere Cl. MALACARNE.

p. 73. lin. 10. ad verbum *corticea in textu* adde not. *g\*)*. Habet etiam GIRARDUS ad SANTORINUM T. II.

*g\*\**) De cerebello, p. 76. 77. 78.

*h)* adde SANTORIN. t. 3. f. 1. DUVERNEY T. III. f. 5.

*i)* adde Habet etiam CARNAVALLE.

*n\*)* Oper. min. III. p. 202.

pag. 74. not. *p)* adde SABBATIER *Mém. des savans étrangers*, VII. p. 603. 604.

ibid. not. *c)* adde & intus membrana pulpofa investiente quartum ventriculum, & extus epithelio p. 108.

pag. 75. not. *g)* adde Nomen valvulæ rejicit Cl. MALACARNE.

*k\*)* p. 72.

pag. 75. l. 16. ad verba quarti paris in textu adde not. *l\*)* Negat eas se vidisse Cl. MALACARNE.

*m)* adde MALACARNE p. 115. 116.

pag. 76. l. 6. *adde* Easdem valvulas Cl. MALACARNE fufe describit, ut tamen ob nova nomina rerum difficilior intelligatur. Oriri ex absconsa maxime parte petioli floccorum a limbo interno trium planorum priorum; duo facere satis ampla robusta vela, quæ eant ad *tuberculum* suum laminosum; referre hirundinum nidos, adhærere ad tonsillas, ad particulas vermi accumbentes, & ad uvulæ basin (vermis inferioris); & dextram valvulam cum sinistra conjungi. Earum cavum fursum respicere partem superiorem quarti ventriculi *pt*).

p. 78. l. 7. *adde* Duas, tres videri, sed facile in plures dividi GIRARDUS, & a parte tum superiori, tum inferiori advenire, quibus vocibus videtur eas intelligere, quas proxime dixi *s*\*).

ibid. l. 9. *adde* Hanc viderit SANTORINUS etiam ad proximum cerebelli pedunculum ivisse.

ibid. l. 16. *adde* Cl. MALACARNE duas ex partibus sulco oppositis tæneas accedentes ad portionem duram describit, alias vero ad mollem; iterum alias cinguli modo se addere ad par vagum *y*\*).

ibid. l. antep. *adde* inque piscibus *a*\*),

## S E C T I O III.

## M E D U L L A S P I N A L I S.

**P** Ag. 79. l. 11. *post* medullares *adde* cinereis aliquando striis mistæ *f*\*).  
 ibid. l. 13. *adde* Ad latera quasi curvatis caudis in medullam oblongatam exquantur *h*\*). Ab ea cauda subinde nervum octavi paris radicem habere SANTORINUS, GIRARDUS *h*\*\*).

*pt*) pag. 61. ad 68.

pag. 76. not. *s*) *adde* Puto a Cl. CARNAVALLE tangi p. 38. Non satis certus.

*y*) *adde* Posteriores vocat GALENUS *Administrat.* IX.

pag. 77. not. *e*) *adde* Ad tertiam, quartamque vertebram CARNAVALLE.

ibid. *ad verbum* ventriculo *in textu* lin. pen. *adde* Eam partem Cl. MALACARNE dixit *floccos laminosos* p. 65.

*s*\*) GIRARDI p. 42.

pag. 78. not. *u*) *adde* SANTORIN. t. 2. GIRARDI.

*y*\*) l. c. p. 112. 113.

*a*\*) *Oper. min.* III. p. 208. &c.

*f*\*) GIRARDI ad. t. 3. f. 1. & t. 2.

*h*\*) SANTORIN. T. II.

*h*\*\*) Ibid.

p. 80. *ad verbum* transversæ *in textu* lin. 9. *adde* not. *o*\*) Etiam GIRARDUS ad T. II.



pag. 80. l. 10. *post* quidem *adde* etiam obliquæ o\*\*).

ibid. l. 11. *adde* Cl. MALACARNE paulo aliter loquitur, ut eadem tamen viderit. Numerat corpora pyramidalia, a quibus pars prodeat nervi duri.

Corpora olivaria a figura dicta, quæ facile ex suis nidis possunt erui, & quorum pars interior flava sit.

Et demum *fascias medullares* filis factas parallelis ex cruribus cerebri natas, aliquando in vertebrae usque prodeunt q\*).

ibid. l. ult. *adde* in ipso animali imperfectiori marino lepore t\*), in limace t\*\*).  
p. 81. l. 5. *adde* & crocodilo y\*). In omnibus animalibus reperitur, quibus nervi sunt; atque vicissim ab his abest, quæ nervis destituuntur. Non ideo dixerim primam eam esse corporis animalis partem, ex qua reliquæ sensim prodeant y\*\*). Certum est enim, in embryone gracillimi nervuli similem esse grandi cum cerebro.

p. 82. l. 4. *adde* quæ nervi lumbales nascuntur.

ibid. l. 6. *adde* Raro exemplo SWAGERMANN in longam planiusculam quasi linguam abiisse vidit m\*).

p. 83. l. pen. *adde* Qua a ventriculo quarto descendit, SANTORINO visa est longis fibris exterius formari d\*). Totam fibrosam apparere, si ex calida in frigidam demergatur SWAMMERDAMIUS d\*\*). In cruribus oleum continet d\*\*\*).

o\*\*) GIRARDI T. II. SANTOR.

pag. 80. not. p) *adde* neque GIRARDUS, transcurrentes a dextris in sinistras vidit MALACARNE, decussari neque ipse vidit, etsi obliquæ erant, p. 97.

ibid. not. q) *adde* DUVERGE *des contrecoups*, p. 105. 106. *La FOSSE Mémoir. de l'Acad.* 1767.

q\*) p. 86. 87. 88.

r) *adde* *Comment. Bonon. V. p. 1.*

s) lin. 1. *adde* *Comm. Bonon. V. P. II. lin. pen. adde* in alia musca *Carol. de GEER V. II. P. II. p. 930.*

t) *adde* In vermibus longis BONNET *contempl. II. p. 31. In nereide PALLAS misc. p. 130. 131.*

t\*) BOHADSCH *anim. marin.*

t\*\*) SPALAZAN. *riparat. p. 60.*

y\*) VESLING *Ep. V.*

y\*\*) MASSIMI *obs. p. 21.*

m\*) *Watergezw. p. 104.*

pag. 82. not. t) lin. 1. *adde* quas universas figuras SWAMMERDAMIUS propria manu delineavit *Bibl. nat. ad t. 28. f. 3. Tum PETIT oct.*

d\*) T. II. f. 2.

d\*\*) L. 28. f. 3.

d\*\*\*) LYONNET p. 101.

pag. 84. l. 3. *adde* Mirifica vero vis motrix est in medullæ spinalis bombycis ea parte, quæ abdomine continetur; serpentino nempe perpetuo motu agitur: in chrysalide paulo obscurius, in papilione evidentius, ut idem motus inhibeatur, nervis incisus i\*). Is motus per ipsam cutem pellucet.

p. 85. l. 4. *post* circumdet *adde* In imo fine infundibuli medullæ spinalis in superficiem duræ membranæ interiorem continuatur s\*).

p. 87. l. pen. *post* TREWIIUS *adde* Nulla enim pars canalis medullam sentientem continentis est, in qua nonnunquam non ejusmodi herniæ duræ membranæ apparuerint, quoties ossæ natura eam non coërcuit. De occipite frequenter ejusmodi tumor prodit \*). In fronte rarius \*\*). In collo, hic rarius \*\*\*); in dorso rarius \*\*\*\*); in dorso & lumbis \*\*\*\*), in lumbis †) frequentissimus est; puto in parte ima ob pondus eo descendens aquæ, & in sacro osse ††); demum in collo, pectore, lumbis continuus †††); in occipite, lumbis, dorso imo, osse sacro ††††) cum hydrocephalo.

pag. 84. not. i) *adde* Comment. Bonon. V. P. I. Nullam esse in nereide PALLAS.

i\*) BIBIENA Comm. Bonon. T. V. P. I. & *Abregé de l'histoire des Insectes* T. V. p. 310.

s\*) BONN de continuat. membranar. p. 47.

pag. 86. not. k\*) *adde* SWAGERMANN p. 181. 182. qui tamen sub quarta demum lumborum vertebra medullam spinalem in nervos discedere scripsit.

pag. 87. not. t) *lege* Nervi per tumorem dispersi *Gal. di Min.* VII. p. 154. SWAGERMANN

p. 98. E. N. C. II. p. 158.

ibid. not. u) *adde* DOEVEREN, SWAGERMANN p. 91. LIEUTAUD. Sed conf. imprimis SWAGERMANN p. 168.

ibid. not. y) *adde* Canalis cum ventriculis cerebri communicans; in columnam vertebralem in spina bifida PORTAL *Mém. de l'Acad.* 1770. 8. p. 259. SWAGERMANN p. 237. HENKEL *neue Samml.* Denuo cum aqua in cerebrum effusa.

\*) HOCHSTETTER cas. III. Dec. VII. Nov. *Acad. Natur. Cur.* Vol. III. obs. 44. Hic tamen absque jactura cerebri CAMPER apud SWAGERMANN *Watergezwo.* p. 84. ut per annum superviveret. Totum pene cerebrum in sacco de occipite pendulo SIEBOLD obs. FACCONI de *monstris*.

\*\*) HERWIG obs. 7. destructum cerebrum.

\*\*\*) SWAGERMANN p. 78. 79. magis funestum in crânio, ex medulla oblongata; & aliud exemplum N. Letter-Oeffening. T. I. RUERHOFT.

\*\*\*\*) Id. l. p. 78. In supremo dorso HORNES ib. p. 82. 83. Iterum SWAGERMANN p. 248. 249. Confimilis; in toto dorso destructæ vertebrae & prima lumborum ibid. p. 241. *Gal. di Minerv.* VII. p. 154.

\*\*\*\*) SWAGERMANN p. 237.

†) C. BAUHIN *hermaphrod.* p. 136. van DOEVEREN obs. ap. HILDAN. SWAGERMANN p. 98. 206.

††) SWAGERMANN p. 91. LIEUTAUD *Sepulchr.* II. p. 341.

†††) SWAGERMANN p. 123. HORN *mém. de Dion.* II. capitis & totius columnæ vertebrarum.

††††) E. N. C. II. Ann. II. obs. 158.



## SECTIO IV.

## DURA MEMBRANA.

- P** Ag. 89. l. 1. *post* numerosa adde inter nervos caudæ equinæ  
 ibid. l. 15. *adde* qui evanescat effractis vertebris.  
 p. 90. l. 15. *lege* qui a secundo ramo quintis paris cet.  
 ibid. l. ult. *post* finditur adde Et icon optimi LAGHI manifestis vitiis laborat *h*\*).  
 p. 92. l. 4. *post* periosteum adde Hæc & de reliquis quadrupedibus vera sunt, &  
 manifestissime in piscibus, in qua animalium classe, quæ dura mater dicitur,  
 nihil cum cerebro commune habet, a quo multo intervallo distat, quod cel-  
 lulosa tenera oleoque plena repletur. In iis enim animalibus manifestissi-  
 mum est, solam piam membranam cerebri esse velamentum; duram ad cra-  
 nium pertinere, cui immota adhæret *u*\*).  
 ibid. l. 5. *post* sequitur adde Cellulosa fila ex ea membrana efflorescentia cranio  
 se immittunt *u*\*\*).  
 p. 93. l. 18. *adde* Meningis ceterum vocabulum HIPPOCRATI & DIOCLI meni-  
 branis omnibus commune erat, MARINO teste; a nuperioribus ad cerebri  
 involucra restrictum *o*\*).  
 p. 95. l. ult. *adde* Demum cum experimenti causa aquam in vivo cane cranium  
 inter

- pag. 89. not. m) *adde* LUDWIG in *epist.* ad me III. p. 495.  
 pag. 90. not. d) *adde* AURRAN de *loquela absque lingua.*  
 ibid. *ad verbum* receptaculi in *textu* lin. antep. *adde* not. g\*\*) LOBSTEIN de *nerv. dur.*  
*matr.* p. 17. 19. lateralem potissimum extimum HIRSCH de *nerv. quint. par.* p. 32.  
 ibid. not. h) Sed neque ipse MORGAGNUS vidit *lege* Cl. WRISBERG quidem industria in-  
 quisivit Götting. *Anzeig.* 1776. p. 465. MEZGER *Nerv. I. par.* HIRSCH de *nerv. quinti paris.*  
*h*\*) LOBSTEIN l. c. p. 21.  
 pag. 91. not. l) *adde* Nullos esse LOBSTEIN p. 29.  
 m) *adde* Hi fuerint nervuli, quos duram matrem in fine cerebelli atque in principio me-  
 dullæ oblongatæ accipere scribit Cl. MASSIMI *esp.* 32.  
 q) *adde* Nullum FLENK *anat.* Nullos aut obscurissimos SABBATIER I. p. 453.  
 p. 92. not. t) *adde* BONN l. c. p. 404. POTT *injuries of the head,* p. 26.  
 u\*) LORRY *mém. des savans étr.* III. p. 287. JANKE de *for. calv.* p. 31. & olim GALEN.  
 de *us. part.* VIII. c. 19.  
 u\*\*) Sic SWAGERMANN.  
 d) *adde* GALEN. de *utilit. part.* L. XVI. c. 12.  
 g) *adde* WEPFER de *apoplex.* p. 303.  
 o\*) GALEN. de *administ. anatom.* IX. c. 2.  
 pag. 95. not. h) lin. pen. *adde* SCHUSTER *Journ.* II. p. 96. LORRY *mém. pres.* III. p.  
 279. MORGAGNI de *fed. & caus. morb.* II. p. 83. RAST in *epist.* 1765. BAADER *obs.* 29.

inter & duram membranam impellere conaretur, nunquam potuit Cl. A. C. LORRY o\*).

pag. 96. l. 17. *adde* Qui vero cerebrum diminui possit c\*), ego passim reperio, intelligere vero nequeo. Veteres plena cum luna cerebrum tumescere scripserant, idque nuper repetitum fuit. Non ut intelligam, ut ejusmodi aliquid locum habere possit.

p. 98. l. 5. *adde* Alias ejusmodi concrementa propiora fuerunt naturæ lapideæ r\*).

p. 99. l. 15. *adde* Tenera ejus lamina supra carotides & infundibulum ascendit, & in arachnoidea evanescit k\*\*), supra glandulam pituitariam tenerrima extenditur, & infundibulum, quod a pia fit membrana, in vaginam quasi recipit, & quasi intus suscepta in arachnoideam degenerat k†).

ibid. l. 16. *adde* Denique eadem interior lamina per foramina cranii cum nervis exiens in eorum exterius cellulorum involucrium dissolvitur, postquam paulum progressa est. Fit eadem nervi optici involucrium l\*), replet infundibula l\*\*), per quæ nervi olfactorii exeunt, sic aliorum nervorum cellulosa fit vagina l\*\*\*), ne diffidente quidem CATIO l†); cellulosa eam naturam etiam Cl. MASSIMI habet l††).

p. 103. l. 5. *lege* tota duræ membranæ interior facies u\*) fundere cet.

ibid. l. 11. *post visa adde* Cerebrum in affectu catarrhali aqua tanquam spongia imbutum e\*).

o\*) *Mém. prés. III. p. 282.*

c\*) RICHARD I. p. 87.

pag. 98. not. q) *adde* Tria MORGAGNI *Sed. caus. I. p. 268.* In apoplectico STOERK p. 19. In furioso os cerebrum compungens MECKEL.

ibid. not. r) *adde* Prope falcem ossicula *Mém. des sav. étr. III. p. 464.* Laminæ ossæ amplissimæ prope callosum corpus *Journ. de medec. T. I. n. 5.* Magnarum laminarum plura exempla POHL *progr. 1769.*

r\*) In suspenso piam inter & duram trifurcus calculus PANAROL. V. *obs. 14.* Inter duram membranam & mediam cranii fossam gypsea materies effusa *Journ. de medec. 1767. Août.*

k\*\*) BONN p. 71.

k†) p. 45.

l\*) p. 40.

l\*\*) JANKE *de foraminib. calvar. p. 36.*

l\*\*\*) ZINN *Comm. Gotting. III. p. 258.*

l†) *Le CAT. sensib. p. 196. 212. 217.*

l††) *Ess. p. 19.*

pag. 103. not. u) *adde* In medulla spinali COTUNNUS l. c. p. 12. Sed vide p. 17.

u\*) SWAGERMANN p. 19.

d) *adde* Dura meninx glutine obducta POTT *injuries, p. 227.*

e\*) LIEUTAUD I. P. I. p. 71.



pag. 103. l. 15. *lege* Offeæ g\*), lapideæ naturæ cet.

ibid. l. 16. *adde* Vicissim uti exhalat idem humor, ita resorbetur. Aqua aut alius humor injectus cerebrum *inter* & duram matrem resorbetur \*), & perinde si inter cranium & duram matrem impuleris & admissus fuerit \*\*), pariterque effusus sanguis in lethargo \*\*\*).

Alia est aut aqua, aut gelatina, quæ in piscibus duram inter membranam & cerebrum se interponit, tenera cellulositate excepta. In testudine marina tenuem esse, neque ad ignem cogi COTUNNUS \*\*\*\*), idoneus ceterum auctor. In cane carcharia *Seekatze* aquam reperiri & circa encephalon, & circa medullam spinalem \*\*\*\*\*). Adipi aut gelatinæ CAMPERUS comparat, hic nostris annotationibus propior †). In cyprino carpione ††) adeps est mollissimus, in tenera cellulosa diffusus, quam vascula perambulant. Idem oleum & cerebro circumfusum & medullæ spinali videtur esse, quod vulgo *Sperma ceti* dicitur, & ex balæna excoquitur.

Ejusmodi spatium etiam in homine video dici, præter fidem anatomes †††).  
p. 104. l. 8. *post* VESALII *adde* Huc forte papillæ duræ meningis cranio innatæ, quæ pro doloris capitis causa habet Cl. CHESNEAU i\*).

ibid. l. 16. *adde* Multi glomeres glandulosi in convexa superficie duræ meningis r\*), qui per morbos majores fiunt.

ibid. l. penult. *adde* Acinosas ZINNIIUS, & addit per ætatem nigrescere x\*).

p. 106. l. ult. *adde* Nullæ glandulæ duræ membranæ ALBINUS e\*). In morbos corporibus absque certa lege reperiri, a fanis abesse RÖDERER, ut vitio nasci videantur e\*\*).

g\*) MORGAGNI *de sed. & caus. morb.* I. p. 16.

h) *adde* Meninges in scorbuticis hominibus coalitæ & scirrhis obductæ WILLIS *morb. convuls.* p. 258.

\*) PORTAL *précis* II. p. 153.

\*\*) Ibid.

\*\*\*) MEZGER *apoplex.* p. 76.

\*\*\*\*) *De ischiade nervos.* p. 16.

\*\*\*\*\*) Drontheim. *Gesellschaft*, II. p. 255. 262.

†) *Mém. des sav. étrang.* VI. p. 180.

††) *Oper. min.* III. p. 199.

†††) La FOSSE *Mém. de l'Acad.* 1767.

pag. 104. *ad verbum* puteolos *in textu* lin. 4. *adde* not. ††††) HAADER *obs.* 29. & 25. in epileptico.

i\*) *Obs.* 16.

r\*) DUVERNEY *posthum.* I. p. 29.

x\*) *Epist.* ad me III. p. 252.

e\*) *Natur. homin.* p. 132.

e\*\*) *De morbo mucoso*, p. 189.

## S E C T I O V.

## ARTERIÆ ET VENÆ ENCEPHALI EJUSQUE

## PROPAGINUM.

**P**ag. 108. l. 8. *adde* Memoria digna est annotatio Ill. MORGAGNI, qui arteriam vertebralem dextram quadruplo sinistra latiore vidit *m*<sup>\*</sup>).

Quare etsi plurimum consuetudo potest *m*<sup>\*\*</sup>), non tamen negari potest in ipsa natura lateris dextri prærogativa.

ibid. l. pen. *lege* ut memores simus, eum, qui vulgo *externa* dicitur carotis, anteriorem *t*) cet.

p. 112. l. 13. *post* fincipitali *adde* Accuratius Cl. olim JANKE vidit, confluere ex ramis arteriæ temporalis atque auricularis *b*<sup>\*</sup>).

ibid. l. 15. *lege* & in dura matre cum vena meningea cet.

ibid. l. ult. *adde* Plures arteriolas per foramen jugulare subeuntes olim DUVERNEYUS dixit *e*<sup>\*</sup>).

p. 113 l. 1. *lege* Occipitalis etiam visa est genuisse cet.

p. 118. l. 12. *post* nato *adde* obstaculo

*m*<sup>\*</sup>) *De fed. & caus. morb.* II. p. 310.

*m*<sup>\*\*</sup>) Soli tribuit ANDRYUS *Orthopédie* p. 275. fatetur idem etiam pedem sinistrum robustior rem esse, in quem nihil consuetudo potuit.

pag. 109. not. *f*) *adde* Vidisse se HAENELIUS *epist.* p. 244. ad me data.

pag. 110. ad EUSTACHII nomen in *textu* lin. 18. *adde* not. *u*<sup>\*</sup>) *Le CAT de l'ouïe* p. 59.

*b*<sup>\*</sup>) *De foramin. calvariae*, p. 68. T. I. g. g.

pag. 112. not. *c*) *adde* JANKE l. c. p. 71. 72. t. 2. d. d.

*e*<sup>\*</sup>) *Posth.* I. p. 20.

pag. 113. not. *l*) *adde* Habet *le CAT de l'ouïe* T. 5.

pag. 115. not. *k*) *adde* Habet LOBSTEIN *de nerv. dur. matr.* p. 16. Habet *le CAT de l'ouïe* t. 8. f. 1. l.

ibid. *ad verbum* membranam in *textu* lin. 17. *adde* not. *t*<sup>\*</sup>) Rariori exemplo per mediam futuram squamosam cranium subiit SABBATIER II. p. 476. 429.

ibid. lin. ult. *ad verbum* irretitur in *textu* *adde* not. *z*<sup>\*</sup>) DUVERNEY *posth.* I. p. 19.

pag. 116. not. *e*) *adde* Similes fulcos vasa in cornu cervi exsculpunt *De FIEN*, p. 30.

ibid. *ad verbum* pulsu in *textu* lin. 8. *adde* not. *g*<sup>\*</sup>) Pulsui tribuebat BOERHAAVIUS *morb. nerv.* p. 29.

ibid. not. *l*) *adde* *Le CAT* t. 8. f. 1. 2.

pag. 117. *ad verbum* replet in *textu* lin. 10. *adde* not. *q*<sup>\*</sup>) Arteria tubam amplexa ad duram meningem *Le CAT de l'ouïe* p. 54.

ibid. not. *r*) *adde* LOBSTEIN l. c.

ibid. not. *s*) *adde* Ejusmodi ramum habet *Le CAT* t. 8. f. 5. a. b.

pag. 119. not. *r*) *adde* *Journ. de medec.* 1757. Decembre.

ib. not. *s*) *adde* Duæ valvulæ carotidis seu officula parva duo *opusc.* p. 108.



pag. 121. l. 14. *adde* Cl. LOBSTEIN ejus ramum primum dicit pone processum clinoidaeum natum, rete arteriosum efficientem cum altero sodali pariter pone eam apophysin orto, & alium denuo arcum supra apophysin occipitalem anteriorem facientem. Deinde furculi eunt in duram membranam, in fellam turcicam & pone eam, inque glandulam pituitariam *k*\*).

p. 122. l. 7. *adde* Ita LOBSTEINIUS. Ramus anterior exterior receptaculi, super nervum sextum incedens dat ramos ad secundum & ad tertium ramum quinti paris, ad orbitam, ejusque duram matrem, qui facit anastomosis cum arteriola ophthalmicae propagine, quae levatorem adit *n*\*). Hæ arteriæ pro nervis a quinto pare ad duram matrem euntibus habitæ fuerunt, potissimum furculi laterales externi *n*\*\*).

p. 125. l. 11. *adde* Sed etiam calculosæ & induratae visæ sunt in maniaco \*); in cephalæa \*\*); arteriæ tenuis meningis omnes ossæ \*\*\*). Sinistra arteria vertebralis subdura alba \*\*\*\*), & alias ossæ tota †). Vir cum oblitterata carotide tres annos vixit ††). Denique omnes cerebri arteriæ ossæ †††), & vertebrales perinde atque carotides ossis punctis variæ ††††). Apparet, & frequentem esse in arteriis cerebri naturam ossæam, & sæpe diu tolerari cum vita orthostadia.

ibid. l. 20. *adde* Aliqua tamen inde mala subinde, tam magna cum vasa sint, secuta legas. Quibus venæ jugulares comprehenduntur, ii linquuntur animo

pag. 120. not. 2) lin. 1. *adde de usu puls.* — lin. 2. *adde* Sub glandula pituitaria poni C. STEPHANUS, p. 252.

pag. 121. not. b) *adde* Ex multis animalibus describit DUVERNEY *posih.* I. p. 574.

*k*\*) *De m. v. dur. matr.* p. 14.

*n*\*) p. 15.

*n*\*\*) p. 17. 19.

pag. 122. not. u) *adde* Per fissuram laceram MONRO *bones nerves*, p. 119.

pag. 123. not. c) *adde* Orbitaria externa DUVERNEY *posih.* I. p. 20.

pag. 124. not. r) *adde* Sat bene SANTORIN. *posih.* T. II.

\*) HARMERS in *diff.*

\*\*) E. N. C. *Dec. I. Ann. I. obs.* 27.

\*\*\*) MORGAGNI *de sed. & caus. morb.* I. p. 296.

\*\*\*\*) Equidem in apoplectico, *Id.* II. p. 402.

†) *Id.* ibid. ††) *Mém.* 1765. p. 484.

†††) BUCHWALD *obs.* 3.

††††) MORGAGNI I. p. 28.

pag. 125. not. c) *adde* Brevem duarum horarum EMETT II. p. 331. sed ego nullum vidi.

ibid. not. e) *adde* GALEN I. C. COLUMBUS apud VALVERDAM *anat.* L. VI. c. 2. SANCTORIUS in I. *Fen. AVICENNÆ* p. 629. FONTANUS *respons. conf.* p. 11. MORGAGNI *Sed. caus.* I. p. 180. *Epist. anat.* XIV. n. 30. 33. B. LANGRISCH *musc. mot.* p. 14. 15. PARISOT *Journ. de med.* 1756. Janvier. — *post* EMETT *adde* In altero exemplo tamen sopor — *post* SWIETEN *adde* DRELINCOURT *Canicid.* STOLTE *mort. submers.*

ibid. not. g) *dele* WILLIS p. 58. Eam anastomosis cet.

ARISTOTELES *g*\*). Plus tamen mali a carotide ligata, quam a crurali BOISSIER *g*\*).

p. 128. l. 2. *adde* Aneurismata etiam in arteriis cerebri vir illustris BRUNNERUS vidit *g*\*).

p. 132. l. 4. *adde* Demum ramum ad ganglion nervi primi *x*\*).

ibid. l. 18. *adde* Fuerit ramus arteriæ vertebralis ad cerebellum, medullam oblongatam, nervum quartum & octavum, ventriculum quartum, ejusque plexum chorioideum *Josephi DUVERNEY f*\*).

p. 137. l. 7. *adde* Appendix est per os coccygis exiens ARNISÆ *k*\*).

p. 141. l. 22. *post* præditis *adde* Antiqua est hypothesis. Tenuissimum sanguinem esse, qui caput adeat, crassum, qui partes inferiores, olim ARISTOTELES *q*\*).

p. 142. l. 7. *adde* Verum cum ea omnia parum firma sint, quæ de peculiari indole sanguinis cerebri a nonnullis relata fuerunt, suffecerit forte ad phænomena interpretanda sola sanguinis ad caput missi ubertas, & cum in cerebro secretio non possit ad pondus alicujus momenti esse, magna portio sanguinis ad tres fere encephali libras. A multo enim sanguine calor, & pulsatio, & sanguinis evidentiora in cerebro, quam in aliis partibus, symptomata intelliguntur.

p. 146. l. 8. *post* transeunt *adde* Vidi sinum in alveolos quasi divisisse *m*\*).

ibid. l. 16. *post* posterior *adde* & increfcit robore *s*\*).

p. 148. l. 18. *adde* Nullas se vidisse, nisi antrorsum apertas venas Cl. SABBATIER *y*\*). Verum negativarum thesium difficillima est demonstratio, & inductionem fere infinitam requirit; ego certe hic venas vidi, & cera repletas, & sibi relictas.

*g*\*) *Somn. vigil. n. 2.*

*g*\*) *Effets de l'air, p. 43.*

pag. 126. not. *n*) *adde* Eum ramum DUVERNEYUS habet *posth. I. p. 87.* qui adit medullam oblongatam, sub fornice se occultat, dat ramos plexui chorioideo, ventriculo tertio, glandulæ pineali, natibus, testibus.

*g*\*) *Obs. 2. posth. I. de pancreate.*

pag. 130. not. *y*) *adde* Laqueum habet le CAT de l'ouïe t. 10. satis levem.

*x*\*) *Le CAT t. 10.*

*f*\*) *Posth. I. p. 69.*

pag. 136. not. *o*) *adde* Duas habet DUVERNEY I. p. 69.

*k*\*) *De partu, p. 256.*

*q*\*) *Somn. vigil.*

*m*\*) WEITBRECHT *Syndesmolog. p. 202.*

*s*\*) DUVERNEY *posth. I. p. 30.*

pag. 147. not. *l*) *adde* Vidit Cl. WRISBERG *Embryol. p. 47.*

*y*\*) *Mém. des sav. étr. VII. p. 609.*



pag. 159. l. 2. *adde* Ingressum harum venarum accurate descripsit Vir. Cl. *Andreas* BONN, nempe venas ex sinu falcis provenientes ad superficiem cerebri, ante immersionem in piam membranam; valvulas quidem habere in parte superiori cerebri, quæ sint arachnoideæ membranæ duplicatæ propagines, supra truncum venulæ in duram membranam continuatæ, tandemque in laminam ejus meningis internam explicatæ. Sic etiam vasa, quæ ex dura membrana in piam eunt, aut vicissim, suam nunquam non habere vaginulam z\*).

p. 153. l. 14. *post* brevior *adde* antèrius angustius, posterius latior n\*),

p. 159. l. 14. *post* divaricatur *adde* quæ ad circuli modum magnum foramen ambiunt i\*).

p. 162. l. antepen. finem *lege* sinum

ibid. l. ult. *adde* Alia est insignis secundum superiorem palpebram inter ramum transversum faciei & labialem transversa anastomosis x\*).

z\*) *De continuat. membranar. n. 46.*

pag. 150. not. m) *adde* SABBATIER *Mém. des savans étrangers*, VIII. p. 607. DUVERNEY

I. p. 15.

ibid. not. o) *adde* DUVERNEY t. 3. f. 1. T. I.

ibid. not. q) *adde* DUVERNEY *posth.* T. I.

ibid. not. s) *adde* Unum bifidum DUVERNEY t. 1.

pag. 151. not. g) *adde* In fine falcis trifidus DUVERNEY t. 1.

pag. 152. *ad verbum* vestiente in *textu* lin. 9. *adde* not. u\*) DUVERNEY t. 4. n\*) *Syll. anat.* t. 15. 16.

pag. 154. not. c) *adde* ZINN p. 228. DUVERNEY pluribus ramis.

pag. 157. not. h) *adde* Duo concentrici *Syll. russ.* T. 15. f. 5. n. 119.

ibid. not. o) *adde* In petrosos inferiores inferi DUVERNEY, & in vertebrales I. p. 15.

pag. 158. *ad verbum* inseritur in *textu* lin. 13. *adde* not. q\*) RIVINUS invenit apud TEICHMEYER *Antropol.* p. 182.

ibid. not. u) *lin. 3. adde* Sibi inventum anno 1673. DUVERNEYUS tribuit II. p. 538.

ibid. not. a) *adde* Unicus bifurcatus DUVERNEY *posth.* I. p. 24.

pag. 159. *ad verbum* quarto in *textu* lin. 8. *adde* not. h\*) DUVERNEY *posth.* I. p. 24.

i\*) *Syllab. russ.* p. 15. f. 5.

pag. 160. not. u) *adde* & nuper eximie WALTERUS *obs. anat.* c. 4.

ibid. *ad verbum* cerebialis in *textu* lin. pen. *adde* not. y\*) WALTER *obs.* I. p. 1. 2.

pag. 162. not. p) *adde* WALTER t. 1. 44.

ibid. *ad verba* altera vena in *textu* lin. 3. *adde* not. p\*) WALTER t. 2. 14.

ibid. not. r) *adde* Plenissime WALTER t. 1. 2.

ibid. not. s) *adde* Communicationem inter duas jugulares, quæ secundum maxillam inferiorem eunt, in sinistro latere frequentiores esse, quam in dextro, RAVATON *Chirur. d'Armée* p. 14. Nescio an ad numerosas annotationes. WALTERUS brevem habet & exiguam.

ibid. not. t) *adde* Truncum ejus articulare vocat WALTER, & a temporali deducit t. 2. cum ramo internæ mistum t. 1. & 2.

ibid. not. u) *adde* WALTER.

x\*) WALTER t. 2.

pag. 163. not. y) *adde* WALTER t. 2.

ibid. not. c) *adde* Totam vide apud WALTERUM.

pag. 164. l. 11. *adde* Duas vel tres ejusmodi venas habet BERTINUS *q*<sup>\*)</sup>).  
Unam ad tres venas, totidemque foramina, alia in osse temporum sola, alia  
& in eo, & in osse occipitis WALTERUS *q*<sup>\*\*\*</sup>).

p. 165. l. 13. *post* communicat *adde* vel in petrosos inferiores *f*<sup>\*)</sup>).

p. 166. l. 12. *adde* In æquali amplitudine, & subito ampliora vidit Cl. olim  
JANKE *n*<sup>\*)</sup>). Ea vena in superficie anteriori calvariæ rete facit *n*<sup>\*)</sup>) cum tem-  
porali & occipitali.

Inde foramina in cranio unum *n*<sup>†</sup>), vel duo, per quæ una, aut una utrin-  
que vena in sinum longitudinalem se immittit *n*<sup>††</sup>).

p. 167. l. 4. *adde* Venam eo loco habet CHESELDEN *x*<sup>\*)</sup>), & arteriam ad na-  
res euntem.

ibid. l. 10. *adde* Ea fuerint foramina, per quæ PETITUS acum in sinum falciformem  
ire coëgit, quod BERTINUS negat sibi successisse *b*<sup>\*)</sup>).

ibid. l. 13. *adde* Et nunc, omnibus expensis, suspicor, sinum esse pituitarium.

p. 170. l. ult. *adde* Tot quum sint sanguini venoso de cerebro redituro viæ,  
non mirum est, vinculum venæ jugulari injectum nullam noxam inferre,  
neque fomnum facere *z*<sup>\*)</sup>), experimento etiam nostro.

p. 171. l. 15. *post* descriptus *adde* ut repetere non sit necesse; *nam reliqua hujus*  
*paragraphi verba pariter, atque XXXIX paragraphum a nova editione abesse*  
*Auctor jussit.*

p. 174. l. 14. *post* excitant *adde* & pus. *o*<sup>\*)</sup>),

pag. 164. not. i) *adde* WALTER exiguum habet t. 2.

*q*<sup>\*\*) II. p. 366.</sup>

*q*<sup>\*\*\*</sup>) p. 66. 67.

*f*<sup>\*)</sup> DUVERNEY T. I. f. 4.

*n*<sup>\*)</sup> Foram. calv. p. 58. 76. *n*<sup>\*\*) p. 74.</sup>

*n*<sup>†</sup>) p. 73. *n*<sup>††</sup>) p. 75.

pag. 166. not. q) *adde* Foramen non esse perpetuum BERTIN II. p. 400.

*x*<sup>\*)</sup> Osteogr. c. 1.

*b*<sup>\*)</sup> Obs. II. p. 131. 132.

pag. 167. not. d) *adde* Conf. DUVERNEY p. 105.

ibid. not. e) *adde* DUVERNEY ibid.

*z*<sup>\*)</sup> STOLTE mort. submers. ORDER de irritabilit. HEUERMANN Physiologie, III. p. 215. LA-  
MURE Mém. de l'Acad. des sciences 1749. p. 544. Nostr. exper. de mot. sangu. 13. E. N. C. Dec.  
II. ann. III. obs. 115. & olim GALENUS. Ligatis jugularibus canis superfuit quatuordecim die-  
bus DUVERNEY posth. II. p. 531. ne arteriis quidem & venis ligatis SWIETEN I. p. 286. & ARIS-  
TOTELEM huc referas, qui venas ab arteriis nondum distinguebat.

pag. 174. not. m) *adde* VALKENBURGIUS apud NEANDRUM. Cerebrum inde quasi in gru-  
mum contractum BUKRHUS.

*o*<sup>\*)</sup> Post lapsum WILLIS abd. tum monstr. RUMLER obs. 17. BONNET prodr. præf. c. 72.  
*post* magnos capitis dolores. Felici etiam eventu Journ. de med. T. XVII.

p) *adde* WHARTON post apoplexiam, sic BINNINGER L. III. c. 2.



- p. 175. l. 16. *post* repleantur *adde* Neque aër per nares viam per calvariam invenit z\*), neque liquore aliquo tinctus humor z\*\*).
- p. 17. l. antepen. *post* patiatur *adde* Fuse experimenta sua narrat Cl. A. C. LORRY \*), non ille cupidus receptas opiniones antiquare. Non magis, quam alias corporis partes, ab irritatione moveri \*\*), aut quam ipsam pleuram \*\*\*). Raro animal clamare \*\*\*); convulsiones nunquam supervenire †), neque cerebrum ab irritata dura membrana moveri ††); nicotianam inspersam non videri dolorem facere †††); semel butyrum antimonii, sed tunc una cerebrum læsum fuisse ††††).
- p. 182. l. 12. *adde* Denique etiam mire sub involucro receptos sinus tamen nonnunquam disruptos fuisse y\*).
- p. 183. l. ult. *adde* Sub fornice per radices baseos prægrandes lymphæ ductus versus glandulam pinealem excurrisse vidit MORGAGNUS z\*).
- p. 184. l. 7. *adde* In sulcis inter colliculos, & secundum vasa rubra in animalibus Cl. BOURGELAT dixit e\*).
- ibid. l. 13. liceat interim--pleniora experimenta suppetant, *lege* (& tamen etiam solius MORGAGNI auctoritas nos moveret); cum tamen Cl. HEWSON, qui nuper in systemate lymphatico felicissime laboravit, neget se in cerebro vasa aquosa vidisse \*\*), liceat pleniora experimentem expectare.
- ibid. l. antepenult. *adde* & MORGAGNUS supereminentem tumorem aquosum ligatis vasis lymphaticis tribuit b\*\*).

SECT.

- pag. 175. not. f) *adde* COLLINS, FRACASSATI p. 328.  
 z\*) SCHNEIDER *off. cribriform.* p. 607.  
 z\*\*) VIEUSSENS p. 57.  
 b) *adde* G. de MERA ap. NEANDRUM, BARTHOLIN. *Cent. I. hist. 5. FABRA de tabaco*  
 p. 161.  
 pag. 176. not. c) *adde* BOERHAAVE *morb. nerv.* p. 27.  
 ibid. not. h) *adde* VANDELLI *supplem.* I. p. 78.  
 ibid. not. i) *adde* DUVERNEY.  
 pag. 179. not. s) *adde* Similia de lacerata durâ matre MORGAGNI *de sed. & caus. I.* p. 269.  
 \*) *Mémoir. des savans étrangers* III. \*\*\*) p. 286. \*\*\*\*) p. 291. \*\*\*\*\*) p. 289.  
 †) *Ibid.* ††) p. 398. †††) p. 291. ††††) *Ibid.*  
 p. 181. not. o) *adde* HENKEL *Samml.* VIII.  
 ibid. not. p) *adde* de HAEN *ratio medendi* I. p. 173. BAADER *obs.* 50.  
 pag. 182. not. s) *adde* MORGAGNI *de sed. & caus. morb. I.* p. 79.  
 y\*) *Ess. of a Societ. at Edimburgh.* V. n. 53.  
 z.) *De sed. & caus. morb. I.* p. 15.  
 e\*) *Supplem.* p. 37.  
 e\*\*) *Inquir.* II. p. 51.  
 pag. 184. *ad verbum* nihil in *textu* lin. antep. *adde* not. h\*) Nec tumorem, nec salivationem  
*Mot. sangu. exp.* 113. 114.  
 h\*\*) *Sed. & caus. morb. I.* p. 182.

## S E C T I O VI.

## N E R V I.

- P**ag. 185. l. 2. *post* infectis *adde* tum polypo marino *l*\*), limaci *l*\*\*), etiam ubi nullum conspicuum caput est, ut lepori marino *l*\*\*\*),
- p. 186. l. 10. unice membraneum *lege* totum medullarem
- ibid. l. 18. *post* continuatur *adde* Sic in cyprino carpione *y*\*).
- p. 187. l. 18. *adde* tantum ut isti potius duriores sint *o*\*).
- p. 188. l. 20. *dele* funiculo
- p. 189. l. 12. *adde* Non ideo, quod in nervis plurima cellulosa est, ideo toti nervi cellulosa fiunt, quæ nupera etiam Cl. MASSIMI *k*\*) hypothesis fuit. Utilia per experimenta ostendit Cl. Petrus MOSCATUS intimum inter cellulofam telam verumque nervum esse discrimen; illam in aqua contabescere & dissolvi, nervum immutatum persistere. In eadem cellulosa tela adeps colligitur tanta nonnunquam copia, ut fibræ reliquæ fere evanescant *k*\*\*).
- ibid. l. pen. *post* sexto *adde* tum extra cranium ab infraorbitali *p*\*).
- p. 190. l. 14. *adde* Nervulos etiam inter nervi funiculos esse, quibus atroces dolores oriri possint BOERHAAVIUS *e*\*), nescio quo auctore.
- p. 192. l. 5. *adde* Refutatum olim a me errorem deferuit Cl. SABBATIER *u*\*).
- ibid. l. 8. *post* obvolvit *adde* Hæc est alia vagina nervorum accessoria, diversa ab ea quæ de cerebro advenit Ill. COTUNNI *x*\*). Ab hac potissimum membrana nervi alioquin molles duritatem habent *x*\*\*).

*l*\*) SPALLANZAN. *riproduz.* p. 60.

*l*\*\*) BOHADSCH *de animal. marin.* p. 8. 9. 10.

*l*\*\*\*) Teste Cl. KOELREUTERO.

pag. 185. not. n) *adde* Nervi seu *rovos* ad latera gulæ POLLUX p. 252. Nervus colligans femur cum ischio *Id.* p. 259.

*y*\*) *Opuscul. min.* III. p. 200. 201.

pag. 186. not. a) *adde* deinde Librum XVI.

*o*\*) In elephanto fibræ nervæ non duriores sunt, quam in parvis animalibus KAAUW *Nov. Comm. Acad. Petrop.* IV. p. 359.

pag. 189. not. f) *adde* Plicæ *Comment. Bonon. T. III.* p. 284. 292.

*k*\*) *Esper. anat. n.* 3. 4.

*k*\*\*) Plus adipis in crurali fuisse, quam fibrarum MORGAGNI *de sed. & caus.* II. p. 446.

*p*\*) *Le CAT de l'ouïe t.* 8. f. 5.

*e*\*) *Morb. nervor.* p. 67.

pag. 190. not. g) *adde* BOERHAAVE *morb. nerv.* p. 16. DAVID *Nutrition* II. p. 4. 320.

*u*\*) *Anat.* II. p. 495.

*x*\*) *l. c.* p. 37.

*x*\*\*) MECKEL *Mémoir. de l'Acad.* 1749. p. 90. 91.



- pag. 193. l. 4 *lege* duos a medulla spinali deduxerunt c),  
 ibid. l. 5. *adde* Non tamen imperite GALENUS addit, nervos molles, ubi longe progressi fuerint, demum indurescere c\*).
- p. 195. l. 2. *adde* Denique a summo viro, non facile quicquam dante conjecturæ, in nervis vis motrix ponitur, vitali similis, vel musculari, qua oscil-  
 lent r\*).
- ibid. l. 23. *adde* Demum & irritabilem esse, & agere fibram nerveam per relaxa-  
 tionem, quando lux major oculum ferit & pupilla amplior redditur x\*).
- p. 196. l. 12. *adde* Eundem esse humorem addunt, qui, ligato nervo, spissatus  
 tumorem facit in ejusmodi nervo post aneurysmatis curationem conspi-  
 cuum l\*). Hæc putes esse ganglia, quæ in nervorum vulneribus nasci dic-  
 tum est l\*\*), qualia etiam ganglia frequentia & dolorifica provenire CAM-  
 PERUS auctor est l\*\*\*).
- ibid. l. 12. *adde* Nuper demum vir Ill. *Dominicus* COTUNNUS vaporem repetiit,  
 qui in cellulositate nervi in aquulam coit n\*), magis etiam lentescit, quam  
 aqua n\*\*), & a morte coagulatur nt). Cum pes paralyticus esset, mucosa  
 collectio in vagina nervi ischiadici reperta est nt)).
- p. 197. l. 7. *adde* Vaporem, qui in aquam colligatur, puto probabilem esse,  
 cum etiam adeps in ea tela colligatur.
- p. 198. l. 14. *venis lege* nervis
- p. 199. l. 22. *lege* Ita opticus nervus duram membranam deponit, quæ vel sclero-  
 toticam producit, vel cum ea connectitur k), & piam, quæ interiorem sclero-  
 ticæ faciem oblinat l); ipsa verò medulla per cribrosæ laminæ foramina \*)

c\*) Ibid.

p. 194. *ad verbum* elasticus *in textu* lin. 5. *adde* not. l\*) Inter partes maxime elasticas SET-  
 TAGAST *Inst.* I.

ibid. *ad verbum* contendit *in textu* lin. 8. *adde* not. m\*) Nobiscum LOESEKE p. 151. Ill.  
 WHYTT *Nerv. disord.* p. 67.

r\*) GAUBIUS *patholog.* p. 268.

pag. 195. not. s) *adde* Nobiscum Ill. WHYTT. l. c. p. 68. BOURGELAT *Elem. d'Hippiatr.*  
 p. 246. Non vibrat nervus & fortissima vibratio nullum dolorem facit CAVERHILL *heat*, p. 55.

ibid. not. t) præfigenda est littera s\*) & notæ u) littera t).

ibid. *adde* not. u) FABRE *Essais* p. 21. Tamen irritabilem esse.

x\*) MARHERR *pralection* Ill. p. 160. seqq.

l\*) *Comment. Bonon.* Ill. p. 289. 294. In nodulos post amputationem versi nervi SWE-

DIANUS p. 78.

l\*\*) MAYOW *oper.* p. 390.

l\*\*\*) p. 11.

n\*\*) p. 37.

n\*) Ischias nervos. qui ex cerebro addit advenire.

nt) p. 38.

ntt) ISENELAND *Versuch einig. prakt. Anmerk. über die Nerven*, p. 79.

\*) per optica ossis sphænoidei foramina haud dubie legendum est. Not. editor. hujus auctoris.

transit, & abit in fibras tenuiores, quæ in pellucida membrana sparguntur, atque exterius, qua chorioideæ respondent, mollissima quasi pulve obducuntur *m*).

pag. 200. l. ult. *adde* Ill. nuper GESNERUS ex calculis a retina & ab imagine visibili repetitis reperit fibrarum in linea quadrata esse 2880 *y*\*).

p. 201. l. 5. *post* cancello *adde* aphrodita *b*\*) & *post* aliisque: Sed nodulos polypi aquæ dulcis totidem esse ganglia *b*\*\*) conjectura est, cum in his animalibus nulli sint nervi, ganglia vero sint nervorum quædam degeneratio.

p. 202. l. 11. *adde* Denique in ramo principe splanchnico *b*\*).

ibid. l. 13. *adde* Et multa habent plexuum similia *d*\*).

Ganglia & plexus esse in vicinia arteriarum JOHNSTON *d*\*\*).

ibid. l. ult. *adde* Hinc rubedo cellulosa in ganglio telæ, & universi ganglii *b*\*).

Hæc vasa & per involucrum ganglii rete faciunt *b*\*\*), & per cellulosa telam.

In juniore animali majora sunt, ut nervi sunt majores *b*†).

p. 203. l. 10. *adde* neque in ipsis magnis animalibus BOURGELATI *n*\*).

ibid. l. 18. *adde* & LANCISIUS *s*\*),

ibid. l. 19. *adde* Cum cerebri fabrica nihil commune habent durissimæ sistematæ nervosæ partes *t*\*).

pag. 199. not. *m*) *adde* Additis experimentis in piscibus factis *Oper. min. T. III. p. 261. n. 11. y*\*). *Thef. physic. miscell. a. 1771. edit.*

pag. 201. not. *c*) *adde* BIBIENA *Comm. Bonon. V. P. I.*

*h*\*) PALLAS *miscell.*

*h*\*\*) UNZER *Arzt. 4 Theil.*

pag. 202. not. *q*) lin. 3. *post* accumbunt *adde* & cum ganglio id solum commune habent, quod a numerosis vasis rubrum colorem habeant WRISBERG, *Götting. Anzeig. 1776. p. 465. seqq.*

ibid. not. *u*) *adde* Medium defuisse visum est ISENFLAMM *difficil. epicrif. III.*

*b*\*) LUDWIG.

*d*) *adde* Joh. Gottlob. HAASE *de gangl. nervor.*

*d*\*) HAASE.

*d*\*\*) *Of ganglions.*

*h*\*) *Le CAT sensibil. p. 224. HIRSCH. I. GASSER nerv. quint. par. MORGAGNI adv.*

*anat. II. p. 71.*

*h*\*\*) HAASE l. c.

*h*†) VITTET *veterin. I. p. 530.*

pag. 203. *ad verbum* tela *in textu* lin. 1. *adde* not. *h*††) Ex dura membrana non bene, a qua pleraque sint remotissima, & manifesto dissideant aliqua ut in oculo *le CAT sensibil. p. 223.*

ibid. *ad verbum* parallelum *in textu* lin. 3. *adde* not. *k*\*) MASSIMI p. 29.

ibid. not. *l*) *adde* In retis modum intricari HAASE l. c.

*n*\*) *Ep. p. 245.*

not. *p*) *adde* HAASE.

*s*\*) Ab eo posse obstrui & pene paralyticum fieri, p. 117.

*t*\*) Cerebri substitutum ganglion, ganglii glandula *le CAT I. p. 144.*



p. ag. 204. l. 12. *adde* Piscibus multo pauciores nervi sunt. In testudine quatuor, non plura paria CALDESI *t\*\**).

ibid. l. 15. *post* ipsos *adde* cerebri lobos anteriores, inque iis effoscos

p. 206. l. 2. *post* paratur *adde* triangulari, inferius latiori,

ibid. l. 4. *adde* Ipse linea longitudini parallela dividitur *s\**).

ibid. l. 8. *post* subeunt *adde* ut mireris negasse MERGUM posse eas fibras ostendi *\*)*, & alios nuperos *\*\*)*, cum alii clar. viri etiam cum quinti paris nervis rete facientes viderint *†*); sed jam SCHNEIDERUS & piam matrem viderat, & distinctam medullam *††*).

p. 207. l. 8. *adde* In SANTORINI opere accedunt accuratius aliqua a nuperis inquisita. In icone utique duo colliculi ordiuntur nervum opticum, quorum alter interior circa columnam cerebri inflexus evanescit. In descriptione disertius additur, a latere natum fasciculum nasci, qui thalamis opticis se addat, & ad nervorum opticorum originem accedat; alia fibra ejusdem thalami ex interioribus thalami penetralibus curvatis fibris Willisianæ chordæ occurrentibus tum a corpore geniculato ad posteriora thalami posito, intus cinereo, extus medullari. Denique major & fere præcipua pars hujus ejusdem thalami provenit ex protuberantiis testiformibus, lata & disjectis fibris ex vicinia originis nervi quarti paris. Alium denique fasciculum subjungit a supera parte crurum medullæ oblongatæ prodeuntem, qua incipiunt cum thalamis decussari *k\*)*.

*t\*\**) Tartarughe T. 2. f. 5.

pag. 205. not. i) *adde* SCHNEIDERUS, WEPFERUS *cicut.* p. 202. in cane nullum v. HORNE *duff. saliv.* II. n. 5.

ibid. not. n) *adde* SANTORIN. t. III. f. 1.

ibid. not. o) *adde* SANTORIN. *posth.* Alia est descriptio III. LOBSTEINII. Facit brevius principium, quod advenit ex limite inter corpus striatum anterius & posterius; inde accedit rete de lateribus cerebri p. 28. Longior ei radix est ex fissuræ SYLVII angulo, repit inde per cineream corporis striati inferioris & interioris substantiam p. 27. 28. tertium etiam nonnunquam caput accedit ex interstitiis anteriorum loborum cerebri ad eorum principium, quod videtur ex fundo ventriculi anterioris advenire, & papilla corticali tegitur, quæ lobos anteriores terminat, qua conveniunt p. 30.

*s\*)* SANTORIN. *posth.* T. III. f. 1. t. 2. f. 1. *\*)* Progrès de la Médecine, p. 25.

*\*\*)* CHESELDEN *nerv.* n. 13. *Mémoir. de Berlin.* T. IX. p. 133.

*††*) *Off. cribriform.* p. 230. *†*) PETIT *pratiqu.* ad l. de nervis p. 408.

pag. 206. not. u\*) *adde* Anc. *Mémoir. avant* 1659. I. p. 366.

ibid. not. y) *adde* In hac classe majora vidi, sed multiplici origine.

Nempe propria sunt tubercula olfactoria superiora p. 204.

Et alia tubercula olfactoria inferiora.

Tertia origo in nonnullis a tuberculis reniformibus p. 210.

Et demum ad tubercula olfactoria inferiora fibrillæ ex glandula pituitaria adveniunt

p. 206. LOBSTEIN p. 29.

*k\*)* GIRARD. ad SANTORIN p. 32. 33.

In piscibus mirum est, quam numerosis fasciculis a cerebro abscédant; nempe ex thalamis opticis, sed duabus distinctissimis fibrarum seriebus *k\*\**) intimis, & aliis ex superficie advenientibus, & tertia serie ex toro semicirculari, qui thalamo optico includitur. Porro in facie interiori fibræ accedunt a tuberculorum inferiorum utraque parte *k\*\*\**), tum a geniculato utroque.

pag. 207. l. ult. *adde* Subtilius cum in ista inquisivissent SANTORINUS & GIRARDUS, invenerunt demum, nasci ex medulla lateribus crurum cerebri interposita, plerumque non modo cinerea, sed & fusca & livida, collectis fibrillis albis, quæ continuo cruribus medullaribus inosculantur, quæ secunda & sæpe sola est origo *p*\*).

p. 209. l. 4. *post* proficiscuntur *adde*—partim

ibid. l. 5. *adde* partim a ponte *g*\*).

ibid. l. 16. *adde* In hoc receptaculo hætenus nervus quinti paris videtur intumescere, ut rete quodam vasculoso rubello superficies nervi tegatur \*), & ipse nervus, discedentibus fasciculis, plexui similis sit \*\*). GASSERII ganglion \*\*\*) vulgo vocant; depinxit etiam le CAT, & dixit GIRARDUS. Non est ganglion, ut rectius apparet, repletis vasis; & pertinet ad arteriarum receptaculi ramulos per nervi superficiem dispersos †). Lamina interior duræ membranæ ea sede accuratius nervo annectitur, quam vulgo solet. Plexum gangliiformem se vidisse, sed rarius, GIRARDUS ††).

p. 210. l. antepen. *post* secedit *adde* tanquam alter truncus, idemque prioribus major *y*\*).

p. 211. l. ult. *lege* deorsum

*k\*\**) Oper. min. III p. 200.

*k\*\*\**) Ibid. p. 203.

pag. 207. not. m) *adde* Vocat antrum nervorum oculi MALACARNE p. 89.

ibid. not. p) *adde* Superne GIRARDI t. 2. f. 2. a latere t. 3. f. 1.

*p*\*) GIRARDI p. 14.

pag. 208. not. q) *adde* qui parum a tertio (nostro quinto) distinctum facit.

*g*\*) In nuperiori descriptione SANTORINUS, & cum eo consentiens GIRARDUS duos funiculos facit radicem nervi quinti. Primus etsi videtur ex ponte oriri, re vera non oritur; & diversæ a pontis fibris naturæ fibras habet, totus ut ex cruribus cerebelli proveniat; idem superior & major p. 17. Alter minor ex ponte utique natus priori adjicitur ib. p. 18.

pag. 209 *ad verbum* septum in textu lin. 11. *adde* not. i\*) DUVERNEY *posth.* t. IV.

\*) HIRSCH *nerv. quint. par.* TABARRANUS, LOBSTEIN, MECKEL.

\*\*) Le CAT l'ouïe T. VIII. f. 5.. T. 9. f. 3.

\*\*\*) HIRSCH n. 44.

†) Conf. WRISBERG Götting. Anzeig. l. c.

††) Ad SANTORIN. T. 2.

pag. 210. not. u) *adde* le CAT l'ouïe t. 8.

*y*\*) Le CAT ibid. f. 1.

pag. 211. not. e) *adde* le CAT t. 8. f. 1.

ibid. not. n) *adde* Ad originem musculi buccinatoris DUVERNEY l. p. 88.



- pag. 213. l. 10. *adde* Habent Cl. I. BANG *h*<sup>\*</sup>). & SABBATIER *h*<sup>\*\*</sup>).
- p. 214. l. 7. *adde* Nervulum non satis intellexerat *le* CAT, etsi nunc pictum dedit *n*<sup>\*</sup>).
- ibid. l. 20. *adde* Aliquanto plura vidit Cl. Jonas BANG. A nervo nempe palatino quinti duæ radices exhibant, prior ad ramum a sexto pare ad intercostalem euntem, altera, quæ hujus ipsius radix est a MECKELIO dicta.
- p. 217. l. 4. *adde* Is parotidi furculum dat, conjungitur cum temporali primo, subit per aliam fissuram, adit musculum CASSERII *a*<sup>\*</sup>).
- p. 224. l. 11. *post* trunci *adde* abdominalis
- ibid. l. ult. *adde* Hunc eundem nervum a solo sexto oriri, idque a WALTHERO, refragante PLATNERO, esse demonstratum *n*<sup>†</sup>), ita debet sumi, ut nullos ab ophthalmico quinti furculos habuerit.
- p. 225. l. 2. *post* quintum *adde* a MARINO hæcenus constitutum *n*<sup>\*</sup>).
- ibid. l. 10. *post* bifurcata est *adde* Latam a thalamo striam accessisse vidit LOBSTEIN *s*<sup>\*</sup>).
- ibid. l. 15. *post* obducitur *adde* Originem Ill. MECKELIUS compositam facit; lata de pedunculo cerebri, deinde distincta parte ab ora posteriori pontis VAROLII. Aliquando strias transversas calami reflexas circa medullam oblongatam advenire ad usque sedem pedunculorum, a qua pars reliqua nervi mollis oritur *x*<sup>\*</sup>).

pag. 212. not. *s*) *adde* *Le* CAT t. 8. f. 1. 2.

*h*<sup>\*</sup>) *Nerv. cervic.*

*h*<sup>\*\*</sup>) *Anatom. II. p. 505.*

p. 213. not. *i*) *adde* Canalem in ossibus siccis describit ALBIN. *scelet. p. 161.*

ibid. *ad verbum* nervus *in textu* lin. 13. *adde* not. *i*<sup>†</sup>) *le* CAT, T. VIII. f. 2. &c.

*n*<sup>\*</sup>) T. 8. f. 2. 3. p. 268.

pag. 214. *ad verbum* debemus *in textu* lin. 13. *adde* not. *s*<sup>\*</sup>). Habet nunc HIRSCH l. c. n. 62. 64. I. BANG *Nerv. cervic.* SABBATIER ap. VERDIER II. p. 505. MONRO *bones* p. 94. non laudato MECKELIO.

ibid. not. *y*) *adde* Habet ramos dentales *le* CAT T. 8.

*a*<sup>\*</sup>) *Le* CAT. t. 7. f. 2. t. 9. f. 5.

pag. 218. not. *r*) *adde* *le* CAT t. 5.

pag. 222. *ad verbum* corporum *in textu* lin. 5. *adde* not. *a*<sup>\*</sup>) Ex pyramidali ZINN p. 200.

A ponte prope ea corpora, non ab iis, COOPMANS *nerv. p. 114.* Ex conjunctione pontis cum corporibus GIRARDUS l. c. ad T. 2. Aliquando a tractu transversali medullari subimo ponte ib.

ibid. not. *b*) *adde* Duabus radicibus anteriori & posteriori BANG.

p. 223. not. *u*) *adde* MONRO *nerv. p. 397.*

*n*<sup>†</sup>) *Ep. ad me* p. 17.

*n*<sup>\*</sup>) ORIBAS. p. 264.

pag. 225. not. *q*) *adde* GIRARDI t. 2.

*s*<sup>\*</sup>) t. 1.

*x*<sup>\*</sup>) *Mém. de l'Acad. 1765. p. 99.*

pag. 225. l. penult. *post* nascitur *adde* Descriptionem Cl. MALACARNE conjunctim addo. *Fossula quadrilatera* inter pontem & corpora olivaria, ex cujus fundo multæ fibræ nervi duri oriuntur *z*<sup>\*</sup>).

Aliæ fibræ ex partibus oppositis fulci ventriculi quarti, utrinque duæ & tres oriuntur *z*<sup>\*\*</sup>), quæ uniuntur, transeunt secundum basin colliculi pyramidalis, uniuntur cum fibris fossulæ quadrilateralis, & fiunt nervus durus.

Aliæ inter floccum (partem eminentem plexus chorioidei quarti) & eminentiam pyramidalem *z*<sup>\*\*\*</sup>).

p. 226. l. 12. *adde* Surculum etiam vidit MECKELIUS, qui in vestibulum per manubrium subit *i*<sup>\*</sup>), eundem puto, quem BERTINUS dicit per imum meatum semicircularem proprium per ductum subire *i*<sup>\*\*</sup>).

ibid. l. 16. *post* æquabilis *adde* tamen acustico linguæ major,

p. 227. l. 1. *post* pergit *adde* ad aliquam distantiam a membrana tympani, cellulosis tamen filis ad eam revinctis *q*<sup>\*</sup>).

ibid. l. 13. *post* mastoideas *adde* ad foramen jugulare & musculos basi ossis hyoidis affidentes *e*<sup>†</sup>). Alias etiam cruri longiori incudis *e*<sup>††</sup>), membranæ tympani *e*<sup>†††</sup>), tubæ, musculis,

p. 228. l. 12. *adde* Ill. MECKELIUS habet ramum ex nervo duro natum continuo, ut ex aquæductu prodiit, qui ante biventrem descendit bifidus, & uno furculo in eum musculum consumitur, altero cum nervo molli ab intercostali ramo. Alter vero majorque ramus biventrem perforat, redit versus

*z*<sup>\*</sup>) Nuova esposizione della vera struttura del cervello umano, p. 91.

*z*<sup>\*\*</sup>) p. 111.

*z*<sup>\*\*\*</sup>) p. 112.

pag. 226. not. b) *adde* Ut eum nervus subeat *le* CAT t. 9.

ibid. not. i) *adde* *le* CAT T. 3. f. 3. T. 8. f. 8. T. 2.

*i*<sup>\*</sup>) MECKEL *epist.* p. 212. *le* CAT p. 57.

*i*<sup>\*\*</sup>) *le* CAT p. 57. BERTIN *des Os* II. p. 64. 65.

*q*<sup>\*</sup>) *adde* Conf. *le* CAT t. 8. f. 2.

*q*<sup>\*</sup>) *le* CAT. t. 8.

pag. 227. not. 2) *adde* LOESEKE p. 20. Rejecit nervum musculi CASSERII SABBATIER II

p. 676. neque videtur egere, cum mera membrana sit.

ibid. not. a) *adde* LOESEKE.

ibid. not. c) lin. 2. *adde* DUVERNEY *mém. avant 1699. ad 1676. 1677.*

ibid. not. d) *adde* LOESEKE p. 17. *le* CAT t. 4. f. 18.

*e*<sup>†</sup>) *le* CAT t. 4. f. 16.

*e*<sup>††</sup>) LOESEKE p. 18.

*e*<sup>†††</sup>) Ibid.

*c*<sup>\*</sup>) *adde* LOESEKE p. 20.



foramen jugulare, & cum linguâ ab octavo coit *n*\*). Eam unionem WINSLOWIO jam dictam se vidisse CL. LASSUS *n*\*\*)

Ramum ad accessorium circa eam regionem habet SABBATIER *n*†).

pag. 231. l. 10. *adde* Ita reperi; rarius autem ita se habere GIRARDUS, & frequentius prodire pluribus fibris a quarto ventriculo, tum ex superioribus scrobis hujus ventriculi, tum ex inferioribus.

p. 232. l. 8. *adde* Ea, ut puto, fede erunt ex anastomoses cum nervo nono, cumque quinto, quas WINSLOWIO soli dictas Petrus LASSUS suo testimonio confirmat *b*\*). Cum nono videtur le CATIUS depingere *b*\*\*).

p. 235. l. 5. *adde* Ramum ex medio collo ad glandulas bases cordis, adque eam basin, ejusque partem anteriorem inter eam basin & aortam DUVERNEYUS habet, tum ramum ad auriculam cordis sinistram circa recurrentis ortum *i*\*).

p. 236. l. 12. *lege* dexterior plerumque

ibid. l. ult. *adde* Nervos octavi paris cum intercostalibus conjunctos efficere nervos abdominis olim GALENUS *i*\*).

p. 237. l. 5. *post eunt adde* & ab istis sunt nervi comites vasorum gastroepiploicorum dextri lateris, qui ad ventriculum dividuntur, & nonnullis furculis ad omentum,

pag.

*n*\*) *Epist.* ad me T. II. p. 679.

*n*\*\*) T. III. n. 12.

*n*†) *Morb. ling.*

pag. 228. not. q) *adde* Ad aurem & apophysin mamillarem le CAT t. 4. t. 7. f. 2.

pag. 229. not. b) *adde* MENG p. 79.

ibid. not. d) *adde* Ramus temporalis, superficialis duri, qui plexum efficiunt le CAT t. 8.

pag. 231. not. l) *adde* le CAT t. 10. 8.

ibid. not. n) *adde* Ex latere exteriori processus in arcum ducti, in quem corpus pyramidale producit SANTORIN. T. II. u.

pag. 232. not. y) *adde* Describit etiam ROEDERER *thes. decad.* n. 27.

ibid. not. z) *adde* le CAT t. 10.

*b*\*) *Morb. ling.*

*b*\*\*) t. 10.

pag. 234. not. n) *adde* Veteres id ganglion habebant ut GALEN *de util. part.* L. XVI. c. 5. *i*\*) l. p. 103.

pag. 235. *ad verbum* uterque lin. 16. *adde* not. o\*) DUVERNEY p. 95.

pag. 236. *ad verbum* venosi in *textu* lin. 6. *adde* not. b\*) BERTRANDI *de hepate*, p. 38.

ibid. *ad verbum* veniunt in *textu* l. 20. *adde* not. g\*) Plexus gastricus circa celiacam arteriam LUDWIG *plex. abdom.*

ibid. not. i) *adde* Ramos ad plexum splenicum LUDWIG.

*i*\*) *De utilit. part.* XIV. c. 5.

pag. 237. *ad verbum* hepaticum in *textu* lin. 1. *adde* not. i\*\*) Ramos ad plexum hepaticum LUDWIG.

pag. 238. l. 6. suis *lege* plusculis

p. 240. l. 12. *adde* & Cl. SABBATIER *f*\*).

p. 242. l. 16. *adde* Sed vidit nuper Cl. SABBATIER furculum, qui terminatur in sui canalis lateribus & fila det aliqua cum primo (secundo nostro) communicantia, tantum ut nihil cum cordis nervis commune habeat *m*\*).

p. 244 l. 10. *post* demum *adde* Ad omnes vertebrae colli Cl. LOBSTEIN *p*\*).

ibid. l. 11. *adde* neque LOBSTEIN *r*\*). Cum accessorio saepius tantum conglutinatur, eumque praeterit *r*\*\*); saepius tamen communicat *r*\*\*\*).

p. 245. l. 2. *post* prodeat *adde* Vidit tamen Cl. LOBSTEIN, & cum linguali ab octavo misceri, & cum octavo *a*\*).

ibid. l. 9. *adde* Communicare cum septimi parte dura, & ab ea ramum habere SABBATIER *d*\*); cum octavo *le* CAT *d*\*\*).

pag. 238. *ad verbum* pyramidalibus in *textu* lin. 3. *adde* not. *r*\*) Ab imis pyramidalibus SANTORIN. T. II.

ibid. not. 2) *adde* Conjunctionem veram habet *le* CAT T. 10. Aliquando cum eo nervo conjungi olim GALENUS de *util. part.* VI. c. II. DROVIN p. 53.

ibid. *ad verbum* augetur in *textu* lin. antep. *adde* not. *e*\*) Rete ex octavo, nono, undecimo (secundo) HUBER habet p. 21. *le* CAT ex octavo, nono, primo accessorio T. X.

ibid. not. *h*) *adde* VIEUSSENS p. 205.

pag. 239. *ad verbum* sternothyreoideum in *textu* lin. 3. *adde* not. *l*\*) Sternohyoideum & sternothyreoideum BERRETIN t. 13. f. 2. ad ipsum subclavium DROVIN p. 53.

ibid. not. *p*) *adde* Id cum piscium cerebro commune habere CAMPER *Verh. van de Maatsch.* T. VII. P. I. p. 94. 95.

*f*\*) *Mém. des sav. étrang.* T. VII.

pag. 240. not. *g*) *adde* Duplices LOBSTEIN f. 1.

ibid. not. *h*) *adde* Ramus quidem *Idem* Sed tamen etiam a facie postica fibram unam vel duas.

pag. 241. not. *m*) *post* velle *adde* *Mém. prés.* T. VII. lin. ult. *adde* Conglutinatur SABBATIER p. 556.

ibid not. *n*) *adde* Ramum ab accessorio descendente ad decimum venire SABBATIER.

ibid. not. *y*) *adde* Habet SABBATIER *Anat.* II. p. 701.

ibid. not. 2) *adde* *le* CAT t. 10.

ibid. not. *a*) *adde* VIEUSSENS p. 205. DUVERNEY p. 97.

pag. 242. not. *d*) *adde* VIEUSSENS p. 205.

ibid. not. *g*) *adde* DUVERNEY p. 197. aliquando.

*m*\*) *Anat.* II. 701. *Mém. des savans étrang.* T. VII. p. 558. 559.

*p*\*) p. 28. f. 1.

*r*\*) p. 27. 29.

*r*\*\*) LOBSTEIN, SABBATIER.

*r*\*\*\*) LOBSTEIN p. 28.

pag. 244. not. *x*) lin. 2. *adde* Quatuor, quodque duplex LOBSTEIN f. 1. Multa *le* CAT t. 10. Multa SANTORIN. t. 2.

*a*\*) p. 32. f. 2.

*d*\*) *Anat.* II. p. 679.

*d*\*\*) t. 10.



pag. 245. l. 12. *lege* cruralibus

p. 246. l. 8. *adde* III. CAMPERUS hos plexus paulo aliter descripsit, & facile credas rem varietatem admittere *k*\*). Duos facit plexus, anteriorem, qui reliquos ramos brachiales, & posteriorem, qui radialem & articulare edit.

*ibid.* l. 11. *adde* Septem CAMPERUS numerat *l*\*).

*ibid.* l. 19. *adde* Ex quinto & sexto CAMPERUS *o*\*).

*ibid.* l. 22. *adde* Ex octavo colli CAMPER *p*\*).

p. 247. l. 4. *post* brachialis *adde* tegitur vena mediana, & ea sede in venæ sectione lædi potest *u*\*).

*ibid.* l. 21. *adde* Ejus est ramus insignis cutaneus externus *g*\*).

p. 257. l. 18. *post* habet *adde* Cum spinalibus cervicis nervis quinque communicationes habet a secundo ad sextum, vel inferiores, trunculo, qui per canalem processuum transversorum ascendit *c*\*).

p. 268. l. 6. *post* tendunt *adde* alii & numerosi ad oesophagum, ad nervum octavi paris alii *l*\*),

*k*\*) *Fasc.* I. T. 9. t. 1. f. 1.

*l*\*) t. 9.

*o*\*) In icon. t. 1. f. 1.

*p*\*) p. 12. t. 1. f. 1.

pag. 246. not. r) *adde* Duas etiam CAMPER p. 11.

pag. 247. not. t) *adde* Ex quatuor nervis CAMPER t. 1. f. 1.

*u*\*) CAMPER t. 2. f. 1. 2.

*ibid.* *ad verbum* octavo *in textu* l. 9. *adde* not. y\*) CAMPER.

*ibid.* not. d) *adde* Ex quinto, sexto, septimo & octavo CAMPER.

*g*\*) PETIT ad PALFYN p. 1171.

pag. 250. not. l) *adde* CAMPER I. p. 2.

pag. 251. not. p) *adde* CAMPERUS plexum facit pudendum, ad quem ex ipso trunco ramus recurrit; ramum ad rectum intestinum; ad anum & perinæum, ad penem.

pag. 254. not. n) *adde* Habet GALENUS *de utilitate partium* XIV. c. 5.

*ibid.* not. o) *adde* Brevius LOBSTEIN f. 2.

pag. 255. not. x) *adde* LOBSTEIN f. 3.

*ibid.* not. l) *adde* VITTET I. p. 53. &c.

pag. 257. *ad verbum* superior *in textu* lin. 5. *adde* z\*) Habet DUVERNEY.

*c*\*) SABBATIER *Anat.* II. p. 711.

*ibid.* not. d) *adde* Habet CAMPER T. I. f. 1.

*ibid.* not. e) *adde* Nullum fuisse ISENFLAMM *diffic. epicris.* III. p. XXXII. Non perpetuum esse ad septimam vertebra DUVERNEY I. p. 99.

*l*\*) SABBATIER II. p. 354.

pag. 258. not. o) *adde* CAMPER T. I. f. 1.

pag. 259. *ad verbum* duo *in textu* lin. 1. *adde* not. t\*) ISENFLAMM I. c.

*ibid.* *ad verbum* ipsis *in textu* lin. 8. *adde* not. y†) CAMPER f. 10.

pag. 259. l. 15. *adde* Quatuor ramos, qui uniti pectus subeunt, & sub arteria pulmonali ad auriculæ dextræ partem posteriorem & cordis sedem inter auriculas eunt *b\*)*.

Sinister vero intercostalis ex primo ganglio & ex ramis inferioribus dat propagines in aspera arteria positas pone aortam, quæ plexum faciunt circa arteriam pulmonalem & auriculam, & ventriculum finistrum adeunt *b\*\*)*.

pag. 260. l. 9. *adde* Habet etiam DUVERNEYUS ramos a recurrente sub arteria pulmonali dextra cum intercostali commistos *k\*)*.

p. 261. l. 4. *adde* Renalis ad decimam & undecimam vertebram DUVERNEY *s\*)*.

ibid. l. 23. *adde* Duo, tria fecit DUVERNEY. Ex iis plexum deducit hepatis mesentericum, ex eo hepaticum, ramos ad glandulas renales unitos cum ramis octavi paris *y\*)*; porro ex trunco & ex plexu renali fieri ramos plexus mesenterici inferioris *Idem*.

p. 265. l. 7. *adde* A splanchnico etiam advenire radices LUDWIG.

p. 266. l. 19. *adde* Mesentericum inferiorem habet LUDWIGIUS. Nempe sub arteria mesenterica superiori plexus oritur renalis. Ex eo rami in mesentericum inferiorem descendunt. Descendunt alii utrinque ex trunco sub ramis ad renalem natis, & ad inferiorem mesentericum accedunt. Denique alii a renali plexu, qui est a splanchnico.

*b\*)* DUVERNEY.

*b\*\*)* Id. p. 103.

pag. 259. not. *d)* *adde* Habet CAMPER t. 1. f. 1.

*k\*)* p. 103.

pag. 260. not. *l)* *adde* Hepatis mesentericus DUVERNEY p. 100.

*s\*)* p. 103.

*y\*)* DUVERNEY p. 101.

pag. 262. not. *f)* *adde* ISENFLAMM l. c. addit in phrenico communicare.

pag. 264. not. *b)* *adde* LUDWIGIUS. Ramus utriusque ganglii semilunaris super celiacam arteriam cum ramo posteriori paris octavi facit plexum, vel circa celiacam & mesentericam arteriam producitur.

pag. 265. not. *h)* *adde* Superiorem & inferiorem habet COOPMANS apud MONRO p. 147.

ibid. not. *l)* *adde* Sinister splanchnicus LUDWIGII ganglion facit ad aortam super arteriam celiacam. Ab ejus ganglii dorso multi rami eunt ad renalem arteriam & ad glandulas renales, qui etiam plexui ramus intercostalis ramum dat.

ibid. not. *o)* *adde* Habet spermaticam COOPMANS. Sed dicetur cum iis organis.



Cl. SABBATIER radices habet a primo & secundo ganglio lumbari, a primo, secundo, tertio, a primo & secundo pluribus radicibus *d\*)*).

pag. 268. l. 15. *post* nego *adde* Alias quatuor sacri ad intercostalem ramos addunt *q\*)*; & transverso ramo quisque cum fodali coit *b\*\*)*).

ibid. l. 16. *adde* Ad primum ischiadici una anastomosis, ad secundum duæ, ad tertium etiam duæ; CAMPER ad pudendum una & cum coccygea anastomosis.

*d\*)* II. p. 266.

*b\*)* DUVERNEY p. 102.

*b\*\*)* Ibid.

pag. 268. not. c) *adde* CAMPER.

ibid. not. f) *adde* SABBATIER II. p. 161.

ibid. *ad verbum* visum in *textu* lin. ult. *adde* not. *i\*)*). In aliis finiri in ultimos sacros SABBATIER l. c. Finis incertus CAMPER.

*Fasciculi IV. Part. I. finis.*

---





THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

1000 N. EAST 58TH ST.  
CHICAGO, ILL. 60630

Acquired from the  
Library of the University of Chicago

1000 N. EAST 58TH ST.  
CHICAGO, ILL. 60630  
Acquired from the  
Library of the University of Chicago

1000 N. EAST 58TH ST.







